



Biomnis

Intègre
les bilans
Juvenalis
de biologie préventive



LE GUIDE

DES EXAMENS DE BIOLOGIE MÉDICALE

Le référentiel en ligne sur www.eurofins-biomnis.com constitue le catalogue de référence pour tous les examens. Actualisée mensuellement, cette version numérique téléchargeable vous est proposée pour un usage hors connexion.

SOMMAIRE

- [Bilans de biologie préventive : Juvenalis®](#)
- [Contacts utiles](#)
- [Renseignements pratiques](#)
 - [Référentiel des examens de biologie médicale](#)
 - [Liste utiles – Tests dynamiques](#)
 - [Matériel](#)
 - [Bons de demande d’analyses et autres documents](#)
 - [Préparation et traçabilité des envois](#)
 - [Exécution des analyses](#)
 - [Délai de rendu des résultats](#)
 - [Transmission des résultats](#)
- [Exigences réglementaires](#)
- [Référentiel des examens de biologie médicale](#)
- [Index des examens par spécialités](#)
 - [Allergie](#)
 - [Biochimie](#)
 - [Biologie de la reproduction \(AMP\)](#)
 - [Biologie des tumeurs solides](#)
 - [Biologie préventive](#)
 - [Chimie analytique](#)
 - [Cytogénétique](#)
 - [Dépistage T21 et biochimie fœtale](#)
 - [Génétique](#)
 - [Génétique moléculaire](#)
 - [Hématologie](#)
 - [Immunologie](#)
 - [Infectiologie](#)
 - [Oncohématologie](#)
- [Index des examens par synonymes](#)

BILANS DE BIOLOGIE PREVENTIVE : Juvenalis®

Le maintien d'un bon état de santé est un élément majeur dans la prévention de nombreuses pathologies. Passant par une (ré)adaptation du mode de vie (alimentation, activité physique, choix de l'environnement), il peut être évalué, dans son ensemble ou plus spécifiquement, par différents marqueurs biologiques susceptibles de traduire d'éventuels dysfonctionnements, déficits ou carences qu'il sera alors possible de mettre en évidence, de corriger ou de maîtriser.

Juvenalis® est une gamme d'analyses biologiques réalisées au sein des laboratoires Eurofins Biomnis. Celle-ci est destinée aux praticiens et aux professionnels de santé désireux d'accompagner leurs patients soucieux de s'assurer un "bien-vieillir" et/ou de prendre en main leur propre état de santé. Chaque bilan offre des spécificités susceptibles de répondre aux questionnements des patients :

- **MiniCheck et BasicCheck** sont les bilans conseillés en première intention. Composés de marqueurs du stress oxydant, de l'inflammation de bas grade et de l'état (micro-)nutritionnel, ils permettent un bilan initial de l'état de santé,
- **AgeCheck Homme/ AgeCheck Femme** s'adressent aux patients désireux de faire le point sur leur santé dans le cadre d'une démarche « anti-âge »,
- **DermaCheck** est un bilan basique de santé dermatologique, conçu comme un soutien à l'assurance d'une belle peau,
- **DigestCheck** s'adresse à tous les patients souffrant de troubles fonctionnels intestinaux, souvent d'origine inexplicite : le bilan proposé pourra donner d'autres pistes à explorer, ou soutenir une action correctrice déjà initiée,
- **FertiCheck Homme / FertiCheck Femme** s'adressent aux couples en désir de parentalité souhaitant optimiser leur fertilité,
- **NutriCheck** a été conçu plus spécifiquement pour les patients soucieux de leur alimentation et du contrôle de leur poids,
- **OxyCheck** a pour but l'estimation du niveau de stress oxydatif en cours, grâce à la traduction de cet état par un index spécifique, calculé à partir de 9 marqueurs sélectionnés pour leur pertinence. Bien plus qu'un simple bilan des défenses anti-oxydatives de l'organisme, cet index reflète fidèlement l'état de stress oxydatif d'un patient à l'instant T,
- **VeggieCheck** est destiné aux personnes pratiquant un régime végétarien ou végétalien, souhaitant surveiller si leur état micronutritionnel est impacté leur régime,
- **Minéraux** permet de faire le point sur les carences en minéraux (fer, iode, cuivre...),
- **Vitamines** permet de faire le point sur les carences en vitamines (A, B1, B2, C, D...)
- **Nutritol** est une gamme de test d'intolérances alimentaires, dosant les IgG anti-aliments. 5 tests sont disponibles, dosant de 25 à 270 aliments.
- La gamme propose aussi un peu plus de **40 analyses unitaires** pour compléter ou créer un bilan ou encore réaliser un suivi post-bilan.

Chaque analyse constitutive d'un bilan **Juvenalis®** est prise en charge et réalisée de façon strictement identique à sa réalisation dans un contexte général : la validation est effectuée par le(s) biologiste(s) responsable(s) du secteur concerné, puis l'ensemble du bilan est rassemblé avant d'être validé, et si nécessaire commenté, par l'un des biologistes référents **Juvenalis®** (qui font partie des biologistes Eurofins Biomnis).

Nos biologistes ont été formés en biologie préventive et fonctionnelle, notamment dans les domaines de la micronutrition, du stress oxydatif ou des métabolismes impliqués dans les troubles fonctionnels, qui représentent en France plus de 75% des motifs de consultation et sont reconnus pour être à l'origine de nombreuses maladies chroniques ou auto-immunes.

Toutes les informations nécessaires sont disponibles sur le site de Juvenalis® :

www.juvenalis.com

CONTACTS UTILES

SECRETARIAT MEDICAL

Tél. 01 49 59 16 16 – Fax 01 49 59 17 98
Lundi au vendredi : 7h30 – 17h30 et Samedi : 7h30 – 13h
E-mail : Secretariat.Medical@biomnis.eurofinseu.com

SECRETARIATS MEDICAUX SPECIALISES

Génétique

Tél. 04 72 80 25 77 – Fax 04 72 80 25 79
Lundi au vendredi : 7h30 – 17h30
E-mail : Secretariat.Genetique@biomnis.eurofinseu.com

Marqueurs sériques maternels (T21)

Tél. 04 72 80 73 75 – Fax 04 72 80 73 62
Lundi au vendredi : 7h30 – 17h30
E-mail : Secretariat.T21@biomnis.eurofinseu.com

Allergologie

Tél. 04 72 80 23 86 – Fax 04 87 91 50 88
Lundi au vendredi : 7h30 – 17h30
E-mail : Secretariat.Allergologie@biomnis.eurofinseu.com

Oncologie, Hématologie et Cytologie

Tél. 04 72 80 23 65 – Fax 04 72 80 23 66
Lundi au vendredi : 7h30 – 17h30
E-mail : Secretariat.OncoHematologie@biomnis.eurofinseu.com

Mycobactéries, Biologie moléculaire infectieuse spécialisée, Bactériologie

Tél. 04 72 80 73 99 – Fax 04 72 80 47 78
Lundi au vendredi : 8h – 16h30
E-mail : Secretariat.Infectiologie@biomnis.eurofinseu.com

Cytogénétique constitutionnelle

Tél. 04 44 12 59 14 – Fax 01 44 12 59 17
Lundi au vendredi : 9h – 17h
E-mail : Secretariat.Cytogenetique@biomnis.eurofinseu.com

SERVICES SUPPORT

Service commercial

Tél. 04 26 70 02 33 – Fax 04 72 80 73 92
Lundi au vendredi : 9h – 17h
E-mail : Commercial@biomnis.eurofinseu.com

Support informatique

Lundi au vendredi : 9h – 18h
E-mail : Connectivity.Center@biomnis.eurofinseu.com

Logistique

Tél. 04 72 80 25 85 – Fax 04 72 80 10 58
Lundi au vendredi : 8h30 – 18h
E-mail : Logistique@biomnis.eurofinseu.com

Facturation Correspondant

Tél. 04 72 80 10 38
Lundi au vendredi : 8h – 16h30
E-mail : Facturation.Correspondants@biomnis.eurofinseu.com

Assurance Qualité

Lyon Tél. 04 72 80 10 59 – Fax 04 72 80 73 34
Lundi au vendredi : 8h30 – 17h
E-mail : QualiteLyon@eurofins-biomnis.com

Paris Tél. 01 49 59 16 79 – Fax 01 49 59 17 42
Lundi au vendredi : 9h – 17h30
E-mail : QualiteParis@eurofins-biomnis.com

Recherche Clinique

Tél. 01 49 59 16 87 – Fax 01 49 59 15 15
Lundi au vendredi : 8h30 – 17h
E-mail : ClinicalTrailsTeam@eurofins-biomnis.com

Division Internationale

Tél. 04 72 80 47 11 – Fax 04 72 80 73 56
Lundi au vendredi : 8h30 – 18h30 et Samedi : 9h – 12h
E-mail : International@eurofins-biomnis.com

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

REFERENTIEL DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE Eurofins Biomnis

Consultation en ligne du référentiel des examens de biologie médicale

Actualisé quotidiennement, le référentiel des examens Eurofins Biomnis disponible sur www.eurofins-biomnis.com constitue le catalogue de référence auquel nous vous invitons à vous reporter pour toute question relative à un paramètre : conditions pré-analytique, température de conservation, cotation, ...

@ www.eurofins-biomnis.com → Examens

L'information préalable sur les principales modifications du référentiel est effectuée par la Newsletter mensuelle « Biomnis & Vous ».

Chaque fin de mois, nous mettons à disposition sur Biomnis Connect, rubrique Biologie pratique > Référentiel des examens un fichier répertoriant les mises à jour du référentiel applicables au 1er du mois suivant.

@ connect.eurofins-biomnis.com → Biologie pratique → Référentiel des examens

Téléchargement du référentiel des examens de biologie médicale structuré (HL7 et Excel)

Notre référentiel est également disponible au format Excel ou HL7 sur notre espace correspondant Biomnis Connect ainsi que sur un serveur dédié aux éditeurs de Système de Gestion de Laboratoire pour intégration et mises à jour automatisées dans votre système informatique.

Comment disposer du référentiel Excel ou HL7 ?

- Vous êtes correspondant Eurofins Biomnis et possédez un accès à Biomnis Connect : Accédez à votre personnalisé :

@ connect.eurofins-biomnis.com → Biologie pratique → Outils informatiques

- Vous êtes correspondant Eurofins Biomnis mais vous ne possédez pas d'accès à Biomnis Connect : Contactez le service commercial par email : Commercial@biomnis.eurofinseu.com
- Si votre éditeur souhaite avoir accès à notre espace FTP : Il lui suffit de contacter le support informatique Eurofins Biomnis par email : Connectivity.Center@biomnis.eurofinseu.com

Guide des Examens de Biologie Médicale en format numérique

Eurofins Biomnis propose également une version du Référentiel des Examens de Biologie Médicale sous forme de catalogue numérique : le « Guide des Examens de Biologie Médicale ». Cette version intégrale actualisée mensuellement du Guide des examens Eurofins Biomnis est mise en ligne en fin de mois pour application le 1^{er} jour du mois suivant.

Téléchargeable en format pdf, le Guide des Examens de Biologie Médicale vous permet de disposer d'une version du catalogue toujours à jour pour un usage hors connexion.

Accédez au Guide des Examens de Biologie Médicale en format numérique sur www.eurofins-biomnis.com.

@ www.eurofins-biomnis.com → Examens

LISTES UTILES – TESTS DYNAMIQUES

Listes utiles

Toutes les listes utiles à votre pratique quotidienne sont disponibles sur Biomnis Connect (paramètres HN, paramètres à congeler dans l'heure, prélèvements à jeun...). Vous pouvez les télécharger aux formats xls et pdf.

[@ connect.eurofins-biomnis.com](https://connect.eurofins-biomnis.com) → Biologie pratique → **Outils pratiques**

Listes allergènes

Nous mettons également à votre disposition sur Biomnis Connect :

- La liste alphabétique des allergènes
- La liste des allergènes par code

Ces listes sont exportables au format Excel. Il est également possible de les imprimer et de les enregistrer au format pdf.

[@ connect.eurofins-biomnis.com](https://connect.eurofins-biomnis.com) → Biologie pratique → **Outils pratiques**

Tests dynamiques

Eurofins Biomnis met à disposition de ses correspondants une liste des tests dynamiques. Il est possible de les imprimer.

[@ www.eurofins-biomnis.com](https://www.eurofins-biomnis.com) → Services → **Tests dynamiques**

MATERIEL

Les modalités de prélèvement, d'identification et de conservation des échantillons biologiques sont indiquées dans ce guide. Elles doivent être conformes aux exigences d'accréditation de la norme NF EN ISO 15189. Il est important de les respecter afin de faciliter la prise en charge de vos échantillons. Le non respect des conditions de prélèvement, d'identification et de conservation constitue un critère de non-conformité majeure.

Certains examens nécessitent des matériels de prélèvement ou des milieux de transport spécifiques que Eurofins Biomnis met à disposition de ses correspondants à titre gracieux. Toute demande d'approvisionnement en bons de demande d'examens, documents pratiques, sachets de transports, Kits de prélèvement ou encore tubes et milieux de transport spécifiques doit être faite via Biomnis Connect.

[@ connect.eurofins-biomnis.com](https://connect.eurofins-biomnis.com) → **Commande en ligne**

Eurofins Biomnis vous propose également aussi une formule « **Abonnement** » vous permettant d'être livré mensuellement d'un panier type.

BONS DE DEMANDE D'ANALYSES ET AUTRES DOCUMENTS

Les prélèvements conditionnés dans le respect des instructions précisées doivent nous être adressés accompagnés d'un **bon de demande d'analyse** et si nécessaire de la **fiche de renseignements clinique** spécifique et/ou **attestation ou consentement** requis.

Pas d'agrafe, ni ruban adhésif, ni trombone, ni surlignage au marqueur, ni recto-verso

Identification du correspondant :

- Etiquette d'identification (disponibles sur la commande en ligne) ou mention manuscrite

Analyses :

- Libellé et code Eurofins Biomnis des analyses : Recommandations concernant la présentation des libellés d'analyse sur les bons de demande
- Nombre / Type / Température des échantillons associés à chaque analyse

Autres documents à joindre impérativement au prélèvement pour certaines analyses :

- Fiche de renseignements cliniques
- Consentement éclairé ...

La norme ISO 15189 souligne la nécessité pour certains examens de joindre au prélèvement les renseignements cliniques indispensables à une bonne interprétation du résultat. **Pour chaque paramètre, les documents spécifiques requis le cas échéant sont précisés et téléchargeables à partir du référentiel des examens en ligne sur :**

[@ www.eurofins-biomnis.com](http://www.eurofins-biomnis.com) → Examens

PREPARATION ET TRACABILITE DES ENVOIS

Toutes les informations pratiques sur la préparation de vos envois, les consignes d'utilisation des sachets et les solutions de traçabilité des prélèvements et des températures sont disponibles :

[@ connect.eurofins-biomnis.com](http://connect.eurofins-biomnis.com)

→ Biologie pratique → **Préanalytique – Conditionnement – Préparation des envois**

[@ connect.eurofins-biomnis.com](http://connect.eurofins-biomnis.com) → **Traçabilité logistique**

EXECUTION DES ANALYSES

Toutes les analyses sont réalisées conformément à des modes opératoires écrits, mis à jour au fur et à mesure de l'évolution des techniques. Toute modification de la méthode d'analyse susceptible d'influer sur l'expression des résultats ou les valeurs de référence fait l'objet d'une note d'information adressée aux laboratoires transmetteurs.

La préparation, le lancement, la validation analytique et biologique des analyses sont soumis à des procédures écrites. La politique de contrôle de qualité interne de chaque analyse fait l'objet d'une description détaillée quant aux échantillons de contrôle, à leurs conditions de passage, aux règles d'acceptabilité et à la conduite à tenir en cas d'anomalie.

La participation de Eurofins Biomnis à différents programmes de contrôle de qualité externe permet de valider les méthodes mises en œuvre et de détecter les éventuelles anomalies.

Les analyses marquées d'un astérisque font l'objet d'une retransmission. Les conditions pré-analytiques et les tarifs sont définis sur la base des exigences du laboratoire réalisateur.

DELAI DE RENDU DES RESULTATS

Les délais de rendu des résultats indiqués dans le Référentiel des Examens de Biologie Médicale correspondent au délai maximum pour la mise à disposition du résultat.

Il est calculé à partir de l'enregistrement du prélèvement par Eurofins Biomnis. Il ne tient pas compte des dimanches, jours fériés, d'une éventuelle mise en contrôle ou de l'ajout d'une analyse complémentaire.

TRANSMISSION DES RESULTATS

Les résultats sont transmis conformément à l'article L.6211-19-II du Code de la Santé Publique en préservant le secret professionnel.

Par courrier

Sauf exigences réglementaires spécifiques, les différents exemplaires de compte-rendu de résultats de biologie spécialisée (Laboratoire, Patient, Médecin Prescripteur) sont envoyés exclusivement au laboratoire correspondant.

Le LBM transmetteur doit compléter l'interprétation faite par Eurofins Biomnis dans le contexte des autres examens qu'il a lui-même réalisés.

Par liaison HPRIM

Les résultats peuvent être communiqués par liaison HPRIM au laboratoire selon les spécifications de la recommandation HPRIM SANTÉ V2.2 et HPRIM Net V1.

Ces échanges s'appuient sur l'utilisation de la messagerie Internet sécurisée, S/MIME, au travers de réseaux basés sur les protocoles SMTP et TCP/IP. L'authentification de l'origine des messages et la confidentialité des données transmises sont ainsi assurées.

Pour obtenir un accès à ce service, merci de contacter le support informatique Eurofins

Biomnis : Lundi-Vendredi : 9h - 18h

E-mail: Connectivity.Center@biomnis.eurofinseu.com

Via Biomnis Connect

Notre espace correspondant Biomnis Connect offre de nombreuses fonctionnalités dont l'accès direct aux résultats sur un serveur sécurisé.

Simple, rapide et pratique, Biomnis Connect vous permet de :

- Consulter en temps réel, 24h/24, les dossiers d'analyses spécialisées des patients
- Visualiser le statut des dossiers et la date prévisionnelle de mise à disposition des résultats
- Repérer les analyses urgentes ou non conformes sur un dossier
- Demander à être informé directement par Email ou par SMS de la mise à disposition d'un résultat
- Disposer d'informations relatives à chaque dossier :
 - o Renseignements administratifs
 - o Situation du dossier
 - o Cotation NABM
 - o Montant de la facturation
 - o Résultats antérieurs des patients
 - o Compte-rendu de résultats en format pdf
- Editer/imprimer les dossiers sélectionnés
- Extraire les données des dossiers sélectionnés sous forme de tableur exploitable sous Excel®

A partir de Biomnis Connect, vous avez également la possibilité d'accéder à la traçabilité logistique des prélèvements que vous nous confiez.

Pour obtenir un accès à Biomnis Connect, merci de contacter le service commercial :

Lundi - Vendredi: 9h à 17h30

Tél. : 04 26 70 02 33

E-mail : Commercial@biomnis.eurofinseu.com

Par téléphone / Fax pour les dossiers urgents

Les résultats peuvent être communiqués par téléphone uniquement au prescripteur ou au laboratoire transmetteur. Cette procédure est réservée aux cas urgents signalés sur le bon de demande ou lorsqu'un résultat se révèle pathologique et nécessite une réaction rapide.

Les résultats peuvent être communiqués au laboratoire transmetteur par fax lorsque la case «A faxer» est cochée sur le bon de demande d'analyses ou que le résultat nécessite d'être transmis en urgence. Dans tous les cas un compte-rendu écrit et signé est envoyé parallèlement.

EXIGENCES REGLEMENTAIRES

CYTOGENETIQUE ET GENETIQUE MOLECULAIRE

Diagnostic prénatal

- Article R2131-1 et suivants du code de la santé publique
- Décret 2014-32 du 14 Janvier 2014
- Arrêtés du 14 Janvier 2014

Joindre impérativement au prélèvement l'ordonnance médicale, la fiche de renseignements cliniques (ou bon de demande d'analyses), l'attestation de consultation et le consentement éclairé de la femme enceinte.

Diagnostic post-natal

- Article R1131-5 du code de la santé publique issu du décret n°2008-321 du 4 avril 2008
- Arrêté du 27 mai 2013

ESTIMATION DU RISQUE DE TRISOMIE 21 FŒTALE – BIOCHIMIE PRENATALE

- Arrêté du 14 décembre 2018 fixant les règles de bonnes pratiques en matière de dépistage et de diagnostic prénatals avec utilisation des marqueurs sériques maternels de la trisomie 21.
Les documents indispensables à la réalisation du test sont :
 - la prescription médicale
 - la feuille de renseignements comportant les éléments nécessaires au calcul de risque ainsi que le formulaire type signé, par le médecin et la patiente, attestant de l'information délivrée à la femme enceinte et de son consentement (texte fixé par l'arrêté du 14 décembre 2018)
 - pour le risque combiné au 1er trimestre le compte-rendu échographique avec le nom et l'identifiant de l'échographiste, la date de l'échographie, les mesures de la clarté nucale et de la longueur cranio-caudale
- Arrêté du 14 décembre 2018 fixant le modèle des documents mentionnés au III de l'article R.2131-2 du code de la santé publique.
- Arrêté du 14 décembre 2018 fixant les modalités de transmission des données de calcul de risque à l'Agence de la biomédecine et les modalités d'évaluation

REFERENTIEL DES EXAMENS DE BIOLOGIE MEDICALE

Pour toute analyse qui ne figure pas dans ce Guide, nous vous invitons à nous contacter avant de nous transmettre vos prélèvements :

Secrétariat Médical

Tél. 01 49 59 16 16 – Fax 01 49 59 17 98
Lundi au vendredi : 7h30 – 19h et Samedi : 7h30 –
13h E-mail :
Secretariat.Medical@biomnis.eurofinseu.com

Vous disposerez ainsi de toutes les informations indispensables à la bonne prise en charge de l'analyse (préanalytique, cotation, ...).

Prélèvements

Le fait de ne pas mentionner un type de prélèvement signifie que son utilisation est contre-indiquée.

Plasma

Sauf mention spécifique, le terme « Plasma » réfère au plasma EDTA ou hépariné.
Il ne faut **JAMAIS** de plasma citraté, oxalaté ou fluoré sauf si cela est spécifiquement demandé.

Sérum

Le sérum peut être recueilli indifféremment sur tube sec ou avec séparateur de phases. Toutefois, les tubes avec séparateur de phases doivent être évités pour les dosages de médicaments (absorption).

Non-Hémolysé

Signifie que la présence d'une hémolyse même minime peut gravement nuire à la qualité du résultat.

Urine

Le prélèvement doit être fraîchement émis. Sauf indication contraire, aucun additif ou conservateur ne doit être ajouté au recueil. Pour le recueil sur 24 heures, les urines doivent être conservées réfrigérées sauf indication contraire.

Recommandations préanalytiques du GEHT

Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé.

Légende du référentiel

1 Amprénavir - plasma AMPRE *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

4 3 semaines ° HPLC

€ B 120 - réf 4117

ⓘ Prélèvement T0 (avant la prise), T1h30 et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Amylase

AMY

2 1mL Sérum ou Plasma Hépariné ° Réfrigéré

ⓘ 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

7 B 7 - réf 1510

Aneuploïdies des chromosomes 13, 18, 21, X et Y - diagnostic rapide - QFPCR - liquide amniotique - prénatal

NCDR

10

2mL Liquide amniotique frais (non hémorragique) ° T° ambiante

ⓘ 1 à 2 jours ° QF-PCR

6 € 100.00 EUR non remboursable

8 ⓘ Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPÉRATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

2,5 Hexanedione - urines

11 HEXA *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

ⓘ 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme

€ 68.00 EUR non remboursable

ⓘ Flacon en verre avec bouchon en PTFE
Prélèvement en fin de poste de travail
9 T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Légende du référentiel

- 1 Libellé de l'analyse de référence
- 2 Volume et nature de prélèvement
- 3 Conservation et transport des échantillons :
 - L'indication "Réfrigéré" indique une température de conservation et de transport comprise entre +2 °C et +8 °C
 - L'indication "Température ambiante" indique une conservation et un transport des échantillons entre +15 °C et +25 °C
 - La mention "Congelé" indique une température de conservation et de transport inférieure à -18 °C. La mention < 4h indique que la congélation du prélèvement doit avoir lieu dans les 4 heures suivant le prélèvement
- 4 Le délai correspond au délai maximum pour la mise à disposition du résultat. Il est calculé à partir de l'enregistrement du prélèvement par Eurofins Biomnis. Il ne tient pas compte des dimanches, jours fériés et d'une éventuelle mise en contrôle ou de l'ajout d'une analyse complémentaire
- 5 Technique utilisée pour le dosage
- 6 Cotation et référence NABM ou prix en euros des examens hors nomenclature, non remboursables et susceptibles d'être modifiés
- 7 Les analyses marquées du pictogramme  sont dites "à prix variable". Il indique que le prix de l'analyse n'est pas connu à l'enregistrement du dossier car le résultat obtenu peut entraîner le déclenchement secondaire d'analyses dites "réflexes" conformément à la NABM
- 8 Informations complémentaires (pré-analytiques ou autres) sur le paramètre et indication des documents spécifiques à joindre au prélèvement. La transmission de ces informations est essentielle à la bonne interprétation des résultats et permet de garantir un délai de rendu des résultats dans les délais impartis. Pour chaque paramètre, les documents spécifiques requis le cas échéant sont précisés et téléchargeables à partir du référentiel des examens en ligne
- 9 Indication de la référence du matériel spécifique à utiliser pour le prélèvement et disponible sur la boutique en ligne
- 10 Code Eurofins Biomnis de l'analyse permettant d'identifier précisément le paramètre. Il est conseillé d'utiliser ce code sur vos bons de demande et lors de tout contact avec Eurofins Biomnis
- 11 Les analyses marquées du pictogramme  font l'objet d'une retransmission. Les conditions pré-analytiques et le tarif sont définis sur la base des exigences

10 Hydroxy-Oxcarbazépine - sérum

TRILE

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement en taux résiduel (juste avant la prise)
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Levetiracetam; Gabapentine; Lamotrigine; Oxcarbazépine/10-OH-Carbazépine; Topiramate.

11 Désoxycorticostérone - sérum

DOC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie

 42.00 EUR non remboursable

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

11 Désoxycortisol - composé S - sérum

COMPS

2mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie

 42.00 EUR non remboursable

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

17 Hydroxy Prénégolone - sérum

17PRE

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie

 42.00 EUR non remboursable

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

17 Hydroxy Progestérone - sérum

17OHP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Radioimmunologie

 B 70 - réf 1135

 Préciser l'âge, le sexe et la phase du cycle. Le prélèvement chez la femme doit être effectué en début de phase folliculaire

17 OH progestérone - salive

17HSA

0.5mL Salive ° Congelé < 4h

-  1 mois ° ELISA
-  54.00 EUR non remboursable

-  Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

1 Hydroxypyrrène - urines

HOPY *

10mL urines échantillon ° Réfrigéré

-  22 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Fluorimétrie
-  59.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

21 Désoxycortisol - sérum

21DF

3mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie
-  42.00 EUR non remboursable

-  RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

2,5 - 3,4 - 2,4 Acides diméthylbenzoïques - urines

ACDMB *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  57.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

2,5 Hexanedione - urines

HEXA *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  77.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
Prélèvement en fin de poste de travail

 T18 : Flacon verre, bouchon PTFE pour solvants - urines (fourni sur demande)

[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum

PRPSA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 6 jours ° Enzymoimmunologie

 106.00 EUR non remboursable

 Les échantillons doivent être centrifugés et congelés dans les 3 heures suivant le prélèvement.
Pour calculer l'index phi, sont dosés [-2]proPSA, PSA libre et PSA total avec la même technologie, ce qui n'autorise pas l'intégration d'un résultat transmis de PSA libre et PSA total.

3 Alpha Androstenediol glucuronide - sérum

GADIO

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie

 59.00 EUR non remboursable

3 Hydroxy benzo[a]pyrène - métabolite benzo[a]pyrène - urines

3HBPY *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 21 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Fluorimétrie

 83.00 EUR non remboursable

 Prélèvement 16H après la fin de poste de travail sur flacon plastique

4-4' Méthylènedianiline - urines

METDI *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° HPLC/MS/MS

 72.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Conservateur : acide sulfamique (4 g)
Prélèvement en fin de poste de travail

5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines

HIA

1tube(s) Urines des 24H homogénéisées ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 60 - réf 0466

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser la diurèse (volume des urines des 24H).
Congeler rapidement après la fin du recueil.
Conservé les urines de préférence au frais durant le recueil.
REGIME ALIMENTAIRE : éviter dans les 48 heures précédant le dosage la consommation de banane, chocolat, fruits secs, agrumes, avocat, tomate, prune, kiwi, ananas et mollusques.
Ne pas transmettre de pot

 T28 : tube urines (4mL)

5 Hydroxy, N-méthylpyrrolidone - urines

5PYRO *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 21 jours °

 76.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

5' Nucléotidase - activité - sérum

5NUC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 7 - réf 1525

7 Déhydrocholestérol

7DCHO *

1mL Sérum ou liquide amniotique : CONGELE, à l'abri de la lumière ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse

 B 120 - réf 4002

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
Les prélèvements ne doivent nous parvenir que du lundi au mercredi

Abacavir - plasma

ABACA *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

ABCB1 gène : identification des variants rs2032583 et rs2235015 - sang total

ABCB1 *

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 2 semaines ° PCR temps réel

 330.00 EUR non remboursable

 Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B36 : Gène ABCB1

ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - liquide de ponction

CEAD

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 29.00 EUR non remboursable

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - sérum

CEA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 45 - réf 7327

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Acebutolol - sérum

ACEBS *

2mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 15 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Acépromazine - sérum

ACEP *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acétone - médecine du travail - urines

ACETU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme

 53.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail

Acétone - sang total

ACETO *

2mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

- 15 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
- 53.00 EUR non remboursable

- Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail

Acétylcholinestérase - liquide amniotique

ACOLA

3mL Liquide amniotique ° T° ambiante

- 14 jours ° Electrophorèse en gel de polyacrylamide
- B 150 - réf 4021

- Liquide amniotique avant centrifugation, impératif si liquide hémorragique
Joindre :
 - les renseignements sur la grossesse : date de grossesse, nombre de foetus, nombre de poches prélevées si grossesse gémellaire, signes échographiques, taux d'AFP anormalement élevé dans le test sérique de trisomie 21, traitement Dépakine®
 - la prescription médicale et le formulaire de consentement de la femme enceinte, conforme à l'arrêté du 14 janvier 2014, dûment rempli et signé

Aciclovir - plasma

ACICL *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé

- 1 semaine ° HPLC
- 47.00 EUR non remboursable

- Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Traitement du prélèvement :
 - centrifuger le prélèvement 10 mn à 4000 T/mn et à 4°C,
 - décanter
 - congeler immédiatement

Préciser la dose administrée, les heures d'administration et de prélèvement, le poids du patient. Préciser si insuffisance rénale

- Prélèvement :
- T0 avant la perfusion (taux résiduel)
 - T1H en fin de perfusion (pic)
- 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines

TTCA *

5mL Urines échantillon ° Réfrigéré

- 15 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
- 57.00 EUR non remboursable

- Prélèvement sur flacon en plastique
- T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide arginosuccinique - plasma

AARGI *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé

-  2 mois ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 120 - réf 4002

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide arginosuccinique - urines

AARGU *

10mL Urines d'une miction ° Congelé

-  2 mois ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 120 - réf 4002

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide butoxyacétique - urines

BTXU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  6 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
-  47.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement en fin de poste de travail
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide citrique - plasma séminal

CITSP

1mL Plasma séminal sur tube fluoré ° Congelé < 4h

-  15 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 175 - réf 0072 (comporte le dosage du fructose, citrate et zinc). Si réalisé seul 24.00 EUR non remboursable

-  Recueil effectué après 2 à 5 jours d'abstinence. Préciser obligatoirement le volume de l'éjaculat et le délai d'abstinence et si possible le pH, la numération des spermatozoïdes. Centrifuger et congeler immédiatement le surnageant

Acide citrique - sérum

CIT *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
-  35.00 EUR non remboursable

Acide citrique - Urines

CITU

1tube(s) Urines des 24h non acidifiées ° Congelé < 4h

 5 jours ° Spectrophotométrie

 B 30 - réf 2011

 Agiter les urines avant d'aliqoter en tube à hémolyse de 5 mL (ne pas trop le remplir)
Conserver les urines au frais pendant le recueil.
Préciser la diurèse
Hors de toute infection urinaire

 T28 : tube urines (4mL)

Acide delta aminolévulinique - urines

ALAU *

10mL Urines du matin - miction (à l'abri de la lumière) ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie - Colorimétrie

 35.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide éthoxyacétique - urines

ETHOU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme

 99.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide folique érythrocytaire - sang total

FOLE

2mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 35 - réf 1387

 Prélèvement à jeun

Acide folique sérique - sérum

FOL

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 35 - réf 1387

 Prélèvement à jeun

Acide formique - urines

FORM *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
-  64.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide glycolique - urines

GLYCU. *

10mL Urines échantillon de 24H ou miction (enfant) ° Congelé < 4h

-  3 semaines °
-  B 500 - réf 4001

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide hippurique - urines

AH *

15mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

-  1 mois ° HPLC
-  45.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide homogentisique - urines

HOMO *

10mL Urines du matin - miction (à l'abri de la lumière) ° Congelé

-  4 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  B 500 - réf 4001

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

Acide homovanillique - Urine

HVA

Adulte : 1 aliquote en tube des urines des 24H homogénéisées.
Enfant : 2 aliquotes en tube des urines d'une miction. ° Congelé < 4h

-  4 jours ° LCMSMS
-  B 80 - réf 0468 (+ B 6 - réf 0627)

-  Adulte : préciser la diurèse (volume des urines des 24H).
Congeler rapidement après la fin du recueil.
Conserver les urines de préférence au frais durant le recueil.
Le dosage de la créatinine urinaire est réalisé systématiquement
Le régime alimentaire n'est plus préconisé
Ne pas transmettre de pot
Adulte : diurèse obligatoire
-  T28 : tube urines (4mL)

Acide hyaluronique - liquide pleural

HYALP

1mL Liquide pleural ° Congelé < 4h

 4 jours ° Turbidimétrie

 39.00 EUR non remboursable

 Centrifuger rapidement, séparer le surnageant et le congeler

Acide hyaluronique - sérum

HYALS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Turbidimétrie

 B 75 - réf 7308

 Centrifuger rapidement et séparer le surnageant
Joindre les renseignements cliniques.

Acide lactique

LACT

1mL Plasma recueilli sur fluorure de sodium/oxalate de potassium ° Congelé

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 7 - réf 0530

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Congeler l'échantillon dans l'heure
Les échantillons veineux doivent être prélevés à jeûn sans utiliser de garrot. Le sang prélevé sur fluorure doit être immédiatement refroidi sur de la glace dans les 15 minutes, une centrifugation réfrigérée doit être réalisée, le plasma doit être décanté et congelé dans l'heure qui suit le prélèvement. Les prélèvements ictériques et/ou hémolysés doivent être écartés

Acide lactique - LCR

LACLC *

LCR ° Congelé

 2 semaines ° Chimie - Spectrophotométrie

 18.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

Acide mandélique - urines

MAND *

15mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 48.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail
 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide méthylcitrique - urines

AMCIT *

10mL Urines échantillon de 24H ou miction (enfant) ° Congelé < 4h

 1 semaine °

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide méthylhippurique - urines

MAH *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 42.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide méthylmalonique

MALON *

2mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 1 mois ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
Prélèvement à jeun
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide méthylmalonique - urines

MALOU *

15mL Urines du matin - miction ° Congelé < 4h

 4 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

Acide mévalonique - urines

MEVAL *

10mL Urines du matin - miction ° Congelé

 4 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
A prélever pendant la crise.

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide orotique - urines

OROU *

5mL Urines de fin de journée - miction ° Congelé

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide oxalique - sérum

OXA *

3mL Sérum ° Congelé

 1 mois ° Chimie - Spectrophotométrie

 44.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide oxalique - urines

OXAU

2tube(s) Urines des 24H acidifiées : pH compris entre 2 et 3 ° Réfrigéré

 5 jours ° Spectrophotométrie ou Chromatographie ionique

 B 30 - réf 2010

 Le dosage de l'acide oxalique nécessite impérativement:
- le recueil des urines de 24 heures, à conserver réfrigérées
- l'indication du volume de la diurèse
- l'acidification des urines par le laboratoire préleveur par l'addition d'acide chlorydrique (HCl) pour obtenir un pH urinaire compris entre 2 et 3.

En pratique, l'acidification des urines peut être réalisée de la façon suivante :

- homogénéiser la totalité de la diurèse très énergétiquement
- prélever un volume d'urines de 50 mL
- acidifier cet échantillon d'urines à l'aide d'acide chlorydrique 6N
- bien homogénéiser les urines après chaque addition d'HCl, avant chaque contrôle du pH
- mesurer le pH à l'aide d'un papier pH ou d'un pHmètre.

 T28 : tube urines (4mL)

Acide phénylglyoxylique - urines

PHEGU *

15mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 53.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail ou à la reprise
Prélèvement sur flacon en plastique

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide phytanique - plasma

APHYT *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé

 4 semaines ° Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide pipécolique - plasma

PIPES *

2mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 3 semaines °

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide pipécolique - urines

PIPEU *

10mL Urines d'une miction ° Congelé

 2 semaines °

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide pristanique - Plasma

APRIS *

4mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 4 semaines °

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acide pyruvique - Surnageant de défécate ou LCR

APYR *

Surnageant de défécate ou LCR ° Congelé

 15 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4002 (comprend le dosage de l'acide pyruvique, acide lactique, acide acétoacétique et acide 3hydroxybutyrique)

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de conservation
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Pour le dosage des lactate et pyruvate dans le LCR :
envoyer le prélèvement congelé dans l'heure
Si plusieurs défécates sont réalisés, ne pas pooler les surnageants de défécation sinon l'échantillon sera refusé pour volume anormal

Acides aminés - chromatographie

AAS

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 1 semaine ° UPLC-MS

 B 500 - réf 4001

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acides aminés - chromatographie - LCR

AALCR *

1mL LCR ° Congelé

 4 semaines ° HPLC

 B 500 - réf 4001

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)

Acides aminés - chromatographie - urine

AAU

2tube(s) Urines échantillon des premières urines du matin (à jeun) ° Congelé

 1 semaine ° UPLC-MS

 B 500 - réf 4001 (+ B 6 - réf 0627)

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul
du résultat, est réalisé systématiquement
Prélèvement à jeun

 T28 : tube urines (4mL)

Acides biliaires - chromatographie - sérum

ACBCH *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 30 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur
ionisation de flamme

 173.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acides biliaires - sérum

ACBI

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 35.00 EUR non remboursable

 En cas de traitement par l'acide urso-dexoxy-cholique
(Délursan®, Ursolvan®, Ursodiol®), le prélèvement doit
être effectué avant la prise suivante.
Prélèvement à jeun

Acides gras à très longues chaînes - C22 à C26 - plasma

GRALC *

2mL Plasma EDTA ou Hépariné ° Congelé

 4 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse

 B 500 - réf 4001

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA

GRASE

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 21 jours ° Chromatographie en phase gazeuse

 83.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Acides gras libres non estérifiés - sérum

GRAS

1mL Sérum ° Congelé

 15 jours ° Colorimétrie

 22.00 EUR non remboursable

 Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
Congeler l'échantillon dans l'heure
Joindre les renseignements cliniques

Acide sialique libre - urines

SIALI *

10mL Urines échantillon de 24H ou miction (enfant) ° Congelé < 4h

 1 mois °

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acides organiques - quantitatif - urine

ORGU

2tube(s) Urines échantillon des premières urines du matin (à jeun) ° Congelé

 1 mois ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie
de masse

 B 500 - réf 4001 (+ B 6 - réf 0627)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul
du résultat, est réalisé systématiquement
Congeler l'échantillon dans l'heure
Transmettre de préférence une miction lors d'un épisode
aigu.

 T28 : tube urines (4mL)

Acide S-Phénylmercapturique - urines

PMA *

10mL Urines de fin de poste ° Réfrigéré

 3 semaines ° HPLC/MS/MS

 63.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide trans muconique - t,t-MA - urines

MUCOU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 45.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines

TRICU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 21 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie
de masse

 97.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Acide urique

URIU

1tube(s) urines des 24H alcalinisées (pH > 8) ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 7 - réf 0622

 Urines alcalinisées avec de la soude à PH > 8
Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Acide urique - liquide biologique

URID

1mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0532

Acide urique - sérum

URIC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0532

Acide valproïque - sérum

VALP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie

 B 65 - réf 0340

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Acide vanylmandélique - Urine

VMA

Adulte : 1 aliquote en tube des urines des 24H homogénéisées.
Enfant : 2 aliquotes en tube des urines d'une miction. ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 60 - réf 0467 (+ B80 réf - 0468 et B6 réf - 0627 si enfant <18 ans)

 Adulte : préciser la diurèse (volume des urines des 24H).
Congeler rapidement après la fin du recueil.
Conserver les urines de préférence au frais durant le recueil.
Enfant (< 18 ans) :
Le dosage de la créatinine urinaire et de l'acide homovanillique (HVA) sont réalisés systématiquement.
Le régime alimentaire n'est plus préconisé
Ne pas transmettre de pot
Adulte : diurèse obligatoire

 T28 : tube urines (4mL)

ACTH - Corticotrophine

ACTH

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 95 - réf 7420

 Proscrire les prélèvements hémolysés
Si besoin de préciser un prélèvement effectué le matin ou le soir, merci de sélectionner les codes analyses spécifiques:
Prélèvement fait entre 7h et 10 h : ACTHM
Prélèvement fait le soir : ACTHS
Si prélèvement sur tube EDTA: sur tube refroidi, centrifugation réfrigérée, décantation et congélation immédiates
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

 T2 : Tube EDTA + aprotinine

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 95 - réf 7420

 Proscrire les prélèvements hémolysés
Si prélèvement sur tube EDTA: sur tube refroidi, centrifugation réfrigérée, décantation et congélation immédiates
Prévoir un tube SPECIFIQUE pour ce dosage
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

 T2 : Tube EDTA + aprotinine

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 95 - réf 7420

 Proscrire les prélèvements hémolysés
Si prélèvement sur tube EDTA: sur tube refroidi, centrifugation réfrigérée, décantation et congélation immédiates
Prévoir un tube SPECIFIQUE pour ce dosage
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

 T2 : Tube EDTA + aprotinine

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 mois ° Enzymoimmunologie

 41.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prière de libeller la demande en toutes lettres et de proscrire toute abréviation
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 jour ° Technique chromogénique

 B 30 - réf 0186

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Les prélèvements sont à réaliser à mi-distance entre 2 injections.
Préciser le traitement anticoagulant en cours (posologie) et les horaires d'injection et de prélèvement
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 jour ° Technique chromogénique

 B 30 - réf 0186

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Préciser le traitement anticoagulant en cours (posologie) et les horaires d'injection et de prélèvement
Prélèvement 3-4H après l'injection
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 jour ° Technique chromogénique

 B 30 - réf 0186

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Préciser le traitement anticoagulant en cours (posologie) et les horaires d'injection et de prélèvement
Prélèvement 3 à 4H après l'injection sous-cutanée de Lovenox®, Fragmine®, Fraxiparine®, Clivarine® ou 4 à 6H après l'injection sous-cutanée d'Innohep® ou Fraxodi®
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Activité anti-Xa : héparine standard - HNF - plasma

HEPAR

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 jour ° Technique chromogénique

 B 30 - réf 0186

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Préciser le traitement anticoagulant en cours (posologie) et les horaires d'injection et de prélèvement
Seringue électrique : horaire de prélèvement indifférent une fois l'équilibre atteint
Sous-cutanée : prélèvement à mi-distance entre 2 injections
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Acylcarnitine - profil - plasma

ACYLC *

1mL Plasma Hépariné ° Congelé

 20 jours ° Spectrométrie de masse

 B 500 - réf 4001

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Centrifuger et décanter dans l'heure suivant le prélèvement

Acylcarnitine - profil - urines

ACYLU *

Urines ° Congelé < 4h

 20 jours °

 B 500 - réf 4001

-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps

ADAL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 14 jours ° Enzymoimmunologie

 105.00 EUR non remboursable

-  Eviter les sérums lipidiques et les prélèvements congelés/décongelés plus d'une fois.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R46 : Anti-TNF)

ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand

ADAM

2 aliquotes de 1.5 à 2 mL de Plasma citraté (non CTAD) pauvre en plaquettes obtenu après double centrifugation à 1500-2000 g d'au moins 15 min (ou 2000-2500g au moins 10 minutes) entre 15 et 25°C. ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Dosage immunologique en chimiluminescence

 98.00 EUR non remboursable (activité ADAMST13) + 98.00 EUR non remboursable pour recherche des inhibiteurs si l'activité est inférieure à 10%

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R9 : Etude d'ADAMTS13)

Adéfovir - plasma

ADEF *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable (47.00 EUR non remboursable x2 si 2 dosages réalisés)

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Adénosine Désaminase - ADA

ADAD *

2mL Sérum, liquide pleural, liquide d'ascite ou LCR ° Réfrigéré

 6 semaines ° Spectrophotométrie

 34.00 EUR non remboursable

 Congelés acceptés
Proscrire les prélèvements hémolysés
Stabilité 7 jours réfrigéré

Adénovirus - diagnostic direct - PCR

ADNVB

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, Oeil, Selles, urines (premier jet, sans conservateur, 5 mL), sérum ou sang total EDTA (1 mL minimum), LCR (0.5 ml minimum), biopsie (digestive, hépatique, pulmonaire): Réfrigéré °

 3 jours ° PCR temps réel

 108.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Adénovirus - recherche - Selles

ADENS

Selles ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 4206

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Adénovirus - sérologie - sérum

ADENO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° SERION ELISA classic

 B 70 - réf 1704

Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines

SAICA *

10mL Urines échantillon de 24H ou miction ° Congelé < 4h

 8 semaines °

 B 120 - réf 4002 x 2 + B6 - réf 0627

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

ADH - Hormone antidiurétique

ADH

3mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé

 7 jours ° Radioimmunologie

 B 120 - réf 0745

 Centrifuger à température "réfrigéré"
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Congeler l'échantillon dans l'heure

ADH - Hormone antidiurétique - urine

ADHU

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Congelé < 4h

 7 jours ° Radioimmunologie

 48.00 EUR non remboursable

 T28 : tube urines (4mL)

Adiponectine - sérum

ADIPO *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 40 jours ° Enzymoimmunologie

 55.00 EUR non remboursable

 1 tube spécifique pour cette analyse
Centrifuger, décanter, congeler l'échantillon dans l'heure.

3mL Liquide amniotique ° T° ambiante

 14 jours ° Fluoroimmunologie temps résolu

 B 100 - réf 4020

 Liquide amniotique avant centrifugation, impératif si liquide hémorragique

Joindre :

- les renseignements sur la grossesse : date de grossesse, nombre de foetus, nombre de poches prélevées si grossesse gémellaire, signes échographiques, taux d'AFP anormalement élevé dans le test sérique de trisomie 21, traitement Dépakine®
- la prescription médicale et le formulaire de consentement de la femme enceinte, conforme à l'arrêté du 14 janvier 2014, dûment rempli et signé

AFP - Alpha foetoprotéine - liquide divers

AFPD

1mL Liquide divers ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 30.00 EUR non remboursable

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

AFP - Alpha foetoprotéine - sérum

AFP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 54 - réf 0320

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

AFP : Marqueur sérique maternel - 2ème trimestre de la grossesse - Sérum

AFP21

3mL Sérum (proscrire le plasma) ° Réfrigéré

 2 jours ° Fluoroimmunologie temps résolu

 B 54 - réf 0320

 Prélèvement non lipémique, non ictérique et non hémolysé. Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures. Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Garder une sérothèque jusqu'à réception du résultat. Conformément à l'arrêté du 23 juin 2009 (JO du 3 juillet 2009), joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements, la copie du compte-rendu échographique et le formulaire de consentement de la femme enceinte (modèle donné par l'arrêté du 14 janvier 2014) dûment rempli et signé par le prescripteur et la patiente.

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 2 jours ° Gel-filtration

 B 15 - réf 1154 x 2 (TDA) + B35 - réf 1141 (AGF)

 Un test direct à l'antiglobuline est systématiquement réalisé en complément
Prélever du Lundi au Mercredi

Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification

2 * 5mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 1 jour (le délai peut être porté à 2 jours en cas d'identification positive ou de réalisation de titrage/microtitrage d'anti-D, et à 2

 B 35 - réf 1141 recherche

B 65 - réf 1131 identification

B 34 - réf 1145 phénotype RH-KEL1

B 15 par antigène - réf 1146 détermination des antigènes du phénotype étendu (limite à 5 antigènes);

B 20 - réf 1156 épreuve d'absorption

B 95 - réf 1150 titrage + dosage pondéral et B 20 - réf 1149 titrage seul

B 20 - réf 1155 élution

B 15 x2 - réf 1154 test direct à l'antiglobuline (1 B15 par spécificité d'antiglobuline)

 **IMPORTANT** : Les RAI pré-transfusionnelles urgentes doivent être impérativement adressées à l'EFS. Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R3 : RAI)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Préciser l'état civil complet sur le bon de demande et le tube primaire : nom de naissance, nom marital ou nom d'usage s'il y a lieu, prénom (si prénom composé, en toutes lettres), sexe et date de naissance. Nous adresser le tube primaire

Pour identification d'anticorps anti-érythrocytaires d'emblée, joindre impérativement au dossier : résultats bruts de la RAI, panel de dépistage utilisée, et copie de la carte de groupe sanguin du patient.

ANALYSES COMPLEMENTAIRES EN CAS D'ANOMALIE BIOLOGIQUE DETECTEE : lors de l'exécution de certaines analyses, la NABM autorise le biologiste à compléter le bilan afin de caractériser ou de mieux typer une anomalie biologique, nous effectuons :

- une identification (B 65) qui est obligatoire si le test de dépistage est positif (B 39),
- les phénotypes RH-KEL1 (B 39) et/ou un phénotype étendu aux antigènes Cw, Kidd, Duffy ... (B 15 par antigène, limité à 5) qui sont systématiques, en absence de résultat valide, pour valider l'identification d'anticorps anti-érythrocytaires,
- un titrage des anticorps anti-érythrocytaires (B 20) autres que anti-A, anti-B avec un dosage pondéral pour les anti-RH (B 95), qui sont obligatoires chez toute femme enceinte pour laquelle nous avons identifié un anticorps immun,
- un test de Coombs direct pour le dépistage d'anticorps fixés sur les globules rouges (B 15 x 2), avec possible élution si nécessaire (B20)
- une épreuve d'adsorption en cas de mélange d'anticorps ou d'auto-immunisation (B 20)

Albumine

1mL sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 6 - réf 1806

 Préciser l'âge et le sexe du patient

Albumine - LCR

ALBPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 35 - réf 1614

Albumine - liquide de ponction

ALBD

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 35 - réf 1633

Alcool éthylique

ETHU

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

 2 jours ° Spectrophotométrie

 17.00 EUR non remboursable

 Conservation : les échantillons doivent être conservés dans des tubes fermés hermétiquement. Les échantillons qui contiennent un précipité doivent être centrifugés avant l'analyse.

 T28 : tube urines (4mL)

Alcool éthylique - sérum

ALCOL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 30 - réf 0534

 Pas de désinfection à l'alcool du point de prélèvement

Alcool méthylique - Sérum

METH *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Chromatographie en phase gazeuse

 B 30 - réf 0534

 Préciser le contexte clinique
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Alcool méthylique - urines

METHU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

- 18 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
- 53.00 EUR non remboursable

- Prélèvement en fin de poste de travail
- T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Aldolase - sérum

ADOLA

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

- 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie
- B 25 - réf 1513

- Prélèvement de préférence après un repos de 30 mn

Aldostérone

ALDO

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

- 2 jours ° Radioimmunologie
- B 78 - réf 0714

- Conditions optimales de prélèvement d'après SFE / SFHTA / AFCE: le matin, plus de 2 heures après le réveil, en position assise après 5 à 15 minutes, avec un apport alimentaire normal en sel, une kaliémie normale et sans antihypertenseurs interférant significativement avec le système rénine-angiotensine -aldostérone. Les médicaments antihypertenseurs qui peuvent être maintenus pendant l'exploration comprennent les alpha-bloquants et les inhibiteurs calciques. Proscrire les prélèvements hémolysés, ictériques et lipémiques
Préciser debout ou couché, merci de préciser les codes analyses spécifiques :
Prélèvement debout après 1H de déambulation : ALDOD
Prélèvement couché après 1H de décubitus : ALDOC
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Aldostérone - couché

ALDOC

1 Plasma EDTA ° Congelé < 4h

- 2 jours ° Radioimmunologie
- B 78 - réf 0714

- Proscrire les prélèvements hémolysés, ictériques et lipémiques
Préciser debout ou couché (prélèvement debout après 1H de déambulation ; prélèvement couché après 1H de décubitus)
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Aldostérone - debout ou assis

ALDOD

1 Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 2 jours ° Radioimmunologie

 B 78 - réf 0714

-  Proscrire les prélèvements hémolysés, ictériques et lipémiques
Préciser debout ou couché (prélèvement debout après 1H de déambulation ; prélèvement couché après 1H de décubitus)
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Aldostérone - urines

ALDOU

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Congelé < 4h

 5 jours ° Radioimmunologie

 B 120 - réf 0463

-  Préciser la diurèse
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

 T28 : tube urines (4mL)

Alimémazine - Sérum

ALIM *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 11 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Alpha-1 Antitrypsine - clairance

CLALF

Totalité des selles de 24H + 1 mL sérum (Plasma hépariné accepté) ° Réfrigéré

 7 jours ° Néphélométrie ou Turbidimétrie

 B 100 - réf 1415 + B 25 - réf 1629 (Recherche de sang)

-  Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures + un seul sérum prélevé dans la période des 3 jours de recueil.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi en précisant la durée du recueil
L'échantillon sérique doit IMPERATIVEMENT accompagner le prélèvement de selles (en Fast-lab 3*, les deux échantillons doivent également être transmis dans le même sachet).
Si pas de sérum joint l'analyse A1TRS: alpha 1 antitrypsine - selles sera réalisée.
Merci d'accrocher les prélèvements de selles et de sérum avec un élastique

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum

ALFA1

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Néphélométrie

 B 30 - réf 1807

 Préciser l'âge et le sexe du patient et le traitement éventuel (ALFALASTIN)

Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations p.Glu264Val et p.Glu342Lys)

A1BM

5mL 5 mL sang total EDTA : réfrigéré, 1 mL sérum : réfrigéré °

 18 jours ° PCR-RFLP

 B 500 - réf 4033

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Alpha-1 Antitrypsine - phénotype PI - sérum

PIH

2mL Sérum ° Réfrigéré

 14 jours ° Isofocalisation

 B 30 - réf 1807 + 62.00 EUR non remboursable

Alpha-1 Antitrypsine - selles - selles

A1TRS

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 7 jours ° Néphélométrie

 B 60 - réf 1416 + B 20 - réf 1629 (recherche de sang)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
La température réfrigéré limite la fermentation des selles.
Possibilité des selles de 24h, 48h, et 72h. Bien noter sur les pots de selles

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Alpha-1 Microglobuline - urines

ALFMU *

1tube(s) Urines de 2ème miction du matin ° Réfrigéré

 1 semaine ° Néphélométrie

 18.00 EUR non remboursable

 T28 : tube urines (4mL)

Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma

A2PLA

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 semaine ° Technique chromogénique

 30.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Alpha-2 Macroglobuline - sérum

ALFA2

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 25 - réf 1805

 Préciser l'âge et le sexe du patient

Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard

ALGAL *

Tâches de sang EDTA sur buvard ° T° ambiante

 6 semaines ° Spectrofluorimétrie

 B 100 - réf 4011

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de
conservation (K16P)
Stabilité 7 jours température ambiante

 K16 : Buvard

Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard

GAA *

Tâches de sang EDTA sur buvard ° T° ambiante

 6 semaines ° Spectrofluorimétrie

 B 100 - réf 4011

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de
conservation (K16P)
Stabilité 7 jours température ambiante

 K16 : Buvard

Alprazolam - Sérum

ALPR *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de
masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Alprazolam - urines

ALPRU *

1tube(s) Urines ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse - CLHP/UV-BD

 B 100 - réf 0662

 T28 : tube urines (4mL)

Aluminium

ALU

2mL Plasma héparinate de sodium, hépariné, héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 8 jours ° Absorption atomique ou ICP-MS

 B 60 - réf 1679

 Centrifuger et décanter IMPÉRATIVEMENT avant l'envoi.

 T4 : Tube héparine de sodium

Aluminium - eau - environnement - hygiène hospitalière - eau - Hygiène

ALUO

10mL Eau ou dialysat ° Réfrigéré

 2 jours ° Absorption atomique

 17.00 EUR TTC

 Prélèvement sur tube en plastique (polypropylène ou polystyrène) à bouchon plastique

Aluminium - urines

ALUU *

10mL Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 10 jours ° Absorption atomique

 B 60 - réf 0679

 Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

AMH - Hormone anti-Mullérienne - Enfant - sérum

AMHE

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 B 123 - réf 0793

 Réservé exclusivement pour les enfants de moins de 15 ans
Proscrire les prélèvements hémolysés
Joindre les renseignements cliniques
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

AMH - Hormone anti-Mullérienne - sérum

AMH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 B 123 - réf 0793

 Joindre les renseignements cliniques et échographiques
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Amibes telluriques genre Acanthamoeba - PCR

AMIBM *

Grattage de cornée, liquide de conservation de boîtier de lentilles de contact, liquide d'entretien de lentilles de contact ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 143.00 EUR non remboursable (Pour boîtier de lentilles : 1 cotation par compartiment)

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Amibiase - sérologie - sérum

AMIB

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Hémagglutination + ELISA

 B 90 - réf 4301

Amikacine - sérum

AMI

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Immunochimie

 B 70 - réf 1650

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)
Taux résiduel = avant injection ; Pic = 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h après injection IM

Amiodarone - sérum

AMIO

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° LCMSMS

 B 120 - réf 1678

 Congeler **IMPERATIVEMENT** dans les 4 heures
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Amisulpride - Sérum

AMISU *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Amitriptyline - Sérum

AMIT *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° GCMS
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Ammoniémie - plasma

AMMO

1mL Plasma EDTA non hémolysé, non lipémique, décanté ° Congelé < 4h

-  1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 35 - réf 0536

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les tubes, prélevés chez le patient à jeûn, doivent être complètement remplis et demeurer parfaitement bouchés. Placer immédiatement le sang sur de la glace, effectuer une centrifugation réfrigérée, décanter le plasma et congeler dans les 20 minutes suivant le prélèvement. Les prélèvements lipémiques et/ou hémolysés doivent être écartés. Prélèvement sur EDTA uniquement

Amoxapine - Sérum

AMOS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Amoxicilline - Sérum

AMOX *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° HPLC
-  47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Amphétamines confirmation - dosage sanguin

AMPHS

1mL Plasma fluoré en première intention. Plasma sur héparinate de lithium accepté. Proscrire les tubes avec gel séparateur. ° Réfrigéré

-  10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 95 - réf 1659

-  Centrifuger et décanter IMPÉRATIVEMENT avant l'envoi. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Amphétamines - confirmation - urines

AMPHC *

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  118.00 EUR non remboursable

-  Préciser le contexte clinique. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Amphétamines - dépistage - urines

AMPHU

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

-  1 jour ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
-  B 90 - réf 0659

-  Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Amphétamines - liquide gastrique

AMPHD *

15mL Liquide gastrique ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  B 90 - réf 0659

-  Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Amphotéricine B - Sérum

AMPHO *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
-  47.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Taux résiduel = avant injection ; Pic = 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h après injection IM

Amprénavir - Sérum

AMPRE *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° HPLC
-  B 120 - réf 4117

-  Prélèvement T0 (avant la prise), T1h30 et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Amylase - liquide de ponction

AMYD

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

-  2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 7 - réf 1511

Amylase - sérum

AMY

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 6 - réf 1510

Amylase - urines

AMYU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ou miction du matin ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 7 - réf 1511

-  Préciser la diurèse
-  T28 : tube urines (4mL)

Biopsie (simple et étagée), Pièce opératoire (simple et complexe), Résection curetage, Liquide de ponction articulaire ° T° ambiante



5 jours °



Utiliser la note N20 - Anatomie pathologique pour toutes informations pratiques
Se reporter au protocole de recueil et préparation des échantillons P30

Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - liquide amniotique - prénatal

DUPLA

5mL Liquide amniotique ° T° ambiante



1 semaine ° Microsatellites. Analyse de séquences fluorescentes (PCR)



B 700 - réf 4083



5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total - prénatal

DUPO

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante



1 semaine ° Microsatellites. Analyse de séquences fluorescentes (PCR)



B 500 - réf 4082



5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Angelman / Prader Willi - méthylation au locus SNRPN - prénatal

SNRPL

5mL Liquide amniotique frais ou cultivé, trophoblaste frais ou cultivé ° T° ambiante



15 jours ° Méthyl-PCR bisulfite



B 700 - réf 4083



5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

Angelman / Prader-Willi - méthylation au locus SNRPN - sang total

SNRPS

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 15 jours ° Méthyl-PCR bisulfite

 B 500 - réf 4082

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Angiostrongylus cantonensis - sérologie - sérum

AGYLU *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Western-Blot

 165.00 EUR non remboursable

Angiotensine II - plasma

ANGIO

2mL Plasma EDTA ° Congelé

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Radioimmunologie

 54.00 EUR non remboursable

 Recueillir le prélèvement sur des tubes préalablement refroidis. Centrifuger à température "Réfrigéré"
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Congeler l'échantillon dans l'heure

Anguillulose - sérologie - sérum

ANG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 B 60 - réf 1440

Anisakidose - IgE et IgG4 spécifiques - sérum

ANIS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 1204 + B 40 - réf 4362

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique B 16 - réf 1127 + B 20 - réf 0182

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est indispensable d'effectuer le prélèvement à distance de tout traitement de type héparine (HNF, HPBM, danaparoiide de sodium) rivaroxaban (XARELTO) apixaban (ELIQUIS), dabigatran (PRADAXA)
Plasma déplaqueté par double centrifugation : 2500 g 15 mn puis plasma décanté.
Ne pas confondre cette recherche avec la recherche d'anticoagulant de type lupique (code ACC/référence NABM 1020) à pratiquer dans les cas de bilans de thrombophilie, de pathologies auto-immunes et/ou de pertes foetales à répétition)

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 200 - réf 1020 . L'acte 1020 doit s'inscrire dans une approche pluridisciplinaire et être prescrit selon les recommandations en vigueur en matière de thrombophilie acquise ou bien de pathologies auto-immunes. Il devra donc être obligatoirement prescrit. Le contexte clinico-biologique de cette recherche devra être précisé par le prescripteur incluant, dans le cas d'une thrombose, les antécédents personnels et familiaux et un éventuel traitement anticoagulant en cours.

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Il est indispensable d'effectuer le prélèvement à distance de tout traitement de type héparine (HNF, HPBM, danaparoiide de sodium) (2 jours de délai), rivaroxaban (XARELTO), apixaban (ELIQUIS), dabigatran (PRADAXA) (4 à 5 jours de délai).
Plasma déplaqueté par double centrifugation : 2500 g 15 mn puis plasma décanté.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.
Le dosage doit être réalisé après un arrêt de 5 jours du traitement par les AOD

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 47.00 EUR non remboursable

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 47.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Anticoagulants oraux : Warfarine - Sérum

WARFA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
-  47.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Anticorps anti-21 Hydroxylase - sérum

21OHA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° ELISA
-  72.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-actine - typage - sérum

ACTIT

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunofluorescence
-  B 40 - réf 1467 . Conformément à la NABM, les anticorps anti-actine ne doivent être recherchés qu'en cas de positivité des anticorps anti-muscles lisses (positifs > 1/80).

 Cette analyse ne peut être réalisé que comme complément de l'analyse anticorps anti-muscles lisses (code MUSCX) et si le résultat de cette dernière est positif (> 1/80)

Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum

ADNAC

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  3 jours ° Immunofluorimétrie en flux
-  B 68 - réf 1455

Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum

FARR

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Radioimmunologie
-  B 68 - réf 1455

Anticorps anti-Annexine V - IgG - sérum**ANNEX**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie 48.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum**B2GPI**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluorimétrie en flux B 67 - réf 1460

Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum**B2GPM**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluorimétrie en flux B 67 - réf 1460

Anticorps anti-C1q - sérum**C1QAC**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie 48.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-canaux calciques - sérum**CALAC**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 15 jours ° Radioimmunologie 142.00 EUR non remboursable Analyse non réalisable sur LCR

Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - LCR**VGKPL**

300µL LCR ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum**CAPO**

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum**CARD**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie en flux B 67 - réf 1460

Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum**CARDM**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie en flux B 67 - réf 1460

Anticorps anti-cellules endothéliales - sérum**ENDOT ***

2mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Enzymoimmunologie 65.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum

CELPA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1490

Anticorps anti-collagène type II - sérum

COLB2 *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 5 semaines ° Enzymoimmunologie

 29.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum

ANCA

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1462

 Si dépistage positif, réalisation du dosage des anticorps anti-MPO et anti-PR3
Si ANCA demandés en URGENCE, merci de rajouter d'emblée les anticorps anti MPO et PR3 afin de ne pas retarder le diagnostic de vascularite.

Anticorps anti-cytosol - LC1 - confirmation - sérum

CYTOC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot

 B 40 - réf 1472 . Conformément à la NABM, la confirmation par immunodot des anticorps anti-cytosol (LC 1) ne doit être effectuée qu'en cas de positivité des anticorps anti-LC1 (positifs > =1/40).

Anticorps anti-cytosol - LC1 - dépistage - sérum

CYTO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence

 B 80 - réf 1465

 Si dépistage positif, réalisation du typage

Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et titrage - sérum**ECT**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie en flux B 68 - réf 1457 x 2

Anticorps anti-endomysium IgA - enfant - sérum**ENDAE**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 40 - réf 1830 pour l'enfant de moins de 15 ans En cas de demande d'anti-endomysium sans précision (IgA ou IgG), conformément aux recommandations ce sont les anti-endomysium IgA qui seront réalisées
Réservé exclusivement pour les enfants de moins de 15 ans

Anticorps anti-endomysium - IgA - sérum**ENDOA**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence 46.00 EUR non remboursable En cas de demande d'anti-endomysium sans précision (IgA ou IgG), conformément aux recommandations ce sont les anti-endomysium IgA qui seront réalisées

Anticorps anti-endomysium - IgG - sérum**ENDOG**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 40 - réf 1831 En cas de demande d'anti-endomysium sans précision (IgA ou IgG), conformément aux recommandations ce sont les anti-endomysium IgA qui seront réalisées

Anticorps anti-érythrocytaires Anti-RH1 titrage et microtitrage - sang total**TITD**

2 * 5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 2 jours ° Test indirect à l'antiglobuline en tube (titrage) et Test indirect à l'antiglobuline en gel-filtration (microtitrage) B 95 - réf 1150 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R3 : RAI)
Proscrire les prélèvements hémolysés

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 mois ° Radioimmunologie 59.00 EUR non remboursable Joindre les renseignements cliniques

Anticorps anti-facteur II - recherche - plasma

ANTI2

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chromométrique 34.00 EUR non remboursable + 34.00 EUR non remboursable si titrage réalisé + B25 - réf 1014 (facteur II) Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur II est réalisé pour toute demande d'anti-facteur II.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum

ACFIN

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie B 70 - réf 1491

Anticorps anti-facteur IX - recherche - plasma

ANTI9

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chromométrique B 100 - réf 1018 + B200 - réf.1019 si titrage + B50 - réf 0179 (facteur IX) Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur IX est réalisé pour toute demande d'anti-facteur IX.
Préciser le contexte : hémophile traité ou suspicion d'hémophilie acquise
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chronométrique

 B 100 - réf 1018 + B200 - réf.1019 si titrage + B50 réf 0178 (facteur VIII)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur VIII est réalisé pour toute demande d'anti-facteur VIII.
Préciser le contexte : hémophile traité ou suspicion d'hémophilie acquise
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chronométrique

 34.00 EUR non remboursable + 34.00 EUR non remboursable si titrage réalisé + B25 - réf 1016 (facteur VII)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur VII est réalisé pour toute demande d'anti-facteur VII.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chronométrique

 34.00 EUR non remboursable + 34.00 EUR non remboursable si titrage réalisé + B25 - réf 1015 (facteur V)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur V est réalisé pour toute demande d'anti-facteur V.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chronométrique



 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Le titrage de l'anticorps anti-facteur XII est automatiquement réalisé si la recherche d'anti-facteur XII est positive
Un dosage du facteur XII est réalisé pour toute demande d'anti-facteur XII.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Anticorps anti-facteur XI - recherche - plasma

ANT11

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique chronométrique

 34.00 EUR non remboursable + 34.00 EUR non remboursable si titrage réalisé + réf 0180 - B50(facteur XI)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Le titrage est réalisé pour toute recherche positive
Un dosage du facteur XI est réalisé pour toute demande d'anti-facteur XI.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Anticorps anti-GAD - LCR

GADPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot

 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-GAD - sérum

GAD

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 120 - réf 7890

 Sérum non hémolysé

Anticorps anti-glandes surrénales - sérum

SURAC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1489

Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum

GLIAA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 47.00 EUR non remboursable

 Lors du dosage des anticorps anti-gliadine IgA, si nous avons une alarme nous faisant suspecter un déficit en IgA totales, le dosage des IgA totales et le dosage des anticorps anti-transglutaminase IgG seront réalisés pour pouvoir faire le diagnostic de maladie coeliaque .

Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum**GLIAG**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie 47.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-glycolipides - LCR**GM1PL**

500µL LCR ° Réfrigéré

 4 jours ° Immunoblot 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-glycolipides - sérum**GM1**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Immunoblot 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-GP 210 - sérum**GPAC**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot B 70 - réf 1473

Anticorps anti-histones - sérum**HISAC**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie B 70 - réf 1459

Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum

HLAAC *

10mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Enzymoimmunologie et Microlymphocytotoxicité

 54 EUR pour le dépistage des classes I et II
+ 148,50 EUR par classe (I ou II) si identification sur cibles HLA combinées et/ou détermination PRA
+ 324,00 EUR par classe (I ou II) si identification sur cibles HLA isolées
Une recherche d'anticorps anti-plaquettes et anti-granuleux en situation post-transfusionnelle peut être réalisée.

 Joindre la fiche de renseignements cliniques de l'EFS
Nous acceptons les recherches d'anticorps anti-HLA uniquement dans le cadre transfusionnel et en provenance de l'Ile-de-France. Si cette demande s'inscrit dans le cadre d'un bilan avant greffe ou dans le cadre d'un suivi de greffe, ou si l'échantillon provient d'une autre région, nous ne réalisons pas l'analyse et le correspondant doit joindre l'EFS le plus proche pour connaître le lieu d'envoi du prélèvement.
La recherche des anticorps anti-HLA n'est pas acceptée dans le cadre d'avortements à répétition.

Anticorps anti-HMGCR - sérum

HMGCR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 7 jours ° Chimiluminescence

 41.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-IgA - sérum

IGAAC *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 28.00 EUR non remboursable

 2 aliquotes spécifiques pour cette analyse

Anticorps anti-Ilôts de Langerhans - ICA - sérum

ILO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 14.00 EUR non remboursable

 Sérum non hémolysé

Anticorps anti-insuline - sérum

INSAC

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Radioimmunologie

 B 150 - réf 1482

Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum**PANCR ***

2mL Sérum ° Réfrigéré

 5 semaines ° Enzymoimmunologie 55.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-LDL oxydées - IgG et/ou IgM - sérum**LDLAC ***

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 90 jours ° Enzymoimmunologie 59.00 EUR non remboursable Congeler l'échantillon dans les 2 heures.
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum**LKM**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 80 - réf 1465 Si dépistage positif, réalisation du typage

Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum**LKMC**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot B 40 - réf 1472 . Conformément à la NABM, la confirmation par immunodot des anticorps anti-LKM ne doit être effectuée qu'en cas de positivité des anticorps anti-LKM (positifs > =1/40).

Anticorps anti-MAG - sérum**MAG**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie 86.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum**PEAU**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 40 - réf 1493 + B 40 - réf 1494 Ne pas confondre avec AC anti-membrane basale glomérulaire

Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage (BPAg2/BP180, BPAg1/BP 230, desmogléine 1, desmogléine 3, Envoplakine et collagène de type VII) - sérum**BP180**

200µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° ELISA 125.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum**MBG**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie en flux B 70 - réf 1497 Ne pas confondre avec AC anti-membrane basale épidermique

Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum**MITO**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 80 - réf 1465 Si dépistage positif, réalisation du typage

Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum**MITOT**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot B 180 - réf 1471 . Conformément à la NABM, le typage des anticorps anti-mitochondries ne doit être effectué qu'en cas de positivité des anticorps anti-mitochondries (positifs > =1/80).

Anticorps anti- MOG - LCR**MOGPL**

300µL LCR ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable Pas de poudrier ou pot à urine accepté pour les prélèvements de LCR

Anticorps anti- MOG - sérum**MOG**

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum**MPO**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie en flux B 70 - réf 1463

Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum**MUSCL**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 80 - réf 1465 Si dépistage positif, réalisation du typage

Anticorps anti-muscle strié - sérum**MUSTR**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 40 - réf 1498 Proscrire les prélèvements hémolysés et lipémiques

Anticorps anti-MuSK - sérum

MUSK

1mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Enzymoimmunologie

 100.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-myéline - sérum

ACMYE

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1498

Anticorps anti-Natalizumab - sérum

TYSA *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 Acte gratuit. (Prise en charge par le laboratoire pharmaceutique BioGen)

 Prélever 4 semaines après la dernière injection de Natalizumab. Joindre IMPERATIVEMENT le formulaire de demande de recherche des anticorps anti-Natalizumab intégralement rempli.

Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - LCR

NMOPL

300µL LCR ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 139.00 EUR non remboursable

 Pas de poudrier ou pot à urine accepté pour les prélèvements de LCR

Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum

NMOAC

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR

YOPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 100.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum

YOHU

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 100.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-Neuropile - LCR

ACPIL *

1mL LCR ° Réfrigéré

 45 jours ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifiques (R60 : anticorps anti neuronaux)
Pas de poudrier ou pot à urine pour les prélèvements de LCR

Anticorps anti-nucléaires - sérum

AAN

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence B 39 - réf 1453 Si positif, recherche d'Ac anti-ENA et ADN natif

Anticorps anti-nucléosome - sérum

NUCAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorimétrie 48.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-ovaires - sérum

OVAC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1495

Anticorps anti-pancréas exocrine - sérum

PANAC *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1498

 Ne pas confondre avec pancréas endocrine = ilots de Langerhans

Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum

CITRA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 56 - réf 1827

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma

PF4

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Technique immunologique automatisée en chimiluminescence

 B 150 - réf 1024

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R19 : TIH)
Nous transmettre si possible le score de probabilité clinicobiologique (par ex : score 4T)
Indiquer spécifiquement si il s'agit d'une recherche dans un contexte de suspicion de VITT post-vaccination COVID 19
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgG - sérum

PHETG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 67 - réf 1460

Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgM - sérum

PHETH

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 67 - réf 1460

Anticorps anti-phospholipides - sérum

PHAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours °

 B 67 - réf 1460 x 3

 Comprend le dosage individuel des anticorps anti-cardiolipine IgG et IgM et bêta 2 glycoprotéine 1 IgG et IgM

Anticorps anti-PLA2R - sérum

PLA2R

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence

 55.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification

IPLAQ *

15 mL Sang total EDTA (pour le dosage des anti-plaquettes fixés)

5 mL Sérum (pour le dosage des anti-plaquettes libres) ° T° ambiante

 20 jours ° MAIPA direct et indirect (analyse immunoenzymatique) / Cytométrie en flux et biologie

 B 100 - réf 1478 dépistage des anti-plaquettes fixés

B100 x 3 - réf 1479 identification des anti-plaquettes fixés

B100 - réf 0162 dépistage des anti-plaquettes libres

B300 - réf 0163 identification des anti-plaquettes libres

Analyses complémentaires pouvant être réalisées :

B200 - réf 0160 si phénotypage plaquettaire dans les systèmes HPA-1,3 et 5 (code HPA)

360 EUR si Génotypage plaquettaire étendu dans les systèmes HPA-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 et 15(code GPE)

Si Génotypage plaquettaire dans les systèmes rares (code GRARE) :

360 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP Ialla

360 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP IIbIIIa

360 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP IbIX

B300 - réf 0163 si recherche complémentaire d'anticorps antiplaquettaires dans le système HPA-15 (Code PLAQ2)

B300 - réf 0163 si recherche complémentaire d'anticorps antiplaquettaires dans le système HPA-2,4 GPIV (Code PLAQ3)

B1500 - réf 4096 si génotypage plaquettaire foetal non invasif (code GPFOE)

 Prélever du Lundi au Jeudi
Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques spécifique (R44 : Immunologie plaquettaire ou R45 : Exploration de Thrombopénie foetale/néonatale, pour les nouveaux-nés)
ATTENTION : si plaquettes inf. à 20 giga/L, prélever 40 mL de sang total EDTA, mais le test est de réalisation difficile

Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles

GRAAC *

3mL Sérum sur tube avec séparateur ou sérum sur tube décanté ° Congelé < 4h

-  8 mois ° Technique de granuloagglutination(GAT) et immunofluorescence indirecte (GIFT)
-  B 100 - réf 0164 x 2 (dépistage) / B 300 - réf 0165 x 2 (identification) + 54 EUR (si recherche Anticorps anti-HLA)/ B200 - réf 0161

-  La date de naissance du patient doit être visible sur l'étiquette identifiant le prélèvement. Préciser le nom du préleveur

Anticorps anti-pompe à protons - sérum

POPPO *

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  10 jours ° Enzymoimmunologie
-  47.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum

PR3

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  3 jours ° Immunofluorimétrie en flux
-  B 70 - réf 1463

Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum

PROAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  48.00 EUR non remboursable

-  Ne pas confondre avec les antiprothrombinases (anticoagulants circulants)

Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum

REAC

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

-  5 jours ° Radioimmunologie
-  B 100 - réf 1492

Anticorps anti-récepteur de l'asialoglycoprotéine - sérum

ASIAX *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Immunofluorescence

 55.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum

TRAKH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 75 - réf 1488

 La recherche d'autoanticorps antirécepteurs de la TSH (1488) doit être limitée aux femmes enceintes ayant ou ayant eu une maladie de Basedow ou une thyroïdite auto-immune ou au cours du suivi des sujets atteints de maladie de Basedow traités par antithyroïdiens de synthèse. ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR

NMDPL

300µL LCR ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence

 139.00 EUR non remboursable

 Pas de poudrier ou pot à urine accepté pour les prélèvements de LCR

Anticorps anti-récepteur NMDA - sérum

NMDA

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence

 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum

PTHYR *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Immunofluorescence + Radio-immunologie

 78.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-rétine-recoverine - sérum**RECOV**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-ribosomes - sérum**RIBO**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofluorescence 43.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae - IgG/IgA - sérum**ASCA**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie 64.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum**SLAC**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 56.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-SOX1 - LCR**SOX1L**

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-SOX1 - sérum**SOX1**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-SP100 - IgG - sérum**SP100**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 56.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-spermatozoïdes - recherche indirecte**SPACD**

Homme : 0.5 mL Sérum ET/OU 0.5 mL Plasma séminal - CONGELE < 1 H
Femme : 0.5 mL Sérum ET/OU 0.3 mL Glaiere cervicale - CONGELE < 1 H °

 5 semaines ° Agglutination

 Pour la femme : B280 - réf 0079 sérum et/ou glaiere cervicale. Remboursable si les 2 prélèvements sont envoyés. Si un seul prélèvement est envoyé : 47.00 EUR
Pour l'homme : B280 - réf 0077 sérum et/ou plasma séminal. Remboursable si les 2 prélèvements sont envoyés ET si la recherche d'AC anti-spermatozoïdes directe est positive et le résultat nous est communiqué.
Si la recherche d'Ac anti-spermatozoïdes directe n'a pas été réalisée ou si elle est négative : 95 EUR non remboursable.
Si un seul prélèvement est envoyé (quelque soit le résultat de la recherche d'AC anti-spermatozoïdes directe) : 47 EUR non remboursable.

 Le plasma séminal est obtenu après centrifugation du sperme 10 minutes à 800 G.

Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1, Caspr2, GABAB, mGluR1, mGluR5, GlycR1) - sérum**AMPAR ***

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 à 3 semaines ° Immunofluorescence 139.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-T3 - triiodothyronine

T3AC *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  30 jours ° Radioimmunologie
-  59.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R67 : Ac anti-hormones thyroïdiennes)
Joindre les résultats du bilan thyroïdien

Anticorps anti-T4 - thyroxine

T4AC *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  30 jours ° Radioimmunologie
-  59.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R67 : Ac anti-hormones thyroïdiennes)
Joindre les résultats du bilan thyroïdien

Anticorps anti-testicules - sérum

TESTA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence
-  B 40 - réf 1495

Anticorps anti-THSD7A - sérum

THSD7 *

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  15 jours ° Immunofluorescence
-  89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-thyroglobuline - sérum

TYRAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Electrochimiluminescence
-  B 55 - réf 1484

-  La recherche d'autoanticorps antithyroglobuline (1484) ne doit pas être réalisée de façon systématique mais chez des malades suspects de thyroïdite auto-immune malgré l'absence d'autoanticorps antimicrosomes thyroïdiens ou antithyroperoxydase, ou pour valider un dosage de thyroglobuline circulante chez un sujet atteint de carcinome thyroïdien.
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum

TPO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 60 - réf 1487

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Anticorps anti-tissus - sérum

TRIPL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° IFI-triple substrat : rein, foie, estomac

 B 80 - réf 1465

 Si dépistage positif, réalisation du typage

Anticorps anti-Titine - LCR

TITIL

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot

 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-Titine - sérum

TITIN

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot

 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum

TGLU

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 58 - réf 1828

 Lors du dosage des anticorps anti-transglutaminase IgA, si nous avons une alarme nous faisant suspecter un déficit en IgA totales, le dosage des IgA totales et le dosage des anticorps anti-transglutaminase IgG seront réalisés pour pouvoir faire le diagnostic de maladie coeliaque. Dans le diagnostic de la maladie coeliaque, les résultats sont valides si le patient a un régime "normal" (comportant du gluten) et s'il n'a pas de déficit en IgA

Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum**TGLUG**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie B 60 - réf 1829

Anticorps anti-Tr(DNER) - LCR**ACTRL**

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-Tr(DNER) - sérum**ACTR**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-TSH**TSHAC ***

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 mois ° Radioimmunologie 59.00 EUR non remboursable Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R67 : Ac anti-hormones thyroïdiennes)
Joindre les résultats du bilan thyroïdien

Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum**IA2**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence B 120 - réf 1800 Sérum non hémolysé

Anticorps anti-YOP - IgG - sérum**YOPAC**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Western-Blot 59.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-ZIC4 - LCR**ZIC4L**

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-ZIC4 - sérum**ZIC4**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot 89.00 EUR non remboursable

Anticorps anti-ZNT8 - sérum**ZNT8**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 14 jours ° Enzymoimmunologie 62.00 EUR non remboursable

Anticorps immuns du système ABO - anti-A anti-B - dépistage et titrage - sérum**ABAC ***

5mL Sérum de la mère ° Réfrigéré

 8 jours ° Hémagglutination en tube, test indirect à l'antiglobuline B 15 - réf 1151 Renseignements à fournir :
1/- groupe sanguin ABO de la mère ;
- groupe sanguin ABO du nouveau-né ;
- résultat du Coombs direct de l'enfant (sa positivité justifie la demande) ;
- renseignements cliniques : ictère néonatal
2/ renseignements cliniques : immunodépression

Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum

INFBA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 mois ° Dosage par chimiluminescence des anticorps neutralisants exprimés en TRU/mL (ten-fold reduction limit)
-  59.00 EUR non remboursable

 Joindre les renseignements cliniques

Antidépresseurs - recherche - identification - dosage - urines

ANTU *

1tube(s) Urines échantillon ° Réfrigéré

-  1 semaine ° LCMSMS
-  B 190 - réf 0668

 Préciser le contexte clinique : efficacité ou toxicité
 T28 : tube urines (4mL)

Antidépresseurs recherche - identification - sans dosage - Sérum

TRICY *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine °
-  B 190 - réf 1666

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser le contexte clinique : efficacité ou toxicité
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Antigène Beta-D-Glucan - recherche

BDGLU *

1mL Sérum décanté stérilement ou centrifugé et non décanté sur tube avec séparateur ° Congelé < 4h

-  8 jours ° Enzymoimmunologie
-  62.00 EUR non remboursable

 Sérum non lipémique, non ictérique, non hémolysé

Antigène CA 125 - liquide de ponction

C125D

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

-  1 jour ° Electrochimiluminescence
-  B 80 - réf 1823

Antigène CA 125 - sérum**CA125**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 50 - réf 7325

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène CA 15-3 - liquide de ponction**C153D**

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence 29.00 EUR non remboursable

Antigène CA 15-3 - sérum**CA153**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 50 - réf 7321

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène CA 19-9 - liquide de ponction**C199D**

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence 29.00 EUR non remboursable

Antigène CA 19-9 - sérum**CA199**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 50 - réf 7323

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène CA 50 - sérum**CA50**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie 48.00 EUR non remboursable

Antigène CA 72-4 - liquide de ponction**C724D**

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence 48.00 EUR non remboursable

Antigène CA 72-4 - sérum**CA724**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence 48.00 EUR non remboursable **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène Cyfra 21-1 - liquide de ponction**CYFD**

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence 41.00 EUR non remboursable **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène Cyfra 21-1 - sérum**CYF**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 90 - réf 0822 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - LCR

STREL

1mL LCR ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochromatographie

 40.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - urines

PNAGD

10mL Urines ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochromatographie

 40.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Fournir un prélèvement par bactérie à rechercher
Les urines sur conservateur borate sont acceptées

Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction

SCCD

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 37.00 EUR non remboursable

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antigène SCC - TA4 - sérum

SCC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 86 - réf 0812

 Proscrire les prélèvements hémolysés
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Antimoine - plasma

ANTIP *

2mL Plasma héparinate de sodium ° Réfrigéré

 3 semaines ° ICP/MS

 47.00 EUR non remboursable

 T4 : Tube héparine de sodium

Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines °

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Anti-streptodornase B - ASD B - sérum

ASDOR

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Néphélométrie

 B 20 - réf 1323 ; B40 - réf. 1324 si 2 ou plusieurs anti-enzymes streptococciques

Anti-streptolysine - ASLO - sérum

ASLO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Néphélométrie

 B 20 - réf 1323 ; B40 - réf. 1324 si 2 ou plusieurs anti-enzymes streptococciques

Antithrombine - activité fonctionnelle - plasma

AT

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chromogénique

 B 40 - réf 0189 (+ éventuellement ATAG (B40 - réf.0188) en cas de diminution)

 Préciser le traitement et les circonstances de la demande. L'héparine non fractionnée peut entraîner une diminution modérée ; celle-ci est moindre avec les HBPM. En cas de traitement, le dosage peut être réalisé. Un déficit est éliminé si l'antithrombine est normale; en cas de résultat abaissé, un contrôle sera demandé en dehors de tout traitement. Ne pas prélever un patient sous anticoagulant direct actif par voie orale. Ne pas doser l'activité de l'antithrombine si traitement en cours par anticoagulant direct actif par voie orale de type anti-Xa (XARELTO, ELIQUIS). Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT. Le dosage doit être réalisé après un arrêt de 5 jours du traitement par les AOD

Antithrombine - antigène - plasma

ATAG

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Immunoturbidimétrie
-  B 38 - réf 0188 (remboursée uniquement si AT diminuée)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.
Ne pas confondre avec l'antithrombine activité fonctionnelle, qui doit être réalisée en première intention.

Apixaban(Eliquis ®) - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma

APIX

1mL Plasma Citraté ° Congelé

-  1 jour ° Technique chromogénique
-  34.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger et décanter
Congeler l'échantillon dans l'heure
Préciser IMPERATIVEMENT la posologie de l'ELIQUIS et les horaires de prise et de prélèvement.
Les prélèvements sont à réaliser en résiduel (juste avant une prise) ou au pic d'activité (3 à 4 heures après la prise).
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Apolipoprotéine A1 - sérum

APOA

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunoturbidimétrie
-  B 7 - réf 1603

-  Prélèvement à jeun

Apolipoprotéine B - sérum

APOB

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunoturbidimétrie
-  B 7 - réf 1602

-  Prélèvement à jeun

Apolipoprotéine C3 - sérum

APOC3 *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  3 mois ° Electro-immunodiffusion différentielle
-  21.00 EUR non remboursable

Apolipoprotéine E - génotypage

APEBM *

2 * 5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 3 mois ° PCR + séquençage

 B 500 - réf 4082

 Pour les enfants, 1 tube EDTA à température ambiante suffit.
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques et l'attestation de consultation conformément à l'article R.1131-5 du décret 2008-321 du 04 avril 2008

Argent - liquide biologique

ARGD *

3mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 47.00 EUR non remboursable

Argent - plasma

ARGS *

3mL Plasma Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 47.00 EUR non remboursable

Aripiprazole

ARIPI

1mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Risperidone.

Arsenic - cheveux

ARCH *

200mg Cheveux ° T° ambiante

 25 jours ° Absorption atomique

 55.00 EUR non remboursable

 Couper une mèche de cheveux de la taille d'une allumette au ras du cuir chevelu
Placer cette mèche dans un tube en verre ou en matière plastique

Arsenic - inorganique et métabolites - urines

MASU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 15 jours ° Absorption atomique

 54.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Arsenic - liquide biologique

ASD *

10mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 34.00 EUR non remboursable

Arsenic - Plasma

ASPL *

3mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 mois ° Absorption atomique

 47.00 EUR non remboursable

Ascariose - sérologie - sérum

ASC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymologie

 B 40 - réf 4362

Aspergillose - antigène soluble - recherche - LBA

ASPLB

LBA ° Réfrigéré

 5 jours ° Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 4311

 A proscrire : prélèvement trop visqueux (peut empêcher la réalisation de l'analyse)

Aspergillose - antigène soluble - recherche - sérum

ASPAG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 4311

Aspergillose - sérologie confirmation - sérum

ASIEP

2mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4310

Aspergillose sérologie dépistage IgG - sérum

ASPER

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 4307

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Atazanavir - Sérum

ATAZ *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)

Babésiose humaine - sérologie - sérum

PIRO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Immunofluorescence

 44.00 EUR non remboursable

Baclofène - Sérum

BACL *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse - CLHP/UV-BD

 118.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Bactérie aérobie / anaérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice

CMI *

Souche fraîchement repiquée sous atmosphère adaptée ° T° ambiante

 3 à 5 jours, variable selon l'espèce ° E test, méthode en milieu liquide

 B50 (réf 5278) pour une bactérie aérobie/B70 (réf 5279) pour une bactérie anaérobie

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Bactérie aérobie - antibiogramme

ATBSM *

Souche fraîchement repiquée sous atmosphère adaptée ° T° ambiante

 1 semaine ° Diffusion en milieu Gélosé et Concentrations minimales Inhibitrices(CMI) selon la bactérie et/ou la localisation

 B 40 - réf 0269

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

Les dépistages des bactéries aérobies et anaérobies sont réalisés en même temps. L'antibiogramme est réalisé aussi si nécessaire. Le prix pourra varier en fonction du nombre de bactéries trouvées.

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Bactérie aérobie - identification

IBA *

Souche pure fraîchement repiquée ° T° ambiante

 8 à 10 jours ° Spectrométrie de masse

 B 60 - réf 0214

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Bactérie aérobie - recherche

RBA *

Prélèvements divers ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Culture sur milieux spéciaux et en atmosphère adaptée
-  B 60 - réf 0214

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Les flacons d'hémocultures ne sont pas acceptés
Les dépistages des bactéries aérobies et anaérobies sont réalisés en même temps. L'antibiogramme est réalisé aussi si nécessaire. Le prix pourra varier en fonction du nombre de bactéries trouvées.
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Bactérie anaérobie - antibiogramme

ATBAN *

Souche fraîchement repiquée sous atmosphère adaptée ° T° ambiante

-  1 semaine ° Diffusion en milieu Gélosé
-  B 60 - réf 0270

-  Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
-  S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Bactérie anaérobie - identification

IDANA *

Souche pure fraîchement repiquée ° T° ambiante

-  1 semaine ° Spectrométrie de masse
-  B 60 - réf 5292

-  Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Emballage étanche fourni sur demande
-  S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR

BACBM *

Prélèvements divers ° Réfrigéré

-  1 semaine ° PCR temps réel
-  148.00 EUR non remboursable par bactérie

-  Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche

BMR *

Souche : T° ambiante
Prélèvements divers : +4°C °

 1 semaine ° Culture sur milieux spéciaux

 B 60 - réf 0214 par demande et en cas de croissance sur milieux sélectifs, réalisation d'identification B60 réf 0214 +/- antibiogramme B40 réf 0269 (avec CMI éventuelle)

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Barbituriques - urines

BARBU

1 tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

 2 jours ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 0672

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum

GRIF

1 mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1331 : si positif, titrage B 60 - réf 1252

 Si positif, nous réalisons le titrage

Bartonellose - diagnostic direct - PCR

GRIFB

Ponction ou biopsie ganglionnaire, valve cardiaque, biopsie hépatique, sang total EDTA ou dérivés sanguins (sérum/plasma EDTA) (2 mL minimum), LCR (0,5 ml minimum), humeur aqueuse ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 108.00 EUR non remboursable

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Baryum - plasma

BARSG *

2 mL Plasma sur Héparinate de Sodium (tube spécial oligo-éléments) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 47.00 EUR non remboursable

Baryum - urines

BARU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 47.00 EUR non remboursable

 Prélèvement 16H après la fin de poste de travail sur flacon plastique

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Basophiles - test d'activation - sang total

TAB

Sang total EDTA ° T° ambiante

 Délai variable ° Cytométrie en flux

 78.00 EUR non remboursable pour un allergène testé +
56.00 EUR non remboursable par allergène supplémentaire

 Sur RDV conditions particulières, nous contacter impérativement au 04 72 80 23 86 ou 04 72 80 47 67
La quantité de prélèvement est variable selon le nombre d'allergènes à tester

BCR-ABL - gène - qualitatif

BCR

2 tubes sang total prélevé sur tube PAX gene : congelé ;
1 tube de 4 mL de sang total EDTA : ambiant °

 18 jours ° RT-PCR en temps réel en une étape. Détection de 18 transcrits de fusion BCR::ABL (e1a2, e1a3, e4a2, e4a3, e6a2, B 460 - réf 1035

 Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Stabilité 4 jours

 K10 : Tube PAX gène

BCR-ABL - gène - quantitatif

BCRQ

2 tubes sang total prélevé sur tube PAX gene ° Congelé < 4h

 10 jours ° RT-qPCR - Test Xpert BCR-ABL Ultra - Cepheid

 B 460 - réf 1035

 Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre:
- les renseignements cliniques et thérapeutiques
- le résultat de la NFS - plaquettes obligatoire
- le compte rendu de la biologie moléculaire en date du diagnostic obligatoire (si non réalisé dans notre laboratoire).

 K10 : Tube PAX gène

Bence Jones - recherche

BJ

2tube(s) Urines échantillon de 24H ou miction du matin ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofixation

 B 180 - réf 1619

 ATTENTION : recueil et transport à +4°C
Urines SANS conservateur et SANS ajout d'acide
Préciser la diurèse
Joindre les renseignements concernant l'électrophorèse et l'immunofixation sérique

 T28 : tube urines (4mL)

Benzène - sang total

BENZE *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
-  B 65 - réf 0537

-  Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE
-  T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Benzène - urines

BZU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  58.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
-  T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Benzodiazépines - identification - urines

BENIU *

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  118.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Préciser le contexte clinique
-  T28 : tube urines (4mL)

Benzodiazépines - recherche et identification - Sérum

BENZC *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  118.00 EUR non remboursable

-  Préciser le contexte clinique
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Benzodiazépines - recherche sans identification - sérum

BENZS

500µL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Immuno-enzymologie (Thermo Scientific)
-  B 70 - réf 1667

-  Les échantillons peuvent être congelés et décongelés 3 fois.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Benzodiazépines - recherche sans identification - urines

BENZU

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
-  B 70 - réf 0667

 T28 : tube urines (4mL)

Béryllium

BERYS *

2mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Absorption atomique
-  47.00 EUR non remboursable

 Prélèvement 16H après la fin de poste de travail sur flacon plastique
Proscrire tube avec gel

Béryllium - urines

BERYU *

20mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

-  3 semaines ° Absorption atomique
-  47.00 EUR non remboursable

 Prélèvement 16H après la fin de poste de travail sur flacon plastique
 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Bêta 2 Microglobuline - LCR

B2MLC

1mL LCR ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimiluminescence
-  B 35 - réf 0321

Bêta 2 Microglobuline - sérum

B2M

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimiluminescence
-  B 30 - réf 0324

 Préciser début ou fin de dialyse

Bêta 2 Microglobuline - Urines

B2MU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Congelé < 4h

 1 jour ° Chimiluminescence CLIA

 B 35 - réf 0321

 1 tube spécifique pour cette analyse
Les urines ne doivent pas être acides. Si c'est le cas, ajuster le plus rapidement possible et avant transmission, le pH entre 6 et 8 avec NaOH 1N
Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Bêta 2 Transferrine

B2TRA *

200 µL Liquide biologique + 1 mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Immunoempreinte sur gel d'agarose haute résolution

 100.00 EUR non remboursable

 Congeler immédiatement le liquide biologique
Préciser l'identité complète du patient, son lieu de naissance et son adresse
Joindre les renseignements cliniques

Bêta carotène

BCARO *

1mL Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 78.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans les 90 minutes. Domicile déconseillé
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Béta-défensine 2 - selles

BDEF2

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA

 52.00 EUR non remboursable

Bêta Galactosidase - sang total

BGAL *

10mL Sang total ° T° ambiante

 6 semaines ° Spectrofluorimétrie

 151.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur tube ACD

Béta glucosidase - Tâches de sang EDTA sur buvard

BGLUC *

Tâches de sang EDTA sur buvard ° T° ambiante

 6 semaines ° Spectrofluorimétrie

 B 100 - réf 4011

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de conservation (K16P)
Stabilité 7 jours température ambiante

 K16 : Buvard

Bevacizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

BEVA *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 142.00 EUR non remboursable

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Bictégravir - sérum

BICTE *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 4117

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Bilan protéique nutritionnel avec indice de PINI - sérum

PINI

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 30 - réf 1808 + B 19 - réf 1817

 Préciser IMPERATIVEMENT l'âge et le sexe. Cette analyse comprend : préalbumine, albumine, orosomucoïde, CRP

Bilharziose - diagnostic direct - PCR

BILBM

10mL Urines (de préférence de fin de miction matinale) ° Réfrigéré

 6 jours ° PCR

 86.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Les urines doivent être envoyés telles quelles (sans milieu de transport)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Bilharziose - sérologie confirmation - sérum**BILC**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Western-Blot B 180 - réf 4357

Bilharziose - sérologie dépistage - sérum**BIL**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Enzymoimmunologie B 50 - réf 4355 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Bilirubine - totale - libre - conjuguée - sérum**BILI**

250µL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Colorimétrie B 6 - réf 1601 + 16 EUR non remboursable Conserver à l'abri de la lumière

Bilirubine totale - sérum**BILIT**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie B 6 - réf 1601 Conserver à l'abri de la lumière

Biochimie séminale - plasma séminal**BIOSP**

1.0mL Plasma séminal sur tube fluoré ° Congelé

 15 jours ° B 175 - réf 0072 (fructose, acide citrique, zinc)+ B85 - réf 0073(alpha-glucosidase) Recueil effectué après 2 à 8 jours d'abstinence.
Préciser obligatoirement le volume de l'éjaculat et le délai d'abstinence et si possible le pH, la numération des spermatozoïdes.
Préparation de l'échantillon : centrifuger le tube à 1000 g pendant 10 mn, recueillir le surnageant (minimum 0,5 mL) dans un tube vide (en plastique ou en verre).
Congeler l'échantillon dans l'heure suivant l'heure d'émission.

Biotinidase - sérum

BIOTI *

2mL Sérum ° Congelé

 1 mois ° Colorimétrie

 B 100 - réf 4011

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Bipéridène - sérum

BIPE *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur thermoionique

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)

Bismuth - sang total

BISM *

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 10 jours ° Spectrométrie de masse couplée à un plasma induit

 39.00 EUR non remboursable

Bismuth - sérum

BISMS *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 39.00 EUR non remboursable

Bismuth - urines

BISMU *

10 Urines échantillon ° Réfrigéré

 Délai variable : contacter notre Secrétariat Médical ° Absorption atomique

 39.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Bisoprolol - sérum

BISO *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 118.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)

BNP - Brain Natriuretic Peptide - plasma

BNP

1mL Plasma EDTA non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° CMIA

 B 60 - réf 1821

 Eviter plus de 3 cycles de congélation/décongélation
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
La fiabilité du résultat nécessite impérativement le recueil
du prélèvement (plasma EDTA) sur tube plastique

Bocéprévir - plasma

VICTR *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° LCMS

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Bore - plasma

BORES *

3mL plasma ° Réfrigéré

 3 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie
d'Emission Atomique

 47.00 EUR non remboursable

Bore - urines

BOREU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie
d'Emission Atomique

 47.00 EUR non remboursable

Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum

BOINT

1 mL LCR + 1 mL Sérum (IMPERATIF) ° Réfrigéré

 4 jours ° Chimiluminescence et Immunoturbidimétrie

 un tube spécifique pour le LCR

 B 59 - réf 1301 + B 6 - réf 1806 + B 20 - réf 1815 + B 70 - réf 1615 + 34.00 EUR non remboursable

Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum

BOR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 En cas de dépistage positif ou douteux , réalisation de la confirmation par Western Blot

 B 59 - réf 1301

Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR

BORPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 34.00 EUR non remboursable

Borréliose - diagnostic direct - PCR

BORBM

Biopsie (cutanée, articulaire), liquide articulaire, liquide péricardique, LCR (0.5 mL minimum), sang total EDTA ou dérivés sanguins (sérum/plasma EDTA) (2 mL minimum) : Réfrigéré °

 3 jours ° PCR temps réel

 108.00 EUR non remboursable

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Borréliose - sérologie confirmation IgG

WBLYG

1mL Sérum, LCR ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoblot

 B 140 - réf 1302

 Selon la nomenclature, la confirmation est réalisée à l'initiative du biologiste pour tout test de dépistage douteux ou positif; Préciser le résultat du dépistage et /ou l'isotype recherché (IgG ou IgM) en raison de cotation non cumulable.

Borrélioze - sérologie confirmation IgM - sérum

WBLYM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoblot

 B 140 - réf 1302 (1 seule cotation)

 Selon la nomenclature, la confirmation est réalisée à l'initiative du biologiste pour tout test de dépistage douteux ou positif; Préciser le résultat du dépistage et /ou l'isotype recherché (IgG ou IgM) en raison de cotation non cumulable.
Sur demande précise

Brivaracétam - Sérum

BRIVA *

200µL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 jours °

 B 120 - réf 1671

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvements en taux résiduel et à l'état d'équilibre

Bromazépam - Sérum

BROMA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Brome - plasma

BROMS *

2mL Plasma sur Héparinate de Sodium (tube spécial oligo-éléments) ° Réfrigéré

 3 semaines ° Potentiométrie directe

 47.00 EUR non remboursable

Brome - urines

BROMU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Potentiométrie directe

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Brucellose - sérologie confirmation - sérum

BRUCM

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Agglutination après immunocapture

 34.00 EUR non remboursable

Brucellose - sérologie dépistage - sérum

BRUC

0.5mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Agglutination

 B 45 - réf 1305

Buflomédil - sérum

BUFLO *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 39.00 EUR non remboursable

 Préciser :

- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
- l'heure du prélèvement
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Bupivacaïne - Sérum

BUPIV *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 B 120 - réf 1678

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

1tube(s) Urines ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 90 - réf 0659

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Buprénorphine - Sérum

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 B 95 - réf 1659

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Préciser le contexte clinique
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral

2 ml Plasma citraté (centrifugation dans les 3 heures suivant le prélèvement): Congelé
+ 3 ml Sérum : Congelé °

 3 jours (1 semaine si contrôle) ° Spectrophotométrie + Néphélométrie

 B 35 - réf 1810 + 26.00 EUR non remboursable

C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Turbidimétrie

 B 35 - réf 1810

C1q - fraction du complément - sérum**C1Q**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Immuno Diffusion Radiale 26.00 EUR non remboursable

C2 - fraction du complément - sérum**CC2**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Immuno Diffusion Radiale 26.00 EUR non remboursable

C3 - fraction du complément - sérum**CC3**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 25 - réf 1811

C3 NeF - Facteur néphritique - sérum**C3NEF ***

1mL Sérum ° Réfrigéré

 6 semaines ° Immunochimie 156.00 EUR non remboursable Préciser la valeur du facteur C3

C4 - fraction du complément - sérum**CC4**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 25 - réf 1812

C5 - fraction du complément - sérum**CC5**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Immuno Diffusion Radiale 26.00 EUR non remboursable

C7 - fraction du complément - sérum**CC7 ***

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 mois ° 26.00 EUR non remboursable

C9 - fraction du complément - sérum**CC9 ***

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 mois ° Immuno Diffusion Radiale 26.00 EUR non remboursable

CABOTEGRAVIR**CABOT ***

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS B 120 - réf 4117 au taux résiduel et à l'état d'équilibre

Cadmium - Sang total**CD**

5mL Sang total hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse 39.00 EUR non remboursable

Cadmium - urines

CDU *

20mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

- 15 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse
- 39.00 EUR non remboursable

T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Caféine - Sérum

CAF *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 1 semaine ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
- B 70 - réf 1658

Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Calcitonine - liquide de ponction

CALCD

1mL Liquide de ponction ° Congelé < 4h

- 2 jours ° Chimiluminescence
- 31.00 EUR non remboursable

Congeler dans les 4h, Une seule congélation possible.
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Calcitonine - sérum

CALCI

2mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

- 1 jour ° Chimiluminescence
- B 70 - réf 1132

1 aliquote spécifique pour cette analyse.
En cas de traitement aux Inhibiteurs de la Pompe à Protons, il est conseillé de prélever avant la prise, et en cas d'arrêt possible du traitement, respecter un délai 2 semaines après arrêt
Laisser coaguler, séparer le sérum du caillot dès que possible (dans les 4H maximum) et le congeler. Une seule congélation possible
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Calcium ionisé

CAIO

5mL Sérum non décanté sur tube sec avec gel séparateur, centrifuger sans ouvrir le tube : IMPERATIF ° Congelé

- 1 jour ° Potentiométrie directe
- 25.00 EUR non remboursable

Congeler l'échantillon dans l'heure
Prélever un tube spécifique pour cette analyse
Ne pas associer à une autre analyse sur le même tube
Pas de prélèvement sur tube en verre

T5 : Tube pour calcium ionisé

Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge

CALD

Calculs biliaires, salivaires, articulaires ° T° ambiante

-  14 jours ° Analyse morphologique et spectrophotométrie infrarouge (SPIR)
-  B 100 - réf 1632

-  Envoyer l'ensemble du calcul solide préalablement lavé et séché dans un poudrier stérile ne contenant aucun composé (pas de borate en particulier)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R54 : Lithiase biliaire, salivaire, autre)

Calcul Urinaire - analyse morphologique et infrarouge

CAL

Calcul(s) ou dépôt urinaire filtré ° T° ambiante

-  14 jours ° Analyse morphologique et spectrophotométrie infrarouge (SPIR)
-  B 100 - réf 1632

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifiques (R32 : Lithiase des voies urinaires)
Envoyer l'ensemble du calcul solide préalablement lavé et séché dans un poudrier stérile ne contenant aucun composé (pas de borate en particulier). Les urines ne sont pas acceptées.

Calprotectine fécale - selles

CALP

Selles ° Réfrigéré

-  2 jours ° Enzymoimmunologie
-  68.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Utiliser des petits pots

Campylobacter - sérologie - sérum

CAMP

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  28.00 EUR non remboursable

Candida albicans - sérologie confirmation - sérum

CANDC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  3 jours ° Immunoélectrophorèse
-  B 120 - réf 4315

Candida albicans - sérologie dépistage - sérum

CAND

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Enzymoimmunologie et Hémagglutination indirecte

 B 90 - réf 4313

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Candida - antigène mannane - sérum

CANAG *

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 30 - réf 4317

Cannabis - cheveux

CANCH *

40 mg de Cheveux ° T° ambiante

 5 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 238.00 EUR non remboursable

 Cheveux : prélever si possible derrière l'apex de la tête. Réunir l'équivalent d'un stylo en diamètre avec un fil, ligoter la mèche de cheveux, couper le plus au ras du cuir chevelu. Finir d'attacher la mèche
Noter s'il s'agit d'un problème médico-légal ou judiciaire
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Cannabis confirmation - dosage sanguin

CANS

2mL Plasma fluoré en première intention. Plasma sur héparinate de lithium accepté. Proscrire les tubes avec gel séparateur. ° Réfrigéré

 4 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 95 - réf 1659

 Centrifuger et décanter IMPÉRATIVEMENT avant l'envoi. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Cannabis - confirmation - urines

CANC *

1tube(s) Urines d'une miction ° Réfrigéré

-  4 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  100.00 EUR non remboursable

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Cannabis - urines

CAN

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
-  B 90 - réf 0659

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Carbamazépine - sérum

CARB

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Immunochimie
-  B 65 - réf 0325

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Ne pas confondre avec oxcarbazépine
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

CAR - index - Salive

CAR

0.5mL 0,5 mL salive T0 (prélèvement dans salivette)
0,5 mL salive T30 (prélèvement dans salivette) ° Congelé < 4h

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Radioimmunologie
-  95.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Carnitine libre et totale - plasma

CARTL *

4mL Plasma Hépariné ° Congelé

 2 semaines ° Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

 B 120 - réf 4002

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Carnitine libre et totale - urines

CARNU *

5 mL Urines du matin - miction + 4 mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 1 mois ° Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

 B 120 - réf 4002 + B 120 - réf 4002 (carnitine plasmatique)

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R26 : Biochimie métabolique)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
Un dosage de carnitine plasmatique doit impérativement
être réalisé en parallèle.

Caroténoïdes

CAROT *

2mL Plasma Héparine de lithium (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 3 semaines ° HPLC

 118.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Carpipramine - Sérum

CARPI *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de
masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Conformément à la NABM, toute demande doit comporter
IMPERATIVEMENT :
- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la
dernière prise
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou
de toxicité)
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle
modification de posologie
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
- les renseignements posologiques (quantité administrée,
fréquence, voie d'administration)
- la fiche de suivi médical

Caryotype constitutionnel - liquide amniotique - prénatal

CLA

2 * 10mL Liquide amniotique ° T° ambiante

-  10 à 14 jours (fonction de la pousse cellulaire) ° Cytogénétique conventionnelle : Culture + Analyse chromosomique
-  B 1250 - réf 0041 ou 431.00 EUR non remboursable

-  Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

 S9P : Enveloppes pour caryotypes PARIS oranges

Caryotype constitutionnel - sang foetal - prénatal

CSF

5mL Sang foetal hépariné (tube stérile) ° T° ambiante

-  2 à 5 jours ° Cytogénétique conventionnelle : Culture + Analyse chromosomique
-  B 850 - réf 0040

-  Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

 S9P : Enveloppes pour caryotypes PARIS oranges

Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal

CSG

5mL Sang total héparinate de sodium ou lithium ° T° ambiante

-  2 semaines - 2 à 5 jours si urgence médicale ° Cytogénétique conventionnelle : Culture + Analyse chromosomique
-  B 800 - réf 0901

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B13 : Cytogénétique constitutionnelle
Prélèvements peuvent être effectués tous les jours, pas de prise de rendez-vous

Caryotype constitutionnel - trophoblaste - prénatal

CVCC

20mg Trophoblaste ° T° ambiante

-  1 à 2 jours (étude directe) - 10 à 14 jours (culture) ° Etude directe / Culture + analyse chromosomique
-  B 1250 - réf 0041

-  Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

 S9P : Enveloppes pour caryotypes PARIS oranges

5 mL Sang total Hépariné, 2 mL Moëlle osseuse, Ganglions ° T° ambiante

-  Délai selon indication :
- LA : 1 semaine
-  B 800 - réf 0906

-  Etude cytogénétique dans le cadre du Myélome : à réaliser impérativement sur moelle (pas sur sang périphérique).
Exception : Leucémie à plasmocytes : sang périphérique ou moelle osseuse.
Moëlle : 1 seringue héparinée ou ponction médullaire transférée dans un tube héparinate de lithium.
Ganglions : flacon stérile
Joindre :
 - les renseignements cliniques et thérapeutiques
 - les résultats de la NFS - Plaquettes
 - le compte rendu du myélogramme
 - le compte rendu de l'immunophénotypage
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal

Liquide amniotique frais ou cultivé, villosités choriales fraîches ou cultivées ; Sang foetal ; ° T° ambiante

-  20 jours ° SNP array
-  Nous Consulter

-  Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006
Transmettre un prélèvement EDTA maternel pour la recherche de contamination maternelle.
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche

Produit de fausse couche, produit d'aspiration, placenta, cordon, tissu foetal ° T° ambiante

-  20 jours ° SNP array
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B3:Diagnostic anténatal
Contenant : flacon stérile rempli de sérum physiologique
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Sang total EDTA ° T° ambiante

 20 jours ° SNP array

 Nous consulter

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B13 : Cytogénétique constitutionnelle

 S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Catécholamines libres

CATF

2 * 2mL Plasma héparine de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 6 jours ° LCMSMS

 B 140 - réf 0478

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Prélèvement à jeun
2 aliquotes spécifiques pour cette analyse
Prélèvement de préférence après un repos de 30 mn

Catécholamines libres - enfant - urines

CATEN

2tube(s) Urines d'une miction ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 130 - réf 0477 (+ B 6 - réf 0627)

 Code réservé à l'enfant < 18 ans (voir code spécifique pour l'adulte).
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Congeler rapidement après la fin du recueil.
Le régime alimentaire n'est plus préconisé
Ne pas transmettre de pot

 T28 : tube urines (4mL)

Catécholamines - libres - Urines

CATU

1tube(s) Urines des 24H homogénéisées ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 130 - réf 0477

 Code réservé à l'adulte à partir de 18 ans (voir code spécifique pour l'enfant).
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser la diurèse (volume des urines des 24H).
Congeler rapidement après la fin du recueil.
Conserver les urines de préférence au frais durant le recueil.
Le régime alimentaire n'est plus préconisé
Ne pas réaliser le prélèvement pendant la période de menstruation.
Ne pas transmettre de pot

 T28 : tube urines (4mL)

CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum

CBG

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 32.00 EUR non remboursable

CDG Syndrome - recherche - sérum

CDG *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 4 mois ° Western-Blot

 B 650 - réf 4003

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Céfazoline - Sérum

CEFA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Spectrométrie de masse haute résolution(UHPLC-ESI/MS)

 46.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Cefépime - sérum

CEFEP *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser :
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
- l'heure du prélèvement
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Cefotaxime - Sérum

CEFO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement le sérum. Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Préciser :
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
 - l'heure du prélèvement
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Ceftazidime - Sérum

CEFTA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Préciser la posologie , l'heure de prélèvement et l'heure d'administration : taux résiduel(juste avant l'administration)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Ceftriaxone - LCR

CEFTL *

1mL LCR ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Préciser la posologie , l'heure de prélèvement et l'heure d'administration : taux résiduel(juste avant l'administration)

Ceftriaxone - Sérum

CEFTR *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Préciser la posologie , l'heure de prélèvement et l'heure d'administration : taux résiduel(juste avant l'administration)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Celiprolol - sérum

CELIP *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Cellules de Sézary - recherche - frottis

SEZA

2 Frottis non colorés de Sang périphérique ° T° ambiante

-  3 jours ° Microscopie
-  B 100 - réf 1105

-  Joindre la numération Imymphocytaire du jour
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Certolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

CERTO *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Enzymoimmunologie
-  142.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Céroléoplasmine - sérum

CER

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunoturbidimétrie
-  B 30 - réf 1809

-  Préciser l'âge et le sexe du patient

CH50 - Complément Hémolytique total

CH50

1mL sérum ° Congelé

-  1 jour ° Immunoanalyse
-  B 30 - réf 0316

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Chaînes légères libres Kappa - sérum

KAPAL

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 46.00 EUR non remboursable (si Lambda + Kappa : 66.00 EUR non remboursable)

 Merci de nous communiquer le contexte clinique et, si possible, le résultat de l'immunofixation sérique

Chaînes légères libres Kappa - urines

KAPPU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 1 semaine ° Turbidimétrie

 46.00 EUR non remboursable /(si Lambda + Kappa : 66.00 EUR non remboursable)

 Merci de nous communiquer le contexte clinique et, si possible, le résultat de l'immunofixation sérique

 T28 : tube urines (4mL)

Chaînes légères libres Lambda - sérum

LAMBL

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 46.00 EUR non remboursable /(si Lambda + Kappa : 66.00 EUR non remboursable)

 Merci de nous communiquer le contexte clinique et, si possible, le résultat de l'immunofixation sérique

Chaînes légères libres Lambda - urines

LAMBU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 1 semaine ° Turbidimétrie

 46.00 EUR non remboursable /(si Lambda + Kappa : 66.00 EUR non remboursable)

 Merci de nous communiquer le contexte clinique et, si possible, le résultat de l'immunofixation sérique

 T28 : tube urines (4mL)

Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice

CMIMY *

Souche ° T° ambiante



 B 50 - réf 5280

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Souche pure fraîchement repiquée ° T° ambiante

-  2 à 3 semaines (5 semaines si champignon filamenteux de pousse lente) ° Culture + Examen microscopique
-  B 50 - réf 0252

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S10 : Diagnostics (triple emballage étanche)

Prélèvements divers ° Réfrigéré

-  1 semaine (1 mois si champignon filamenteux de pousse lente)
-  B 70 - réf 0253

 Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

1mL Plasma EDTA, Sérum, Urines, salive ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  B 180 - réf 5259 (si demandé avec Dengue(DENBM): B250-réf.5261 / si prélèvement sanguin et demandé avec Zika (ZIKBM): B250-réf.5267)/ si prélèvement sanguin et demandé avec Dengue(DENBM) et Zika(ZIKBM): B320-Réf. 5265)
108,00 EUR non remboursable (si prélèvements ne répondant pas aux exigences réglementaires/ renseignements cliniques non communiqués)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
Prélèvement jusqu'à J7 après le début des signes cliniques
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Pour 2022 , les départements français sous surveillance renforcée du 1 mai au 30 novembre sont :

Ain (01), Aisne (02), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Haute Corse (2B), Corse du Sud (2A), Côte d'Or (21), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Indre (36), Indre et Loire (37) , Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loire (42), Loire Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Meurthe et Moselle (54) , Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute Savoie (74), Paris (75), Seine-et-Marne (76), Yvelines (78), Deux Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val d'Oise (95).

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Chikungunya - sérologie IgG/IgM - sérum

CHIK

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 B 90 - réf 1254

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
A réaliser uniquement en phase immune, c'est-à-dire à partir de J5 après le début des signes cliniques

Chitotriosidase - activité - plasma

CHITO *

2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 1 mois °

 B 100 - réf 4011

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Chlamydia trachomatis - Détection par amplification moléculaire

TRABM

Prélèvement en tube Aptima (Hologic)- Kit K11 : Ecouvillonnage cervical, urétral, vaginal, Ecouvillonnage conjonctival, Biopsie, Stérilet. Pour les liquides suivants 200 µL minimum : Sperme, Liquide de Douglas, Liquide de Bartolin, Liquide péritonéal
Kit K14 : Auto-Prélèvement vaginal, Prélèvements et auto-prélèvements pharyngés et anaux - Kit K12 : urines du 1er jet du matin ° T° ambiante

 3 jours ° Biologie moléculaire

 B 85 - réf 5301 (1 prélèvement) / B110 - réf 5302 (2 prélèvements) / B130 - Réf 5303 (3 prélèvements)

 K11 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour prélèvements endocervicaux et urétraux
K12 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour prélèvements urinaires :
En absence de milieu APTIMA K12 : Envoyer un pot à urine stérile sans additif.
PROSCRIRE les pots munis d'aiguille ou canule de transfert intégrée.
K14 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour auto-prélèvement d'échantillons vaginaux, anaux et pharyngés.
Kit K11 : Seuls les écouvillons bleus doivent être déchargés dans le milieu APTIMA et leur tige cassée avant de refermer le tube. Kit K12 : Les urines doivent être transférées dans le milieu de transport APTIMA dans les 24 heures (2 mL). Les biopsies doivent être mises immédiatement dans le milieu M4RT ou APTIMA (Kit K11)
Ne pas utiliser les KITS K1 (milieu NEST)

Chlamydia trachomatis - sérologie IgA - sérum

TRACA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 25.00 EUR non remboursable

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum

TRACG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 40 - réf 1307

 Réalisation des IgM sur demande explicite (12.00 EUR non remboursable sauf dans le cadre d'une pneumopathie chez l'enfant de moins de 6 mois)
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Chlamydia trachomatis - sérologie IgM - sérum

TRACM

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Immunofluorescence

 21.00 EUR non remboursable Si suspicion de pneumopathie atypique chez le nouveau-né ou nourrisson, prise en charge de cette analyse, Réf.1307 - B40.

 Analyse non recommandée pour le dépistage des MST
Sur demande précise

Chlamydophila pneumoniae - diagnostic direct - PCR

CHPBM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, crachats, biopsie respiratoire, vasculaire ou cardiaque, liquide péricardique, 0.5 mL
LCR (minimum) ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 108.00 EUR non remboursable

 Mettre les biopsies dans un tube sec ou avec du milieu de transport (M4RT)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Chlamydophila pneumoniae - sérologie IgG/IgM - sérum

CHPN

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 60 - réf 1308 ; itératif B 90 - réf 3308

Chlamydomphila psittaci - sérologie IgA - sérum

PSITA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Immunofluorescence

 25.00 EUR non remboursable

 Sur demande précise

Chlamydomphila psittaci - sérologie - sérum

PSIT

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Immunofluorescence indirecte

 B 60 - réf 1309

Chlordiazépoxyde - Sérum

LIBX *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Chlorophénol - urines

CPHEN *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 20 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 78.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Chloroquine - Sérum

CHLOQ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Chlorpromazine - Sérum

LARG *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  11 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Cholestanol - plasma

CHOST *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé < 4h

-  5 semaines °
-  B 120 - réf 4002

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Cholestérol HDL - sérum

HDL

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie
-  18.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement à jeun IMPERATIF

Cholestérol LDL direct - sérum

LDL

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 18 - réf 2001

-  Prélèvement à jeun
Dans le cadre d'une exploration d'une anomalie lipidique perturbée

Cholinestérase - activité enzymatique - sérum

CHOLI

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  1 jour ° Spectrophotométrie
-  25.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Chrome

CRST *

5mL Sang total Héparinate de sodium (proscrire les tubes avec gel séparateur R005) ° Réfrigéré

 2 semaines ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

 1 tube spécifique pour cette analyse

 T4 : Tube héparine de sodium

Chrome - urines

CRU *

10mL Urines de fin de poste ° Réfrigéré

 21 jours ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Chromogranine A

CHRA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Enzymoimmunologie

 B 90 - réf 1824

 Les ipp doivent être arrêtés 2-3 semaines avant le dosage de chromogranine A

Chymotrypsine

CHYMS *

30g Totalité des selles de 24H sur un pot taré, neuf et propre ° Réfrigéré

 1 mois ° Chimie

 B 60 - réf 1628

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Remplir maximum les pots au 2/3 pour éviter une explosion par les gaz de fermentation si le pot est rempli complètement.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 1678

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 3 jours ° LCMSMS

 B 120 - réf 1376

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Proscrire l'héparine
Préciser "Résiduel ou 2H après la prise"

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser le contexte clinique : efficacité ou toxicité

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Absorption atomique

 B 140 - réf 1657

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Pour le dosage de la forme libre, veuillez contacter le Secrétariat Médical

Citalopram - sérum

CITA

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 🕒 9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
- € B 120 - réf 1665

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Citrulline

CITRP

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

- 🕒 1 semaine ° HPLC
- € 53.00 EUR non remboursable

- ⓘ Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Ne pas confondre avec anticorps anti peptides citrullinés

Clindamycine - Sérum

CLIND *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 🕒 1 semaine ° Méthode microbiologique
- € B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Clobazam - Sérum

CLOB *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 🕒 2 semaines ° GCMS
- € B 120 - réf 1671

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Clomipramine - Sérum

CLOMI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 🕒 2 semaines ° GCMS
- € B 120 - réf 1665

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Clonalité B

CLONB *

1 tube sang total EDTA ou 1 tube Moëlle sur EDTA ou Biopsie ° T° ambiante

 1 mois ° PCR Multiplex et Analyse de fragments

 330.00 EUR non remboursable

 Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat de l'immunophénotypage
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Clonalité T réarrangement clonal du TCR gamma

CLONT *

1 tube sang total EDTA ou 1 tube Moëlle sur EDTA ou Biopsie ° T° ambiante

 1 mois ° PCR Multiplex et Analyse de fragments

 495.00 EUR non remboursable

 Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat de l'immunophénotypage
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre le compte rendu anatomopathologique

Clonazépam - Sérum

CLON *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 1669

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Clorazépate - Sérum

CLORA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Clostridium difficile - Dépistage - recherche de glutamate déshydrogénase (GDH) (+toxines)

GDH

Selles fraîches ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie

 B 85 - réf 1033 : GDH (+toxines si GDH positive) / 60 EUR non remboursable si exigences particulières

 Doit être techniqué au maximum 72H après le recueil des selles si réfrigéré.

Pour le respect du délai pré-analytique, merci de prendre en compte les jours de techniques de l'analyse (lundi-vendredi non férié)

Si >72h, le prélèvement doit être congelé chez le correspondant puis envoyé en sachet violet S14. Indiquer OBLIGATOIREMENT les dates de congélation et décongélation du prélèvement.

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Clostridium difficile - toxines - recherche par PCR

CLOBM

Selles non moulées ° Réfrigéré

 1 jour ° Biologie moléculaire

 62.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Clotiazéпам - sérum

COLZP *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :

- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise

- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)

- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie

- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible

- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)

- la fiche de suivi médical

Cloxacilline - Sérum

CLOXA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Méthode microbiologique

 B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement

Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Clozapine

CLOZA

2 * 0.5mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Risperidone.

Cobalt

COST

3mL Sang total Héparinate de sodium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 15 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 39.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail

 T4 : Tube héparine de sodium

Cobalt - urines

COU *

10mL Urines de fin de poste ° Réfrigéré

 15 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 39.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Cobicistat - plasma

COBIC *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)
Prélèvement T0 (avant la prise), T2h et/ou 3h (après la prise)

Cocaïne confirmation - dosage sanguin

COCS

1mL Plasma fluoré en première intention. Plasma sur héparinate de lithium accepté. Proscrire les tubes avec gel séparateur. ° Réfrigéré

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 95 - réf 1659

 Centrifuger et décanter IMPÉRATIVEMENT avant l'envoi. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Cocaïne - confirmation - urines

COCC *

1tube(s) Urines d'une miction ° Réfrigéré

 3 semaines ° LCMS

 100.00 EUR non remboursable

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Cocaïne - dépistage - urines

COC

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)

 B 90 - réf 0659

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum

Q10

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 66.00 EUR non remboursable

 1 tube spécifique pour cette analyse

Colchicine - Sérum

COLS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 118.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Colistine - Sérum

COLIS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Spectrométrie de masse

 46.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Complexes Immuns Circulants - CIC - sérum

CIC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 1183

Complexes solubles

CSOLU

1mL Plasma Citraté (aliquote spécifique) ° Congelé < 4h

 1 jour ° Hémagglutination

 20.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Complexe tuberculosis - Détection par PCR de mutation du gène rpoB codant pour la résistance à la rifampicine

RPOB

Prélèvements pulmonaires, tissulaires, liquide de ponction
Urines (30 mL), LCR (1 mL), biopsies ° Réfrigéré

 2 jours ° PCR temps réel

 89.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Connexine 26 et 30 - Gène GJB2 et GJB6 - sang total

CNX26 *

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° Réfrigéré

 3 mois ° Séquençage

 303.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Coombs direct érythrocytaire - sang total

COOMD

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 1 jour ° Test direct à l'antiglobuline en technique gel-filtration

 B 15 - réf 1154 x 2

 Spécificités à rechercher : anti-IgG et anti-C3d

Coqueluche - Bordetella pertussis et parapertussis - diagnostic direct - PCR

COQBM

Écouvillonnage endonasal ou nasopharyngé, sécrétions bronchiques, aspiration nasopharyngée ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 140 - réf 5258 / 67.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (K13P : Coqueluche par PCR)

Analyse non pertinente si la toux est supérieure à 3 semaines

Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel (sans milieu de transport)

Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K13 : Kit de prélèvement - Diagnostic de la coqueluche par PCR

Coqueluche - sérologie

COQWB

1mL Sérum (non hémolysé, non lactescent) ou plasma quel que soit le type de d'anticoagulant.
Pas de tube de 10 mL ° Réfrigéré

 7 jours ° Enzymoimmunologie

 51.00 EUR non remboursable

Corps cétoniques - Surnageant de défécats sanguin ou LCR

CETO *

Surnageant de défécats sanguin ou LCR ° Congelé

 2 semaines ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4002 (comprend le dosage de l'acide pyruvique, acide lactique, acide acétoacétique et acide 3hydroxybutyrique)

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de conservation

Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

Pour le dosage des lactate et pyruvate dans le LCR :
envoyer le prélèvement congelé dans l'heure

Si plusieurs défécats sont réalisés, ne pas pooler les surnageants de défécation sinon l'échantillon sera refusé pour volume anormal

Corticostérone - Composé B - sérum

COS *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Enzymoimmunologie

 41.00 EUR non remboursable

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

Cortisol - Composé F - matin - salive

CORSM

1 * 0.5mL Salive prélevée dans "Salivette" ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 47.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement. RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

Cortisol - Composé F - salive

CORSA

1 * 0.5mL Salive prélevée dans "Salivette" ° Congelé < 4h

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Radioimmunologie

 47.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement. RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Cortisol - Composé F - sérum

COR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 49 - réf 0462

 Effectuer le prélèvement du matin entre 7h et 10h ou selon l'indication du prescripteur
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Cortisol - Composé F - soir - salive

CORSS

1 * 0.5mL Salive prélevée dans "Salivette" ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 47.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

Cortisol - Composé F - soir - sérum

CORS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 49 - réf 0462

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Cortisol libre - Composé F - urines

FLU

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

 3 jours ° Radioimmunologie

 B 73 - réf 0476

 Préciser la diurèse
 T28 : tube urines (4mL)

Cortisone - Composé E - plasma

CORTI *

2mL Plasma Hépariné ° Réfrigéré

 15 jours ° HPLC

 46.00 EUR non remboursable

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 15 jours ° HPLC 46.00 EUR non remboursable Préciser la diurèse
ATTENTION ne pas confondre avec le cortisol (urines):
analyse FLU T28 : tube urines (4mL)

Cotinine - urines

COTI

1tube(s) Urines d'une miction ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie 40.00 EUR non remboursable T28 : tube urines (4mL)

COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR

COVS

Ecouvillonnage nasopharyngé, aspiration nasopharyngée, Ecouvillonnage nasal, lavage nasal, LBA, prélèvement oropharyngé (uniquement chez le patient symptomatique si nasopharyngé non réalisable), salive(dont auto-prélèvement) ° Réfrigéré

 Délai variable ° GSD NovaType 484 SARS-CoV-2 NovaTec
Immunodiagnostica GmbH Mutations recherchées : E484K,
 B 76 - réf 5271 Consulter le protocole spécifique de prélèvement (KCOVID19PJ)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R55: COVID-19)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport jaune S22
Utiliser un triple emballage.
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport M4RT (REMEL)
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Autres milieux acceptés :
- Kang Jian Virus preservation medium
- UTM-RT
- Sigma VCM liquide Amies
- Transwab
- Deltaswab virus
- E-Swab
- Delatswab amies
- Xpert Viral Transport Medium
- UVT -Beckton Dickinson
- Sérum physiologique uniquement pour les écouvillons naso-pharyngés
- Wuxi Nest
La sensibilité de la PCR détectant les variants du SARS-CoV-2 peut être impactée par le milieu de transport utilisé KCOVID19: Kit pour COVID-19

1.5mL Ecouvillonnage nasopharyngé, aspiration nasopharyngée, Ecouvillonnage nasal, lavage nasal, LBA, prélèvement oropharyngé (uniquement chez le patient symptomatique si nasopharyngé non réalisable), salive(dont auto-prélèvement) ° Réfrigéré

 36h ° RT - PCR

 B 76 - réf 5271

 Consulter le protocole spécifique de prélèvement (KCOVID19PJ)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R55: COVID-19)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport jaune S22

Utiliser un triple emballage.

Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport M4RT (REMEL)

Les autres prélèvements biologiques dont le prélèvement salivaire doivent être envoyés tel quel dans un pot stérile (sans milieu de transport)

Pour le recueil de salive, se référer aux notices d'information correspondantes

Autres milieux acceptés :

- Kang Jian Virus preservation medium

- UTM-RT

- Sigma VCM liquide Amies

- Transwab

- Deltaswab virus

- E-Swab

- Delatswab amies

- Xpert Viral Transport Medium

- UVT -Beckton Dickinson

- Sérum physiologique uniquement pour les écouvillons naso-pharyngés

- Wuxi Nest

- Ecouvillon sec

En tant que laboratoire prenant en charge le patient et décidant de sous-traiter la phase analytique de cet examen à Eurofins Biomnis, le laboratoire demandeur conserve la responsabilité de la chaîne de validation dudit examen, du prélèvement au rendu de résultat aux patients et du dépôt sur la plateforme SI-DEP. Il relève donc de la responsabilité du laboratoire demandeur d'assurer la maîtrise des délais et Eurofins Biomnis ne pourra en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives aux délais de rendu.

 KCOVID19: Kit pour COVID-19

1.5mL Ecouvillonnage nasopharyngé, aspiration nasopharyngé, expectoration, LBA, aspiration bronchique, salive(dont auto-prélèvement) ou prélèvement oropharyngé(uniquement chez le patient symptomatique si nasopharyngé non réalisable), gargarisme ° Réfrigéré

 24h ° RT - PCR

 30.00 EUR non remboursable

 L'arrêté du 12 décembre 2020 précise la modification des conditions de remboursement de l'acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique Consulter le protocole spécifique de prélèvement (KCOVID19PJ)

Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R55: COVID-19)

Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport jaune S22

Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport M4RT (REMEL)

Les autres prélèvements biologiques dont le prélèvement salivaire doivent être envoyés tel quel dans un pot stérile (sans milieu de transport)

Pour le recueil de salive, se référer aux notices d'information correspondantes

Autres milieux acceptés :

- Kang Jian Virus preservation medium

- UTM-RT

- Sigma VCM liquide Amies

- Transwab

- Deltaswab virus

- E-Swab

- Delatswab amies

- Xpert Viral Transport Medium

- UVT -Beckton Dickinson

- Sérum physiologique uniquement pour les écouvillons naso-pharyngés

- Wuxi Nest

 KCOVID19: Kit pour COVID-19

COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S

GCOV

Sérum non hémolysé (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 jour ° ELISA (Test Novalisa Novatec)

 B 45 - réf 4720

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R57 : sérologie COVID-19)

A réaliser uniquement en phase immunologique , c'est-à-dire à partir de J7 - J14 après le début des signes cliniques

COVID-19 (SARS-CoV-2) - sérologie (Ig totales)

SCOHN

1mL Sérum non hémolysé (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence (Elecsys Ig totales Cobas Roche)

 13.00 EUR non remboursable

 1 tube spécifique pour cette analyse

Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R57 : sérologie COVID-19)

A réaliser uniquement en phase immunologique , c'est-à-dire à partir de J7 - J14 après le début des signes cliniques

COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N

SCOVI

1mL Sérum non hémolysé (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence (Elecsys Ig totales Cobas Roche)

 B 45 - réf 4719

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R57 : sérologie COVID-19)
A réaliser uniquement en phase immunologique, c'est-à-dire à partir de J7 - J14 après le début des signes cliniques

Coxiella burnetii - phase 1 et 2 - sérologie - sérum

COX12

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorescence

 B 120 - réf 1249 ; itératif B 180 - réf 3249

 Sur demande précise

Coxiella burnetii - sérologie - sérum

COXBU

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1316 ; si positif titrage B 60 - réf 1248

 Le titrage et la sérologie phase I et II sont déclenchés si la sérologie phase II est positive.

CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum

ICK

2mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Electrophorèse

 B 6 - réf 1520 + 42.00 EUR non remboursable

 Proscrire les prélèvements hémolysés

CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum

CKMB

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 20 - réf 1526

CPK - Créatine phosphokinase totale - sérum

CK

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 1520

Créatinine avec diurèse - urines

CRU24

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0627

 T28 : tube urines (4mL)

Créatinine - clairance

CLCRE

15 mL Urines de 24H - échantillon + 1 mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour °

 B 30 - réf 0407

 Préciser la diurèse

Créatorrhée - dosage de l'azote fécal - selles

CRETO

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 70 - réf 1624 + B 70 - réf 1622 (examen physique)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi.
Une augmentation du débit azoté peut être observée au cours des entéropathies et des diarrhées infectieuses en raison de la présence de glaire, hématies ou leucocytes.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Cross-laps

CROSS

1mL sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 69 - réf 7310

 Prélever le matin , à jeun ,(avant 9h si possible) , à la même heure pour des mesures successives
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Cross-laps - urines

CROSU

2tube(s) Urines de 1ère ou 2ème miction du matin ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 69 - réf 7310 (+ B 6 - réf 0627)

 Prélèvement à jeun
La créatininurie sera effectuée systématiquement sur le même échantillon (recommandations SFBC). Le mode de prélèvement choisi doit être conservé dans les prescriptions renouvelées

 T28 : tube urines (4mL)

CRP - Protéine C Réactive - sérum

CRP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 8 - réf 1804

CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum

CRPUS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 B 8 - réf 1804

Cryofibrinogène - recherche - plasma

CRYFB

2mL Plasma Citraté ° Réfrigéré

 8 jours ° Cryoprécipitation et si présence d'un cryoprécipité identification à l'aide d'un immun sérum anti-fibrinogène

 18.00 EUR non remboursable

 Prélèvement effectué avec un matériel à 37°C(aiguille, tube...)
Décantation après centrifugation idéalement à 37°C (proscrire centrifugeuse réfrigérée) à 3500 rpm pendant 15 min.

Cryoglobulines - identification - Sérum

CRYOI

4mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofixation

 B 160 - réf 1571

 Prélèvement à jeun
Prélèvement dans matériel à +37°C. Coagulation à l'étuve (2H à +37°C) et décantation après centrifugation (15 min à 2100g à +37°C). Conserver le sérum (3-5 mL) réfrigéré.

4mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 10 jours ° Cryoprécipitation

 B 20 - réf 1573

-  Prélèvement à jeun
Envoyer un prélèvement dédié à cette analyse et dûment identifié
Le sérum peut être conservé à +4°C au moins 3 jours. Si le sérum est obtenu un Vendredi, l'envoi peut être fait le Lundi
Prélèvement dans matériel à +37°C. Coagulation à l'étuve (2H à +37°C) et décantation après centrifugation (15 min à 2100g à +37°C). Conserver le sérum (3-5 mL) réfrigéré.
Identification réalisée automatiquement si recherche positive

Cryptococcus neoformans - antigène soluble - recherche

CRYPD *

1mL Sérum, LCR, LBA ou urine ° Réfrigéré

 3 jours ° Agglutination de particules de latex sensibilisées

 B 50 - réf 4318 + B75 - réf 4319 si titrage réalisé.

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR

MCRBM

Selles
Biopsies digestives ° Réfrigéré

 10 jours ° PCR

 108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Les selles doivent être envoyés telles quelles (sans milieu de transport).
Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube stérile avec une goutte eau phy stérile.
Proscrire tout fixateur histologique.
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Cryptosporidies - recherche

CRYPS *

Selles fraîches ° Réfrigéré

 1 semaine ° Examen microscopique après coloration après coloration de Ziehl-Neelsen modifiée

 B 60 - réf 0290

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Cuivre

CU

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 jours ° ICP/MS

 B 30 - réf 0547

 Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi.
Prélèvement hémolysé refusé

 T4 : Tube héparine de sodium

Cuivre - échangeable/libre

CUEC *

5 mL de Sérum
5 mL de plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 semaines ° ICP/MS

 110.00 EUR non remboursable

 Proscrire tube avec gel

Cuivre - urines

CUU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 1 semaine ° Absorption atomique ou Spectrométrie de masse
couplée à un plasma induit

 B 30 - réf 2008

 Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Cyamémazine - Sérum

TER *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 11 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de
masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle
prise

Cyclohexanol - urines

HEXAU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse /
Spectrométrie de masse

 83.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Cyclosérine - Sérum

CYSER *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Méthode microbiologique

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

 B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

Cystatine C - sérum

CYS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Néphélométrie

 25.00 EUR non remboursable

Cysticercose - sérologie confirmation

TENAC

1mL Sérum (pas de tube de 10 mL) ou LCR ° Réfrigéré

 7 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4323

Cysticercose - sérologie confirmation - LCR

TENAD

1mL LCR ° Réfrigéré

 7 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4323

Cysticercose - Taenia Solium - sérologie IgG - sérum

TAE

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

 B 90 - réf 4321

2tube(s) Urines échantillon des premières urines du matin
(à jeun) ° Congelé

-  1 semaine ° HPLC
-  53.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul
du résultat, est réalisé systématiquement
Prélèvement à jeun
-  T28 : tube urines (4mL)

Cytogénétique moléculaire hématologique - FISH

5 mL Sang total Hépariné, 2 mL Moëlle osseuse, Ganglions ° T° ambiante

-  2 semaines si demande de FISH isolée, sinon délai selon indication (LA : 1 semaine, SMP et SMD : 2 semaines, SLP et
-  B 500 - réf 0903 (1 sonde sur chromosomes) / B 1000 - Réf 0904 (2 sondes et plus sur chromosomes) / B 500 - Réf 0905 (sur noyaux interphasiques)

-  Etude cytogénétique dans le cadre du Myélome : à réaliser impérativement sur moelle (pas sur sang périphérique).
Exception : Leucémie à plasmocytes : sang périphérique ou moelle osseuse.
Moëlle : 1 seringue héparinée ou ponction médullaire transférée dans un tube héparinate de lithium.
Ganglions : flacon stérile
Joindre :
 - les renseignements cliniques et thérapeutiques- les résultats de la NFS - Plaquettes
 - le compte rendu du myélogramme
 - le compte rendu de l'immunophénotypage
 - le résultat du caryotype au diagnostic si non réalisé à Biomnis
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Cytologie Urinaire - urines

30mL Urines ° T° ambiante

-  3 jours ° Cytologie en milieu liquide / Coloration de Papanicolaou
- 

-  Utiliser SOIT des tubes coniques gradués de 45 mL pré-remplis avec 15 mL de liquide conservateur Cytolyt (compléter le tube avec l'urine à analyser sans ajouter d'autre fixateur, ni alcool, ni formol), SOIT un flacon sec (mettre l'urine et ajouter de l'alcool 50° (1/3 alcool pour 2/3 d'urine)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport S4
Se référer au protocole spécifique (KA2P : cytologie urinaire)
-  KA2 : Kit pour cytologie urinaire

Sang total EDTA ou dérivés sanguins (sérum/plasma EDTA), urines (5 ml), LCR (0.5 ml minimum) : résultat Quantitatif (charge virale)

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, humeur aqueuse, biopsie (dont digestive, pulmonaire, cérébrale), prélèvement génital féminin, liquide de ponction, crachat, sperme, salive, moëlle osseuse (EDTA) : résultat Qualitatif ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 150 - réf 4505 / 90.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
En revanche, les liquides biologiques ne doivent pas être dilués
Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

10mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 B 600 - réf 4065

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° ECLIA

 B 80 - réf 1260 , uniquement dans les cas suivants :
a) suspicion d'infection récente,
b) chez la femme enceinte, en cas de signes cliniques ou biologiques évocateurs ou d'anomalies échographiques,
c) chez le donneur de gamète avant le don.
55 EUR non remboursable pour les autres cas.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 60 - réf 1785 , uniquement dans les cas suivants :
Détermination du statut immunitaire dans les contextes suivants :

- a) greffe d'organes, de cellules souches et de tissus (chez le donneur et le receveur avant la greffe),
- b) avant mise sous traitement immunosuppresseur au long cours,
- c) dans le diagnostic rétrospectif d'infection congénitale à CMV chez la mère.

33 non remboursable pour les autres cas.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Sur demande précise

CytomégaloVirus - CMV - Test de mesure d'avidité des IgG - sérum

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 100 - réf 1261 , uniquement dans chez la femme enceinte, pour dater l'infection, lors d'une suspicion d'infection récente.
48 EUR non remboursable pour les autres cas.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Sur demande précise
Joindre les renseignements cliniques
Joindre les résultats sérologiques

D4A - Delta 4 androstènedione - sérum

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Radioimmunologie B 79 - réf 1134

Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma

1mL Plasma Citraté ° Congelé

 1 jour ° Technique chromatographique 34.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Préciser la posologie de Pradaxa et les horaires de prise et de prélèvement
Les prélèvements sont à réaliser en résiduel (juste avant une prise) ou au pic d'activité, 2 heures après la prise. En cas de surdosage, et de traitement par antidote (PRAXBIND), le dosage du dabigatran peut-être réalisé pour mesurer la concentration circulante résiduelle. L'état d'équilibre est obtenu à partir du 3ème jour de traitement. Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Darunavir - Sérum

DARU *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)

D-Dimères - plasma

DDI

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 60 - réf 1022

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement
citraté centrifugé et congelé selon les recommandations
pré-analytiques du GFHT.

Dengue - antigène NS1 - sérum

DENAG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochromatographie

 B 50 - réf 4273

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
Ne pas confondre avec la sérologie de la dengue(DENG)
Diagnostic précoce de la dengue, du premier au cinquième
jour après l'apparition des signes cliniques

1mL Plasma EDTA, Sérum, Urines, salive ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 180 - réf 5260 (si demandé avec Chikungunya(CHKBM): B250-réf.5261 / si prélèvement sanguin et demandé avec Zika(ZIKBM) : B250-réf.5266)/si prélèvement sanguin et demandé avec Chikungunya (CHKBM)et Zika (ZIKBM) : B320-réf.5265)
108,00 EUR non remboursable (si prélèvements ne répondant pas aux exigences réglementaires/ renseignements cliniques non communiqués)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
Prélèvement jusqu'à J7 après le début des signes cliniques
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Pour 2022 , les départements français sous surveillance renforcée du 1 mai au 30 novembre sont :
Ain (01), Aisne (02), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Haute Corse (2B), Corse du Sud (2A), Côte d'Or (21), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Indre (36), Indre et Loire (37) , Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loire (42), Loire Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Meurthe et Moselle (54) , Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute Savoie (74), Paris (75), Seine-et-Marne (76), Yvelines (78), Deux Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val d'Oise (95).

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Dengue - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

DENLA

10mL Liquide amniotique °

 1 semaine ° PCR temps réel

 178.00 EUR non remboursable

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifiques R28 (Dengue-Chikungunya-Zika) et le consentement éclairé de la patiente
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum

DENG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 90 - réf 1255

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
A réaliser uniquement en phase immune, c'est-à-dire à partir de J5 après le début des signes cliniques

1tube(s) Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 jours ° Lecture automatisée de bandelette colorimétrique (Siemens)

 18.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

 T28 : tube urines (4mL)

Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres

METS

2 * 2mL Plasma héparine de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 6 jours ° LCMSMS

 48.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Prélèvement à jeun

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines

MTAEN

2tube(s) Urines d'une miction ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 130 - réf 0477 (+ B 6 - réf 0627)

 Code réservé à l'enfant < 18 ans (voir code spécifique pour l'adulte).

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Congeler rapidement après la fin du recueil.

Le régime alimentaire n'est plus préconisé

Ne pas transmettre de pot

 T28 : tube urines (4mL)

Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines

MTANU

1tube(s) Urines des 24H homogénéisées ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 130 - réf 0477

 Code réservé à l'adulte à partir de 18 ans (voir code spécifique pour l'enfant).

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Préciser la diurèse (volume des urines des 24H).

Congeler rapidement après la fin du recueil.

Conserver les urines de préférence au frais durant le recueil.

Le régime alimentaire n'est plus préconisé

Ne pas réaliser le prélèvement pendant la période de menstruation.

Ne pas transmettre de pot

 T28 : tube urines (4mL)

(auto) prélèvement vaginal ° T° ambiante

 2 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4127 si dépistage primaire
B 100 - réf 4509, si dépistage organisé.

Prise en charge chez les femmes de 30 ans à 65 ans en dépistage primaire du CCU selon 2 modalités :
Avec une ordonnance (dépistage individuel) ou une lettre d'invitation (dépistage organisé)

 Utiliser le bon de demande spécifique B63 : Test HPV sur prélèvement ou auto-prélèvement vaginal. (FLOQSwabs® Copan fourni par nos soins)
Recapuchonner l'écouvillon après le prélèvement vaginal et ne pas le décharger dans un milieu de transport. L'écouvillon sec doit être acheminé.
En cas de résultat positif, la patiente devra faire réaliser une cytologie cervicale par son professionnel de santé, sur un nouveau prélèvement d'endocol-exocol

 K63P : Kit de prélèvement ou auto-prélèvement vaginal dans le cadre du dépistage du cancer du col de l'utérus. Ecouvillon FLOQSwabs® Copan fourni par nos soins

Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU (test secondaire ou suivi de traitement)

Ecouvillonnage endo-exocol en milieu PreservCyt® (Cytoc), BD SurePath® ° T° ambiante

 2 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4127 dépistage secondaire / B100 - réf 4509 dépistage organisé

Indications de dépistage individuel :

1. Indications de prise en charge chez les femmes de moins de 30 ans, après une cytologie cervico-utérine anormale :

- Cytologie avec atypies des cellules malpighiennes de signification indéterminée (ASC-US).
- Cytologie avec anomalie des cellules malpighiennes ne permettant pas d'éliminer une lésion malpighienne intra-épithéliale de haut grade (ASC-H). Contrôle à M12 après une cytologie avec lésions malpighiennes intra-épithéliales de bas grade (LSIL) initiale suivie d'une colposcopie normale.
- Cytologie avec atypie des cellules glandulaires (AGC) initiale.

2. Indications de prise en charge chez les femmes de 30 ans à 65 ans:

- en l'absence de cytologie cervico-utérine (examen cytologique) de dépistage préalable,
 - trois ans après la dernière cytologie cervico-utérine de dépistage avec un résultat normal,
 - puis tous les cinq ans dès lors que le résultat du test précédent était négatif; en cas de résultat positif du test HPV suivi d'une cytologie cervico-utérine avec un résultat normal, la recherche d'HPV est réitérée après un an; si cette nouvelle recherche est négative, un test HPV sera réalisé cinq ans après.
3. En suivi de traitement

 Utiliser le bon de demande spécifique B56 : CCU-HPV ou Cytologie cervicale.
Ce test est réalisé suite à un frottis ASC-US, ASC-H ou AGC, ou en suivi de traitement.
Utiliser le sachet de transport rouge S3

 K56 : Kit pour HPV

Ecouvillonnage endo-exocol en milieu PreservCyt® (Cytoc), BD SurePath® ° T° ambiante

 2 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4127 dépistage primaire/ B100 - réf 4509
dépistage organisé

Indications de dépistage individuel :

1. Indications de prise en charge chez les femmes de moins

de 30 ans, après une cytologie cervico-utérine anormale :

- Cytologie avec atypies des cellules malpighiennes de
signification indéterminée (ASC-US).

- Cytologie avec anomalie des cellules malpighiennes ne
permettant pas d'éliminer une lésion malpighienne intra-
épithéliale de haut grade (ASC-H).

- Contrôle à M12 après une cytologie avec lésions
malpighiennes intra-épithéliales de bas grade (LSIL) initiale
suivie d'une coloscopie normale.

- Cytologie avec atypie des cellules glandulaires (AGC)
initiale.

2. Indications de prise en charge chez les femmes de 30
ans à 65 ans:

- en l'absence de cytologie cervico-utérine (examen
cytologique) de dépistage préalable,

- trois ans après la dernière cytologie cervico-utérine de
dépistage avec un résultat normal,

- puis tous les cinq ans dès lors que le résultat du test
précédent était négatif; en cas de résultat positif du test
HPV suivi d'une cytologie cervico-utérine avec un résultat
normal, la recherche d'HPV est réitérée après un an; si cette
nouvelle recherche est négative, un test HPV sera réalisé
cinq ans après.

3. En suivi de traitement

 Utiliser le bon de demande spécifique B56 : CCU-HPV ou
Cytologie cervicale.

Un test cytologique reflexe sera effectué en cas de test
HPV positif.

Utiliser le sachet de transport rouge S3

 K56 : Kit pour HPV

Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS

PCRUN

Humeur aqueuse, humeur vitrée, liquide céphalo-rachidien, liquide articulaire, liquide d'ascite, liquide péricardique, liquide
pleural, os, valve, sang total EDTA, biopsie (hors organes digestifs), souche fraîchement repiquée ° Réfrigéré

 10 jours ° Séquençage NGS

 273.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Souches : utiliser uniquement S10 Diagnobox (triple
emballage étanche)- S14 : Sachets VIOLET de transport
pour PCR agents infectieux, cultures de virus,
mycobactéries

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-
Parasitologie-Mycologie

Détection toxine PVL (Staphylococcus aureus) - PCR sur souche

STABM *

Souche d'ensemencement en gélose profonde ° Réfrigéré

 1 semaine ° Détection par PCR du gène de la PVL

 149.00 EUR non remboursable

 Uniquement sur souche bactérienne
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-
Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents
infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Dextropropoxyphène - urines

PROPU *

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 B 90 - réf 0659

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

 T28 : tube urines (4mL)

DHEA - Déhydroépiandrostérone - salive

DHASA

1 * 0.5mL Salive prélevée dans "Salivette" ° Congelé < 4h

 1 mois ° ELISA

 54.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement. RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum

DHA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Radioimmunologie

 B 80 - réf 7414

 RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum

SDHA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence ou Luminescence

 B 59 - réf 1802

 1 aliquote spécifique pour cette analyse. ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRÊT indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

DHT - Dihydrotestostérone - sérum

DHT

3mL Sérum ° Réfrigéré

 6 jours ° Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie

 B 90 - réf 7415

Dialdéhyde malonique - plasma

MDA *

1mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 3 semaines ° Fluorométrie

 61.00 EUR non remboursable

 Centrifugation réfrigérée (10 minutes/2860g)
Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Diamine Oxydase (DAO) - activité - sérum

DAO

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 52.00 EUR non remboursable

Diazépam + Desméthyl Diazépam - Sérum

DIAZ *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° GCMS

 B 120 - réf 1668

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Dibécacine - Sérum

DIBE *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 jours ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 1650

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R18 : Anti-infectieux)

Dichlorométhane - sang total

DCM *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur
d'électrons

 64.00 EUR non remboursable

 Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec
bouchon PTFE

 T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total
(fourni sur demande)

Dichlorométhane - urines

DCMU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur d'électrons
-  64.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
-  T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Digoxine - sérum

DIGO

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  1 jour ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
-  B 65 - réf 0327

-  1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Diltiazem - sérum

DILTI *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  B 120 - réf 1678

-  Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
 - la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Diphtérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum

DIPH

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  7 jours ° Enzymoimmunologie
-  35.00 EUR non remboursable

2mL Sérum (à l'abri de la lumière) ° Réfrigéré

 Délai variable : contacter notre Secrétariat Médical ° HPLC

 B 100 - réf 1662

-  Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Disomie uniparentale - DUP - prénatal

Liquide amniotique cultivé, trophoblaste cultivé ° T° ambiante

 3 semaines ° Etude de microsatellites par QFPCR sur les chromosomes 7,14,15

 B 700 - réf 4083

-  5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
- Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
- Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

Disomie uniparentale - DUP - sang total

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 semaine ° Microsatellites (14, 15, 7, 11, 16, 20). Analyse de séquences fluorescentes (PCR)

 B 500 - réf 4082

-  5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
- Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
- Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Disopyramide - sérum

2mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 70 - réf 1675

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
- 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Distomatose - sérologie confirmation - sérum

DISTC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4327

Distomatose - sérologie dépistage - sérum

DISTO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Hémagglutination

 B 80 - réf 4324

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Diurétiques - recherche et dosage - urines

RDIU *

15mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Spectrométrie UV à barette de diodes

 118.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Dolutégravir - Sérum

DOLUT *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance /
Détection UV

 B 120 - réf 4117

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)

Doravirine

DORAV *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 semaines ° LCMSMS

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)

Dosulépine - Sérum

DOSUL *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Doxépine - Sérum

DOXEP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° LCMS

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Doxycycline - Sérum

DOXY *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Méthode microbiologique

 B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Drogues - recherche - urines

DROGU

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)

 B 90 - réf 0659 x 4

 Ce dosage comprend Amphétamines, Métamphétamine, Cannabis, Cocaine et Opiacés.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Dropéridol - sérum

DROPE *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Duloxétine - sérum

DULO

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 🕒 9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
- € B 120 - réf 1665

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Eau libre - clairance

CLEAU

Urines + plasma hépariné ° Réfrigéré

- 🕒 2 jours ° Cryoscopie
- € B 15 - réf 1607

- ⓘ Prélèvement à jeun
Préciser la diurèse
Préciser le temps de recueil des urines

ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine

ECAPL *

1mL Surnageant de LCR ° Congelé < 4h

- 🕒 10 jours ° Technique photométrique automatisée
- € 59.00 EUR non remboursable

- ⓘ Centrifuger le LCR et congeler le surnageant

ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - LBA

ECAD *

1mL Surnageant de LBA ° Congelé < 4h

- 🕒 1 semaine ° Radioimmunologie
- € 59.00 EUR non remboursable

- ⓘ Centrifuger le LBA et congeler le surnageant

ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - sérum

ECA

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

- 🕒 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
- € B 55 - réf 0523

- ⓘ Proscrire le plasma (notamment l'EDTA)

Echinococcose - sérologie confirmation - sérum

HYDWB

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4331

Echinococcose - sérologie dépistage - sérum

HYD

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Enzymoimmunologie et Hémagglutination

 B 90 - réf 4328

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

ECP - Eosinophil Cationic Protein

ECP

1mL Sérum sur tube avec séparateur de phase et activateur de coagulation ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 100 - réf 0823

 Proscrire le sérum hémolysé
Retourner le tube plusieurs fois sans l'agiter, ni le centrifuger.
Laisser coaguler 60 à 120 mn à température ambiante (22°C +/-1°C)
Centrifuger à 1000-1300 g pendant 10 mn à température ambiante.

Transférer le sérum dans un nouveau tube puis congeler.
La nature du tube utilisé pour le prélèvement, la durée de la coagulation et la température doivent être parfaitement contrôlées car ces paramètres affectent la concentration de l'ECP relargué dans les échantillons de sérum

Efavirenz - plasma

EFAV *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

EGFR mutation exon 18, 19, 20, 21

EGFR

Bloc tumoral en paraffine ou lames en paraffine ° T° ambiante




Ehrlichiose humaine - sérologie - sérum

EHRLI

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 52.00 EUR non remboursable

Elastase - selles

ELASS

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 120 - réf 1506

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Utiliser des petits pots
Les selles liquides sont acceptées mais le résultat d'Elastase risque d'être sous-estimé par dilution.

Electrophorèse des protéines - sérum

EPPRO

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 1 jour (2 jours si IFS) ° Electrophorèse

 B 48 - réf 0570

 A proscrire : sérum lactescent ou hémolysé
Joindre les renseignements cliniques.
ANALYSES COMPLEMENTAIRES EN CAS D'ANOMALIE BIOLOGIQUE DETECTEE : lors de l'exécution de certaines analyses, la NABM autorise le biologiste à compléter le bilan afin de caractériser ou de mieux typer une anomalie biologique, nous effectuons en cas de présence d'une bande homogène sur le tracé une immunofixation (B 200 avec électrophorèse)

Electrophorèse des protéines - urines

EPROU

2tube(s) Urines échantillon de 24H ou miction du matin ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrophorèse

 B 55 - réf 0635

 Recueil et transport réfrigérés, Urines sans conservateur et sans ajout d'acide.
Préciser la diurèse
Joindre les renseignements concernant l'électrophorèse et l'immunofixation sérique
 T28 : tube urines (4mL)

Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum

EIF

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrophorèse et Immunofixation

 B 180 - réf 1572

 A proscrire : sérum lactescent ou hémolysé

Elvitegravir - Sérum

ELVET *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)
Prélèvement T0 (avant la prise), T2h et/ou 3h (après la prise)

Emtricitabine - plasma

EMTRI *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum

TBE *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 90 - réf 1253 ; itératif B 135 - réf 3253

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R35 : Infectiologie)

Entecavir - plasma

ENTKV *

2 Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 37.00 EUR non remboursable

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Entérovirus - diagnostic direct - PCR

COXBM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, Prélèvement cutanéomuqueux, oculaire, Selles, LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 150 - réf 4504 pour LCR /136.00 EUR non remboursable pour les autres natures de prélèvement

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Entérovirus - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

COXLA

10mL Liquide amniotique °

-  1 semaine ° PCR temps réel
-  178.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques du CRMR - Centre Français des Porphyries
Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Epstein Barr Virus - EBV - charge virale - PCR

EBVQ

2 mL (minimum) Sang total EDTA ou dérivés sanguins (sérum/plasma), urines, 0.5 ml LCR (minimum) : Réfrigéré °

-  3 jours ° PCR temps réel
-  B 150 - réf 1008 pour le sang chez un patient transplanté à risque/ou présentant un syndrome lymphoprolifératif - post transplantation , 134.00 EUR non remboursable si hors recommandations

-  Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR

EBVBM

Biopsie, Rhinopharynx, Sécrétions bronchiques, LBA, Salive, humeur acqueuse ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  134.00 EUR non remboursable

-  Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

EBVLA

10mL Liquide amniotique °

-  1 semaine ° PCR en temps réel TaqMan
-  178.00 EUR non remboursable

-  Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Epstein Barr Virus - EBV - MNI test - sérum**MNI**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Agglutination B 20 - réf 3786 (Si négatif, sérologie EBV B140 - réf 1009) Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Si résultat négatif, les analyses EBVG et EBVM sont déclenchées.

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum**EAA**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence 28.00 EUR non remboursable

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum**EAG**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence 50.00 EUR non remboursable

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum**VCAA**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence 28.00 EUR non remboursable

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum**EBVG**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA B 100 - réf 1010 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum

EBV

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° EIA

 B 135 - réf 1009

Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum

EBVM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 16.00 EUR non remboursable si demande isolée

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Erythropoïétine - sérum

ERY

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 100 - réf 0763

 Proscrire l'EDTA, les prélèvements hémolysés
Prélèvement le matin entre 7h30 et 12h recommandé

Escherichia coli entéropathogènes - sérotypage/autres sérotypages - prélèvements divers

STYPB *

Prélèvements divers ° Réfrigéré



 B 40 - réf 5249

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Escitalopram - sérum

ESCIT *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 15 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélever en résiduel (avant une nouvelle prise)

Estazolam - Sérum

ESTAZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Estradiol - femme - sérum

E2F

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  3 jours ° Radioimmunologie
-  B 45 - réf 0330

Estradiol - homme/enfant - sérum

E2EH

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  3 jours ° Radioimmunologie
-  B 68 - réf 0727

-  Préciser si traitement par Fulvestrant

Estradiol - salive

E2SA

0.5mL Salive ° Congelé < 4h

-  1 mois ° ELISA
-  54.00 EUR non remboursable

-  Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

-  K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Estrone - sérum

E1CH

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Radioimmunologie
-  42.00 EUR non remboursable

Etain

ETAIN *

2mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 47.00 EUR non remboursable

Etain - urines

ETAIU *

50mL Urines échantillon de 24H ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

ETAN *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 142.00 EUR non remboursable

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Ethambutol - Sérum

ETHM *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Spectrométrie de masse haute résolution(UHPLC-ESI/MS)

 46.00 EUR non remboursable

 Préciser :
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
- l'heure du prélèvement
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Ethosuximide - sérum

ETHO *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 5 jours ° LCMSMS

 B 70 - réf 0328

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote congelé spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Ethylène glycol - sérum

EGLY *

5mL Sérum ° Congelé < 4h

- 🕒 10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
- € 47.00 EUR non remboursable

- ⓘ 1 aliquote spécifique pour cette analyse. Dans les urines, il est nécessaire de doser l'acide oxalique qui est le métabolite de l'éthylène-glycol

Ethylglucuronide - urines

ETGLU *

2mL Urines ° Congelé < 4h

- 🕒 3 semaines °
- € 47.00 EUR non remboursable

- ⓘ Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

🔗 JUK11 : kit microbiote patient

Etravirine - plasma

ETRAV *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

- 🕒 3 semaines ° LCMSMS
- € B 120 - réf 4117

- ⓘ Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise) Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines génotypage de la dihydropyrimidine deshydrogénase et phénotypage de la DPD par le dosage d'uracile

5FUTO

1 tube de sang total sur héparinate de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur): Réfrigéré
2 tubes de plasma héparinate de lithium : congelé
ou
1 tube de sang total EDTA (proscrire les tubes avec gel séparateur): Réfrigéré
2 tubes de plasma héparinate de lithium : congelé °

- 🕒 8 jours ° LAMP PCR et LCMSMS
- € B 120 - réf 0500 + 118.00 EUR non remboursable

- ⓘ Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Effectuer le prélèvement avant toute administration de fluoropyrimidines (5-FU ou capécitabine) ou à distance d'au moins une semaine de la dernière cure de chimiothérapie comportant des fluoropyrimidines
Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Congeler l'échantillon dans l'heure

Évérolimus

EVERO

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 3 jours ° LCMSMS

 B 65 - réf 1377

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)

Examen bactériologique

BAF *

Prélèvements divers ° Réfrigéré

 1 semaine °

 selon la nature du prélèvement

 Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Examen chimique - selles

CHISP

30g Selles échantillon ° Réfrigéré

 7 jours ° Examen chimique

 B 10 - réf 1500 + B20 - Réf 1629 + B10 - Réf 1419 + B40 - Réf 1501 + B40 - Réf 1502

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R29 : Coprologie fonctionnelle)

Examen cytopathologique

PATHS *

Frottis peau, muqueuse
Liquide d'ascite, plèvre, synovial, LCR
Crachats, Brossage bronchique, Aspiration bronchique, LBA
Ponction de ganglion,
Ponction de tumeur (cervicale, thyroïde, glandes salivaires)
Ponction de foie, poumon, pancréas
Ponction de sein
Ponctions étagées de foie, de poumon, de pancréas
Ponctions étagées de sein
Écoulement mammaire unilatéral, bilatéral ° T° ambiante





 Se référer au site <https://www.eurofins-pathologie.com>

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 3 jours °

 B 50 - réf 1417

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 2 jours ° Examen physique

 B 70 - réf 1622

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

 4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
 Nous consulter

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome
Joindre un prélèvement EDTA maternel à chaque demande d'exome prénatal (recherche de contamination maternelle)
Joindre également l'attestation d'information et consentement de la femme enceinte D44 ainsi que le bon de demande spécifique de diagnostic anténatal B3

 K34 : Kit Exome

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation pour la mise à disposition des données dans
-  nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome

 K34 : Kit Exome

Exome cardiogénétique

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Code RIHN : N350 ou N351 ou N352

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Joindre un prélèvement EDTA maternel à chaque demande d'exome prénatal (recherche de contamination maternelle)
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande spécifique B61 : Exome cardiogénétique

 K34 : Kit Exome

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome

 K34 : Kit Exome

Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans l'infertilité masculine

EXOI

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  1100.00 EUR non remboursable

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R51 : Caractérisation génétique de l'infertilité masculine)

 K34 : Kit Exome

Exome Malformations cardiaques congénitales

EXMCC

1 * 50mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome

 K34 : Kit Exome

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome

 K34 : Kit Exome

5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli). 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg/500ng pour le prénatal) ° T° ambiante

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B59 : Pancréatites Héréditaires

 K34 : Kit Exome

Liquide amniotique frais ou cultivé, villosités chorales fraîches ou cultivées, produit de fausse couche. °

-  4 semaines pour l'exome interprété hors analyses de confirmation et 2 semaines pour la mise à disposition des
-  Nous consulter

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
L'analyse en trio nécessite en complément un tube de sang total EDTA pour chacun des parents
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent ou prénatal, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Se référer à la note N34-Séquençage Exome
Utiliser le bon de demande spécifique B34 : Exome
Pour les analyses prénatales :
Joindre un prélèvement EDTA maternel à chaque demande d'exome prénatal (recherche de contamination maternelle)
Joindre également l'attestation d'information et consentement de la femme enceinte D44 ainsi que le bon de demande spécifique de diagnostic anténatal B3

 K34 : Kit Exome

Facteur B - fraction du complément - sérum

C3ACT *

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Néphélométrie
-  25.00 EUR non remboursable

Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) - sérum

VEGF

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chimiluminescence
-  55.00 EUR non remboursable

Facteur de croissance épidermique (EGF) - sérum

EGF

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

-  21 jours ° Chimiluminescence
-  55.00 EUR non remboursable

Facteur H - fraction du complément - sérum**FACH ***

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 10 jours ° Immuno Diffusion Radiale 25.00 EUR non remboursable 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélever sur tube sec sans gel séparateur

Facteur I - Fibrinogène - activité - plasma**FIBRI**

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique B 15 - réf 0174 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma**IMFIB**

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Immunoturbidimétrie B 40 - réf 1028 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur I - fraction du complément - sérum**FACI ***

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 4 à 6 semaines ° Immuno Diffusion Radiale 25.00 EUR non remboursable 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Facteur II - Prothrombine - activité - plasma

FAC2

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 25 - réf 1014

 1 seul tube possible pour II, V, VII, X
Le dosage des facteurs II, V, VII, X (facteurs du complexe prothrombinique) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire, traitement substitutif...) et le contexte thérapeutique éventuel.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total

F2M

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 5 jours ° LAMP PCR

 B 100 - réf 1030 (si demandé avec mutation du Facteur V - Leiden - B150 - réf.1031)

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Facteur IX - anti-hémophilique B - plasma

FAC9

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 50 - réf 0179

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 seul tube possible pour VIII, IX, XI, XII
Le dosage des facteurs VIII, IX, XI, XII (facteurs du TCA) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé.
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteurs rhumatoïdes - IgA - sérum

FRA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 48.00 EUR non remboursable

Facteurs rhumatoïdes - sérum

FR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Enzymoimmunologie (ELISA)

 B 33 - réf 1451 + B 33 - réf 1452

Facteur VIII - anti-hémophilique A - plasma

FAC8

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 50 - réf 0178

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 seul tube possible pour VIII, IX, XI, XII
Le dosage des facteurs VIII, IX, XI, XII (facteurs du TCA) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé.
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur VII - Proconvertine - plasma

FAC7

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 25 - réf 1016

 1 seul tube possible pour II, V, VII, X
Le dosage des facteurs II, V, VII, X (facteurs du complexe prothrombinique) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire, traitement substitutif...) et le contexte thérapeutique éventuel.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total

F5L

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 5 jours ° LAMP PCR

 B 100 - réf 1029 (si demandé avec mutation du Facteur II - Prothrombine, B150-réf.1031)

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 25 - réf 1015

-  1 seul tube possible pour II, V, VII, X
Le dosage des facteurs II, V, VII, X (facteurs du complexe prothrombinique) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma

WIL

2 * 1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Méthode immuno-turbidimétrique

 B 50 - réf 0192 + B 50 - réf 0178 (+ B40 - réf.1013 si l'activité est basse)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Nous transmettre le groupe sanguin ABO.
En cas de test à la desmopressine (Octim®, Minirin®), bien indiquer le délai pour chaque tube (T0, T+1h...)
Plasma déplaqueté par double centrifugation : 2000 g 15 mn
Pour une demande de diagnostic (ou recherche) de maladie de Willebrand, l'activité cofacteur de la ristocétine et l'activité coagulante du facteur VIII sont réalisées en première intention, en accord avec la nomenclature. Le dosage immunologique (facteur Willebrand antigène) peut être réalisé si le dosage fonctionnel (activité) est diminué
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.
Nous transmettre le résultat du PFA-100 si disponible

Facteur Willebrand - antigène - plasma

WILAG

2 * 1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Méthode immuno-turbidimétrique

 B 40 - réf 1013

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Nous transmettre le groupe sanguin ABO.
En cas de test à la desmopressine (Octim®, Minirin®), bien indiquer le délai pour chaque tube (T0, T+1h...)
Plasma déplaqueté par double centrifugation : 2000 g 15 mn
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.
Nous transmettre le résultat du PFA-100 si disponible

Facteur XII - Hageman - plasma

FAC12

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 40 - réf 0181

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 seul tube possible pour VIII, IX, XI, XII
Le dosage des facteurs VIII, IX, XI, XII (facteurs du TCA) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur XIII - plasma

FAC13

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Technique chromogénique

 B 50 - réf 0173

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur XI - Rosenthal - plasma

FAC11

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 50 - réf 0180

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 seul tube possible pour VIII, IX, XI, XII
Le dosage des facteurs VIII, IX, XI, XII (facteurs du TCA) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé.
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Facteur X - Stuart - plasma

FAC10

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 25 - réf 1017

 1 seul tube possible pour II, V, VII, X
Le dosage des facteurs II, V, VII, X (facteurs du complexe prothrombinique) nécessite un minimum de 2 mL de plasma citraté congelé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire, traitement substitutif...) et le contexte thérapeutique éventuel.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 5 jours ° Chimie B 350 - réf 1630

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi.
Régime enrichi par 50g de beurre les 3 jours précédant le recueil et pendant le recueil.
L'analyse "fécalogramme" comprend un examen macroscopique et microscopique des selles, le dosage des lipides et protéides, un ionogramme et un examen chimique des selles avec la recherche de sang.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Felbamate - Sérum

FELB *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Fer - capacité totale de fixation - sérum

CTST

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie 6.00 EUR non remboursable

 Sérum prélevé à jeun

Fer - coefficient de saturation - sérum

COSAT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Turbidimétrie et Spectrométrie B 17 - réf 2002

 Cette analyse comprend : fer et capacité totale de fixation
Sérum prélevé à jeun

Ferritine érythrocytaire

FTE *

5mL Sang total Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie 22.00 EUR non remboursable

 1 tube spécifique pour cette analyse
Stabilité 4 jours
Préciser les résultats de la NFS : globules rouges et hémoglobine

Ferritine glycosylée - sérum

FTGLY *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 B 19 - réf 1213 + 78.00 EUR non remboursable

-  Centrifugation directement après le prélèvement. 1 aliquote spécifique pour cette analyse. Centrifuger, décanter et conserver réfrigéré pour l'envoi. Dosage effectué si le taux de ferritine sérique est supérieur à 100 µg/L. Proscrire le plasma EDTA

Ferritine - sérum

FT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 19 - réf 1213

-  ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Fer - sérum

FE

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 3.00 EUR non remboursable

-  Sérum prélevé à jeun

Fer - urines

FEU *

5mL Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

 2 semaines ° ICP-OES

 24.00 EUR non remboursable

-  Préciser la diurèse
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

FGF 23 - Fibroblast Growth Factor 23 - Plasma

FGF23 *

2mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 4 semaines ° Enzymoimmunologie

 36.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure

3mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 5 jours ° Biochimie

 B 9 - réf 0522 + B 5 - réf 0519 + B 25 - réf 1805 + B 20 - réf 1813 + B 5 - réf 0552 + B 6 - réf 1601 + B 5 - réf 0580 + B 6 - réf 0590 + 66.00 EUR non remboursable dont 10.00 EUR pour Apolipoprotéine A

 Prélèvement à jeun
Préciser la taille et le poids du patient
Sérum à centrifuger au bout de 30 minutes après le prélèvement et décanter puis congeler rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R42 : Fibromax)

3mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 5 jours °

 B 9 - réf 0522 + B 5 - réf 0552 + B 5 - réf 0580 + B 6 - réf 0590 + B 140 - réf 1000 + 56.00 EUR non remboursable

 Prélèvement à jeun
Préciser la taille et le poids du patient
Sérum à centrifuger au bout de 30 minutes après le prélèvement et décanter puis congeler rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R42 : Fibromax)

3 mL sérum : Congelé.
1 mL plasma citraté : Congelé. °

 1 semaine ° Chimie, néphélométrie, ELISA, coagulation,

 B 16 - réf 0126 + B 9 - réf 0522 + B 5 - réf 0519 + B 25 - réf 1805 + B 75 - réf 7308 + B 5 - réf 0591 + B 6 - réf 1601 + 45.00 EUR non remboursable

 Bien identifier sur les tubes si PLASMA ou SERUM
Prélèvement à jeun
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R17 : Fibromètre)
Analyse non réalisable pour les patients < 18 ans
Joindre impérativement le taux de plaquettes réalisé par vos soins

3 mL sérum : Congelé.
1 mL plasma citraté : Congelé. °

 1 semaine ° Chimie, néphélométrie, ELISA, coagulation,

 B 140 - réf 1001

 Bien identifier sur les tubes si PLASMA ou SERUM
Prélèvement à jeun
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R17 : Fibromètre)
Analyse non réalisable pour les patients < 18 ans
Joindre impérativement le taux de plaquettes réalisé par vos soins
L'intégralité des paramètres doivent être envoyés au laboratoire Biomnis pour que le calcul du fibromètre soit réalisé

Fibromètre VCTE (avec FibroScan)

FVCTE

3 mL sérum : Congelé.
1 mL plasma citraté : Congelé. °

-  1 semaine ° Chimie, néphélogéométrie, ELISA, coagulation,
-  B 16 - réf 0126 + B 6 - réf 0517 + B 5 - réf 0519 + B 25 - réf 1805 + 44.00 EUR non remboursable

-  Bien identifier sur les tubes si PLASMA ou SERUM
Prélèvement à jeun
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R17 : Fibromètre)
Analyse non réalisable pour les patients < 18 ans
Joindre impérativement le taux de plaquettes réalisé par vos soins
L'intégralité des paramètres doivent être envoyés au laboratoire Biomnis pour que le calcul du fibromètre soit réalisé

Fibronectine

FBRON

1mL Plasma EDTA ou Citraté ° Réfrigéré

-  1 jour ° Néphélogéométrie
-  37.00 EUR non remboursable

-  Proscrire les autres types de prélèvement

Fibrotest - Actitest - Fibrotest remboursé/ Actitest HN - sérum

FIACC

2mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  5 jours °
-  B 140 - réf 1000 + 16.00 EUR non remboursable + B6-réf 0516(ALAT) si réalisation Actitest à la demande du prescripteur

-  Joindre la fiche de renseignements spécifiques R40
Prélèvement à jeun
Analyse non réalisable pour les patients < 2 ans

Fibrotest - Actitest - non remboursé - sérum

FIACC

2mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  5 jours ° Biochimie
-  B 6 - réf 0516 + B 5 - réf 0519 + B 25 - réf 1805 + B 20 - réf 1813 + B 6 - réf 1601 + 66.00 EUR non remboursable dont 10.00 EUR pour Apolipoprotéine A

-  Joindre la fiche de renseignements spécifiques R40
Prélèvement à jeun
Analyse non réalisable pour les patients < 2 ans

Fibrotest - remboursé - sérum

FIBRO

2mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

-  5 jours °
-  B 140 - réf 1000

-  Joindre la fiche de renseignements spécifiques R40
Prélèvement à jeun
Analyse non réalisable pour les patients < 2 ans

Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum

FJAC *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Test de neutralisation

 B 50 - réf 1709

 Cet examen est destinée à mesurer l'immunité antivirale

Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage nouvelle génération - sang total

FMF

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 mois ° Séquençage nouvelle génération

 440.00 EUR non remboursable (pour les recherches ciblées apparentés avec cas index, nous contacter)

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R36 : Fièvre Méditerranéenne Familiale)
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Filariose - sérologie - sérum

FIL

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 B 80 - réf 4332

Fish sur métaphases

FISHM

5mL Liquide Amniotique, Villosités choriales, Sang Total hépariné, Lame étalement cytogénétique, Culot cellulaire cytogénétique ° T° ambiante

 8 jours après obtention du caryotype ° Hybridation in situ sur métaphases

 B 500 - réf 0903 + B 1000 - réf 0904

 Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006
En cas de transmission de prescription de FISH seule, le caryotype est systématiquement réalisé sauf si l'analyse est demandée à partir d'un culot cellulaire ou de lame d'étalement cytogénétique.

Fish sur noyaux interphasiques

FISHN

5mL Liquide Amniotique, Villosités choriales, Sang Total hépariné, Lame étalement cytogénétique, Culot cellulaire cytogénétique
° T° ambiante

 2 jours ° Hybridation in situ sur noyaux non cultivés

 B 500 - réf 0905

 Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

En cas de transmission de prescription de FISH seule, le caryotype est systématiquement réalisé sauf si l'analyse est demandée à partir d'un culot cellulaire ou de lame d'étalement cytogénétique.

Flécaïnide - sérum

FLECA

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° LCMSMS

 B 120 - réf 1678

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement en taux résiduel (juste avant la prise)

Fluconazole - Sérum

FLUCO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° LCMS

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Flucytosine - Sérum

FLUCY *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Flunitrazépam - sérum

FLUNI *

2mL Sérum volume impératif (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Fluor - Sérum

FLUO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Ionométrie

 70.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Pas de prélèvement sur tube en verre

Fluor - urines

FLUOU *

10mL Urines ° Réfrigéré

 3 semaines ° Ionométrie

 70.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Noter sur le bon de demande s'il s'agit d'une Médecine du Travail
Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Fluoxétine - sérum

FLUOX

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Flupentixol - Sérum

FLUPE *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Fluphénazine - Sérum

FLUP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Fluvoxamine - sérum

FLUVO

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Focalisation isoélectrique - LCR + sérum

EPLCR

1 mL LCR + 2 mL Sérum (IMPERATIF) ° Réfrigéré

-  4 jours ° Isofocalisation
-  B 6 - réf 1806 + B 20 - réf 1815 + B 70 - réf 1615 + B 180 - réf 1616

-  1 tube spécifique pour cette analyse, notamment si demande conjointe de Borréiose.
LCR et Sérum prélevés le même jour
Pas de poudrier ou pot à urine accepté pour les prélèvements de LCR

Formule Leucocytaire Approfondie

FS

3 Frottis sanguins minces non colorés ° T° ambiante

-  2 jours ° Examen microscopique après coloration
-  B 100 - réf 1105

-  Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
-  T25 : Porte-Lames pour frottis sanguin ou médullaire (fourni sur demande)

Fosamprénavir - Sérum

FOSAM *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° LCMS
-  B 120 - réf 4117 par molécule

-  Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Fosfomycine - Sérum

FOSFO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Méthode microbiologique
-  B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)
Préciser le contexte clinique : efficacité ou toxicité
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

5mL Sang total Hépariné ° T° ambiante

-  10 jours ° Fragilité chromosomique après traitement à la mitomycine
-  B 800 - réf 0901

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B13 : Cytogénétique constitutionnelle
Joindre les renseignements cliniques
Joindre les résultats de la dernière NF/Plaquettes.
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Fragment 1+2 - prothrombine - plasma

PT12

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  1 mois ° Enzymoimmunologie
-  35.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Rejeter tout prélèvement difficile dans lequel une amorce de coagulation aurait pu se produire.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme

FRASP

2 * 300µL Sperme (ne pas dépasser ce volume) ° Congelé

-  1 semaine ° Cytométrie en flux
-  160.00 EUR non remboursable

-  Recueil effectué après 3 à 5 jours d'abstinence
Congeler l'échantillon dans l'heure
Joindre les résultats du spermogramme
Fiabilité de la méthode liée au respect de la procédure préanalytique : - Après liquéfaction (environ 30 min) et homogénéisation, estimer et renseigner la concentration en spermatozoïdes qui doit être supérieure à 2 millions/ mL . Renseigner également la vitalité des spermatozoïdes (pourcentage de spermatozoïdes vivants - 3 modes de congélation sont acceptables : - en plongeant les échantillons directement dans l'azote liquide - en les plaçant dans un congélateur à -80°C - en les plaçant directement dans un congélateur à -20°C. (Transport -25°C à -30°C)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R2 : Fragmentation de l'ADN des spermatozoïdes)
Se référer au protocole P22 pour la préparation des échantillons
-  T12 : Cryotube

Frottis cervico-utérin - conventionnel

MFR *

Frottis cervico-utérin ° T° ambiante

-  4 jours ° Coloration de Papanicolaou
- 

-  Se reporter au protocole de recueil et préparation des échantillons P30
-  #VAEURMULTI

Frottis cervico-utérin - conventionnel (contrôle)

MFRCT *

Frottis cervico-utérin ° T° ambiante

 4 jours °



 Se référer au site <https://www.eurofins-pathologie.com>

Frottis cervico-utérin - monocouche

MFM *

Frottis cervico-utérin ° T° ambiante

 4 jours ° Cytologie en milieu liquide / Coloration de Papanicolaou



 Se reporter au protocole de prélèvement (cytologie cervicale) - KA10P-KA18P
Utiliser le bon de demande spécifique B56 Dépistage du cancer du col de l'utérus (HPV ou Cytologie cervicale)
Utiliser le sachet de transport vert foncé S30
Un test HPV réflexe sera effectué en cas de cytologie ASCUS ou AGC"

 KA56 : Kit pour HPV et cytologie cervicale.

Frottis cervico-utérin - monocouche (contrôle)

MFMCT *

Frottis cervico-utérin ° T° ambiante

 4 jours ° Cytologie en milieu liquide / Coloration de Papanicolaou



 Se référer au site <https://www.eurofins-pathologie.com>
Se reporter au protocole de prélèvement (cytologie cervicale) - KA10P-KA18P
Utiliser le bon de demande spécifique B56 Dépistage du cancer du col de l'utérus (HPV ou Cytologie cervicale)
Utiliser le sachet de transport vert foncé S30
Un test HPV réflexe sera effectué en cas de cytologie ASCUS ou AGC"

 KA56 : Kit pour HPV et cytologie cervicale.

Fructosamine - sérum

FRUC

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 30 - réf 1576

Fructose - plasma séminal

FRUSP

1mL Plasma séminal sur tube fluoré ° Congelé < 4h

-  15 jours ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 175 - réf 0072 (comporte le dosage du fructose, citrate et zinc). Si réalisé seul 24.00 EUR non remboursable

-  Recueil effectué après 2 à 5 jours d'abstinence. Préciser obligatoirement le volume de l'éjaculat et le délai d'abstinence et si possible le pH, la numération des spermatozoïdes. Centrifuger et congeler immédiatement le surnageant

FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum

FSH

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Electrochimiluminescence
-  B 45 - réf 0473

-  Joindre les renseignements cliniques. Préciser âge et période du cycle. ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines

FSHU *

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

-  15 jours ° Chimiluminescence
-  54.00 EUR non remboursable pour les enfants (comprends le dosage de la LH urinaire). Adulte: 27.00 EUR non remboursable

-  Pour les enfants, inclus systématiquement la LH urinaire en plus. Préciser la diurèse
-  T28 : tube urines (4mL)

Furosémide - sérum

FUROS *

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  118.00 EUR non remboursable

-  Préciser :
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
 - l'heure du prélèvement
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  118.00 EUR non remboursable

-  Préciser :
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
 - l'heure du prélèvement
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

 T28 : tube urines (4mL)

G6PD - Glucose-6 phosphate déshydrogénase

G6PD

2mL Sang total EDTA exclusivement ° Réfrigéré

-  2 jours ° Technique enzymatique
-  B 30 - réf 1518

-  Le dosage doit être impérativement réalisé à distance d'une transfusion sanguine (> 3 mois). Préciser les résultats de la NFS : globules rouges et hémoglobine

Gabapentine - sérum

GAB

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° LCMSMS
-  B 120 - réf 1671

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Levetiracetam; Gabapentine; Lamotrigine; Oxacarbazepine/10-OH-Carbazepine; Topiramate.

Gale - Sarcoptes scabiei - recherche

GALER *

Squames de peau dans un flacon stérile ° Réfrigéré

-  3 jours °
-  B 10 - réf 0267

-  Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Ganciclovir - plasma

GANCI *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé

 3 à 4 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser si insuffisance rénale

Gastrine - sérum

GAST

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 5 jours ° Radioimmunologie

 B 70 - réf 0764

 Après jeûne de 10h à 12h minimum
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Gène BRAF - isolé

MYSBR

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

 10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire
par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes

 Nous consulter

 Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des
Hémopathies

Gène BRAF - recherche de la mutation V600E de l'exon 15

BRAF

Bloc tumoral en paraffine ou lames en paraffine ° T° ambiante





gène cKIT - exons 9, 11, 13, 17

CKIT *

Bloc tumoral en paraffine ou lames en paraffine ° T° ambiante





Gène CKIT - isolé

MYSKT

2mL Moelle sur tube EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

- 🕒 10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
- € Nous consulter

- ⓘ Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Gène TP53 - isolé

MYS53

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

- 🕒 10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
- € Nous consulter

- ⓘ Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Génotypage plaquettaire foetal non invasif - Sang maternel

GPFOE *

20mL Sang maternel °

- 🕒
- € B 1500 - réf 4096

Gentamicine - sérum

GENT

1mL Sérum ° Congelé < 4h

- 🕒 1 jour ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
- € B 70 - réf 1650

- ⓘ 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)
Taux résiduel = avant injection ; Pic = 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h après injection IM

GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - plasma

GHBS *

2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

- 🕒 18 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
- € 75.00 EUR non remboursable

- ⓘ Congeler IMPERATIVEMENT dans les 4 heures
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.
Plasma EDTA prélevé impérativement dans les 06 heures après les faits

GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - urines

GHBU *

5mL Urines ° Congelé

- 🕒 15 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
- € 75.00 EUR non remboursable

- ⓘ Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé 1 aliquote spécifique pour cette analyse. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire. urines échantillon prélevées impérativement dans les 12 heures après les faits

GH - Hormone de croissance - sérum

GH

1mL Sérum ° Congelé < 4h

- 🕒 2 jours ° Electrochemiluminescence immunoassay : ECLIA Cobas
- € B 90 - réf 7423

- ⓘ Préciser si traitement par Somavert (Pegvisomant) Prélèvement à jeun

Ghréline - acylée et non acylée - plasma

GHREL *

Plasma EDTA ° Congelé < 4h

- 🕒 45 jours °
- € 55.00 EUR non remboursable pour le dosage de la Ghréline Acylée / 55.00 EUR non remboursable pour le dosage de la Ghréline non Acylée

- ⓘ Centrifuger, décanter, congeler l'échantillon dans l'heure. Faire 2 aliquots:
 - 500 µL de plasma pour le dosage de Ghréline acylée
 - 200 µL (IMPERATIF) de plasma pour le dosage de Ghréline non Acylée. Si le volume est différent, bien le préciser sur le tube.

GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma

GHRH *

1mL Plasma EDTA + Aprotinine ° Congelé < 4h

- 🕒 1 mois ° Radioimmunologie
- € 78.00 EUR non remboursable

- ⓘ Centrifuger rapidement à température réfrigérée et congélation immédiate du plasma Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R48 : GHRH) Prélever sur tube spécial (EDTA + Aprotinine)
- 🔑 T2 : Tube EDTA + aprotinine

Glibenclamide - sérum

GLIBE *

2mL Sérum ° Réfrigéré

- 🕒 Délai variable : contacter notre Secrétariat Médical ° HPLC
- € 88.00 EUR non remboursable

- ⓘ Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal

HBBM *

7 mL sang total EDTA pour un adulte
5 mL sang total EDTA pour un enfant ° T° ambiante

 60 jours °

 B 500 - réf 4082 (exploration alpha ou bêta) ou B500 réf 4082 x 2 (exploration alpha et bêta globine)

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Joindre impérativement les résultats de la NFS et de l'électrophorèse de l'hémoglobine

Glucagon - plasma

GLUC

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé < 4h

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Radioimmunologie

 48.00 EUR non remboursable

 Centrifuger rapidement à température réfrigérée et congélation immédiate du plasma
Prélever sur tube spécial (EDTA + Aprotinine)

 T2 : Tube EDTA + aprotinine

Glucose - liquide biologique

GLYD

1mL Liquide biologique ° Congelé < 4h

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 17.00 EUR non remboursable

Glutathion peroxydase - plasma

GLUPS *

1mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 3 semaines ° Chimie - Spectrophotométrie

 29.00 EUR non remboursable

 Centrifugation réfrigérée (10 minutes/2860g)
Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Glycérol - sérum

GLYOL *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Photométrie

 17.00 EUR non remboursable

Glycine - plasma

GLYCI

1mL Plasma Hépariné ° Congelé

 1 semaine ° HPLC

 53.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Glyphosate - recherche et dosage - plasma

GLYPH *

4mL Plasma héparinate de sodium ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMSMS

 96.00 EUR non remboursable

-  Acheminement rapide après prélèvement.
L'usage de tube sous vide est recommandé.
Afin d'éviter les risques de pollution externe:
Ne pas effectuer le prélèvement sur le lieu contaminé.
La peau doit être savonnée avant la désinfection.

 T4 : Tube héparine de sodium

Glyphosate - recherche et dosage - sang total

GLYPS *

4mL Sang total EDTA ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMSMS

 96.00 EUR non remboursable

-  Acheminement rapide après prélèvement.
L'usage de tube sous vide est recommandé.
Afin d'éviter les risques de pollution externe:
Ne pas effectuer le prélèvement sur le lieu contaminé.
La peau doit être savonnée avant la désinfection.

Glyphosate - recherche et dosage - urines

GLYPU *

2 * 4mL Urines ° Congelé < 4h

 4 semaines ° LCMSMS

 96.00 EUR non remboursable

Gnathostomose - sérologie - sérum

GNATH *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Western-Blot

 165.00 EUR non remboursable

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie 142.00 EUR non remboursable Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R49G)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Grippe A et B - diagnostic direct - PCR

GABPC

Rhinopharynx, LBA, Sécrétions bronchiques ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel 40.00 EUR non remboursable Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Si typage nécessaire. Facturation supplémentaire
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13. K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Grippe A et B - sérologie IgG - sérum

GRIP

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° SERION ELISA classic B 60 - réf 1730 + B 70 - réf 1733

Groupage plaquettaire - sang total

GPLAQ *

3 * 5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 semaine ° Biologie moléculaire B 200 - réf 0160 par groupage
Analyses complémentaires pouvant être réalisées :
105 EUR si phénotypage plaquettaire dans les systèmes HPA-1,3 et 5 (code HPA)
(B 200- réf 0160) x 3 + 105 EUR si Génotypage plaquettaire étendu dans les systèmes HPA-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11 et 15(code GPE)
Si Génotypage plaquettaire dans les systèmes rares (code GRARE) :
105 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP Ialla
432 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP IIbIIIa
35 EUR systèmes portés par la glycoprotéine GP IbIX Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R44 : Immunologie plaquettaire ou R45 : Exploration de Thrombopénie foetale/néonatale, pour les nouveaux-nés)

Groupage sanguin ABO - RH1(D)

GROUP

5mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  1 jour ° Gel-filtration ou Technique d'immuno-capture
-  B 33 - réf 1140 + B 33 - réf 1145 (Phénotype RH-KEL1)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R3 : RAI)
Préciser l'état civil complet sur le bon de demande et le tube primaire : nom de naissance, nom marital ou nom d'usage s'il y a lieu, prénom (si prénom composé, en toutes lettres), sexe et date de naissance. Nous adresser le tube primaire
Nous transmettre si possible la notion de transfusion récente (moins de 4 mois).
Nous préciser le type de difficulté technique rencontrée lors de la détermination de groupe ABO-RH1
Un phénotype RH-KEL1 est systématiquement réalisé avec le groupage ABO-RH1

Groupes sanguins - génotypage - sang total

BMGR *

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

-  30 jours pour les gènes RHD et RHCE (délai supérieur si absence d'anomalie moléculaire connue nécessitant une étude
-  98.00 EUR non remboursable

-  Analyse réservée aux femmes de moins de 50 ans, aux sujets porteurs d'une hémoglobinopathie, et aux sujets polyimmunisés.
Merci de joindre le phénotype rhésus de la patiente aux autres documents requis (attestation, consentement et ordonnance).
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Guanidinoacétate et créatine - plasma

GUANI *

3mL Plasma Hépariné ° Congelé

-  1 mois °
-  B 500 - réf 4001

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Guanidinoacétate et créatine - urines

GUANU *

10mL Urines (miction ou échantillon de la diurèse) ° Congelé < 4h

-  1 mois °
-  B 500 - réf 4001

-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Haemophilus ducreyi - diagnostic direct - PCR

HAEBM

Écouvillonnage cervical, urétral, vaginal, anal, Sperme, Prélèvements pharyngés ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Haemophilus ducreyi - recherche

BADUC *

Frottis ou écouvillon ° Réfrigéré

-  2 jours ° Examen microscopique après coloration
-  17.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum

HEIN

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  35.00 EUR non remboursable

-  Cet examen est réservé au contrôle après vaccination

Halopéridol

HALO

2mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Risperidone.

Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum

HANTA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence
-  111.00 EUR non remboursable

Haptoglobine - sérum**HAP**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie Préciser l'âge et le sexe du patient B 20 - réf 1813

hCG - chaîne bêta libre - sous unité - prélèvements divers**BHCGD**

Prélèvements divers ° Congelé < 4h

 2 jours ° Radioimmunologie 29.00 EUR non remboursable

hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum**BHCG**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 jours ° Radioimmunologie Proscrire le plasma hépariné B 75 - réf 7317

hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - liquide biologique**HCGD**

1mL Liquide biologique ° Congelé < 4h

 1 jour ° Radioimmunologie Joindre les renseignements cliniques 19.00 EUR non remboursable

hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum**HCGT**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 jours ° Radioimmunologie Joindre les renseignements cliniques B 25 - réf 7402

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 50 - réf 7325 + 29.00 EUR non remboursable

 Pour l'algorithme ROMA sont dosés HE4 et CA125 avec la même technologie, ce qui n'autorise pas l'intégration d'un résultat transmis de CA125.

ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Helicobacter pylori - antigène - Selles

HELS

Selles ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunochromatographie

 B 40 - réf 5236 / 56.00 EUR non remboursable si exigences particulières.

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Doit être techniqué au maximum 72H après le recueil des selles si réfrigéré.

Pour le respect du délai pré-analytique, merci de prendre en compte les jours de techniques de l'analyse (lundi-vendredi non férié)

Si >72h, le prélèvement doit être congelé chez le correspondant puis envoyé en sachet violet S14. Indiquer OBLIGATOIREMENT les dates de congélation et décongélation du prélèvement.

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Helicobacter pylori - culture

HELUCU

Biopsie antrale et/ou fundique ° Réfrigéré

 18 jours ° Culture

 B 60 - réf 5238 / 60 EUR non remboursable si exigences particulières
+ si réalisation antibiogramme B70-réf.5279 et B60-réf.0270

 Les CMI seront systématiquement effectuées et facturées en cas de détection d' Helicobacter pylori.

Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

Prélèvement sur milieu de transport gélosé spécifique T8 (fourni sur demande) à maintenir à l'abri de la lumière Doit être techniqué au maximum 72H après le recueil des biopsies si réfrigéré.

Pour le respect du délai pré-analytique, merci de prendre en compte les jours de technique de l'analyse (lundi-vendredi non fériés).

Si >72h, le prélèvement doit être congelé chez le correspondant puis envoyé CONGELÉ. Indiquer OBLIGATOIREMENT les dates de congélation du prélèvement.

 T8 : Milieu de transport pour culture Helicobacter pylori

Biopsie antrale et/ou fundique, souche bactérienne pure fraîchement repiquée. ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 B 100 - réf 5237 / 108.00 EUR non remboursable si exigences particulières

 Pour les BIOPSIES :
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Introduire les biopsies dans le milieu de transport gélosé spécifique T8 (disponible sur demande) au moment du prélèvement.
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Transport à l'abri de la lumière.
Doit être techniqué au maximum 72H après le recueil des biopsies si réfrigéré.
Pour le respect du délai pré-analytique, merci de CONGELER les prélèvements envoyés un vendredi ou la veille des jours fériés ou week-end prolongés.
Si >72h, le prélèvement doit être congelé chez le correspondant puis envoyé CONGELÉ. Indiquer OBLIGATOIREMENT les dates de congélation du prélèvement.
Pour les SOUCHES :
Utiliser IMPERATIVEMENT une Diagnobox (référence S10 : triple emballage étanche).
Les souches envoyées doivent être pures, fraîchement repiquées sur un milieu de culture adéquat sous atmosphère microaérophile et à température ambiante dans une Diagnobox.

 T8 : Milieu de transport pour culture Helicobacter pylori

Helicobacter pylori - sérologie IgG - sérum

HELI

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence

 B 40 - réf 1311 / uniquement dans les cas suivants :
Patient à risque de moins de 45 ans et :
« apparenté au premier degré à un patient ayant eu un cancer gastrique ;
« ou avec antécédent d'ulcère sans preuve d'éradication de H. pylori ;
« ou avant prise au long cours d'AINS ou d'aspirine à faible dose ;
« ou en cas de purpura thrombopénique immunologique.
20 EUR non remboursable pour les autres cas.

 L'analyse ne peut pas réalisée sur un prélèvement ayant été conservé plus de 7 jours à température Réfrigéré

4tube(s) Air expiré ° T° ambiante

 4 jours ° Technique Isotopique B 45 - réf 5234

-  Conditions de réalisation du test :
- sujet au repos, à jeun depuis au moins 6 heures (sans boire, ni manger, ni fumer)
 - arrêt de tout traitement antibiotique au minimum 4 semaines avant le test
 - arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons au minimum 2 semaines avant le test
 - arrêt des antiacides et pansements gastro-intestinaux 24 heures avant le test
 - recueil de l'air expiré : le patient doit souffler doucement dans les tubes pendant au minimum 15 secondes (apparition de buée) ; les tubes sont rebouchés rapidement et rigoureusement.
- Réaliser le T30, 30 minutes après le T0 avec une tolérance de 5 minutes en plus ou en moins.
Ne plus nous transmettre les boîtes des kits des tests respiratoires.

Selles ° Réfrigéré

 10 jours ° PCR 83.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube stérile avec une goutte eau phy stérile.
Proscrire tout fixateur histologique.
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 4 jours ° LAMP PCR 54.00 EUR non remboursable

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 4 jours ° LAMP PCR B 180 - réf 8000 (Si coefficient de saturation de la transferrine > 45 % lors de 2 dosages ou antécédents d'apparenté au 1er degré homozygote C282Y - se référer aux indications du JO du 22 juin 2017)

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total

H63D

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 4 jours ° LAMP PCR

 67.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total

S65C

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 9 jours ° PCR temps réel

 67.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Hémoglobine - électrophorèse - sang total

EPHB

4mL Sang total EDTA (exclusivement) ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrophorèse

 B 60 - réf 1113 - si Hb anormale B120 - réf 1120

 Joindre les résultats de la NFS
Préciser l'origine ethnique
Le prélèvement doit être effectué juste avant l'envoi de celui-ci de manière à écourter le temps d'acheminement. Le délai entre la date de prélèvement et la date de réalisation de l'analyse ne doit pas dépasser 7 jours.
En cas d'anomalie de l'Hb repérée à l'électrophorèse capillaire, une EPHBI est déclenchée complétée par une technique CLHP et une électrophorèse en gel acide.

Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total

HBA1C

2mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 4 jours ° Electrophorèse

 B 19 - réf 1577

Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total

HPN *

1 * 5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 3 semaines ° Cytométrie en flux

 B 80 - réf 1119

 L'échantillon doit nous parvenir dans les 24H suivant le prélèvement
Prélever du Lundi au Mercredi

Hémoglobine - recherche - selles

SGP

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 5 jours ° Enzymoimmunologie

 B 20 - réf 1629

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

Hémopexine - sérum

HEMOP *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Néphélométrie

 18.00 EUR non remboursable

Hémorragie foeto-maternelle - sang total

KLEI

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 1 jour ° Cytométrie en flux

 B 70 - réf 2109

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
- Dans le cadre d'un Kleihauer d'intérêt maternel (prévention de l'immunisation anti-RH1 du post-partum) : l'échantillon doit nous parvenir dans les 48h qui suivent le prélèvement.
- Dans le cadre d'un Kleihauer d'intérêt foetal (ex: diminution des mouvements actifs foetaux) : l'échantillon ne doit pas être adressé à Eurofins Biomnis car l'analyse doit être réalisée dans les 6h qui suivent le prélèvement.

Hépatite A - anticorps IgM - sérum

HAVM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 50 - réf 0350

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum

HAVAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 49 - réf 1736

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum

HBCM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 60 - réf 4501

Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum

HBCAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 145 - réf 4500

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum

HBEAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 150 - réf 4711 , dans le suivi d'une hépatite B chronique couplée à la réalisation de l'Antigène anti-HBe(HBEAG) et au titrage de l'Antigène HBs(HBSGQ).

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum

HBSAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 50 - réf 4714 , pour la détermination du statut immunitaire dans un contexte de vaccination.
B100 - Réf 4712, pour contrôle de guérison avec la réalisation de l'Antigène HBs(HBSAG)
B150 - Réf. 4500, pour les autres cas de prescription isolée.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Hépatite B - antigène HBe - sérum

HBEAG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

 B 150 - réf 4711 , dans le suivi d'une hépatite B chronique couplée à la réalisation du titrage l'Antigène anti-HBs (HBSGQ) et Anticorps anti-HBe(HBEAC).

Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum

HBSAG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Avec test de neutralisation si positif

 B 48 - réf 4715 , dans le cadre d'une surveillance de grossesse.
B100 - Réf 4712, pour contrôle de guérison avec la réalisation de l'anticorps anti-HBs(HBSAC)
B150 - Réf 4500, pour les autres cas de prescription isolée.

Hépatite B - antigène HBs - quantitatif - sérum

HBSGQ

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

 B 150 - réf 4711 , dans le suivi d'une hépatite B chronique couplée à la réalisation de l'Antigène anti-HBe(HBEAG) et Anticorps anti-HBe(HBEAC).

Hépatite B - charge virale - PCR

ADNBQ

2.5mL Sérum, ou Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 jours ° TMA en temps réel

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

 B 140 - réf 4120

Hépatite B Genotypage et Profil de résistance aux anti-viraux - sérum

RHB *

4mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Séquençage

 La charge virale minimale conseillée est de 1000 copies (180 UI)
Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée.

 222.00 EUR non remboursable

Hépatite C - confirmation - sérum

RIBHN

1mL Sérum ° Réfrigéré

 10 jours ° Immunoblot

 48.00 EUR non remboursable

Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN

ARNCQ

2.5mL Sérum, ou Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 jours ° TMA en temps réel

 B 200 - réf 4124

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Hépatite C - génotypage

GENC

1.5mL Sérum, ou Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 4 jours ° PCR temps réel

 B 350 - réf 4125 , prise en charge que dans le cadre du bilan pré-thérapeutique

 Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée. 1 aliquote spécifique pour cette analyse. La charge virale minimale recommandée est de 500 UI/ml

Hépatite C - profil de résistance aux anti-viraux - sérum

RHC *

4mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Séquençage

 222.00 EUR non remboursable

 La charge virale minimale conseillée est de 1000 copies (180 UI)
Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée.

Hépatite C - sérologie dépistage - sérum

HCVAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 45 - réf 3784

Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum

DELAM

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 33.00 EUR non remboursable

Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum

DELAC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 1740

Hépatite Delta - antigène - sérum

DELAG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 61.00 EUR non remboursable

Hépatite Delta - charge virale - PCR

DELBM

2mL Sérum ou Plasma EDTA ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 B 200 - réf 4119 / 112.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Hépatite E - anticorps IgG - sérum

HEVG

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 5 jours ° Enzymoimmunologie

 33.00 EUR non remboursable

Hépatite E - anticorps IgM - sérum

HEVM

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 60 - réf 4502

 La recherche d'IgM est effectuée en priorité pour diagnostiquer une infection aiguë à VHE.

Hépatite E - diagnostic direct - PCR

HEVBM

2 mL Sérum ou Plasma EDTA, Selles : Réfrigéré °

 3 jours ° PCR

 B 200 - réf 4503 /112.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - Protéine c-erbB-2 - sérum

ERBB2 *

1mL Sérum ° Congelé

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 165.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides

HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - statut - tumeurs du sein invasives - FISH

MOHC5

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames blanches (3 minimum) °

 10 jours ° Cytogénétique moléculaire ou FISH

 B 500 - réf 0905

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Joindre le compte rendu anatomopathologique
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25 ou S9L

 #VALEURMULTI

Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR

HERBM

Prélèvement cutanéomuqueux, Génital, Oculaire, rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, biopsie digestive, sperme, urines, liquide gastrique, 0.5 mL LCR (minimum) : Réfrigéré
0.5 mL (minimum) Sang total EDTA réfrigéré accepté uniquement pour les nourrissons et les personnes immunodéprimées, hépatites fulminantes. °

 3 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4506 / 68.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

HSVLA

10mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 178.00 EUR non remboursable

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 #VAEURMULTI

Herpes simplex virus 1/2 - HSV - sérologie IgM - sérum

HERPM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence

 22.00 EUR non remboursable

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Herpes simplex virus - HSV1 IgG et HSV2 IgG - sérologie IgG - sérum

HERPG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence

 B 60 - réf 1744 uniquement dans les cas suivants :
- Définition du statut immunitaire avant mise sous traitement fortement immunosuppresseur
- Recherche des IgG anti-HSV-1 et -2 spécifiques de type, en précisant que cette recherche est réalisée dans le contexte de premier épisode d'herpès génital au cours de la grossesse ou à l'accouchement.
22 EUR non remboursable pour les autres cas.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Herpès virus type 6 - charge virale - PCR

HV6Q

2 mL (minimum) Sang total EDTA, 0.5 ml LCR (minimum) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° PCR temps réel
-  134.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Herpès virus type 6 - diagnostic direct - PCR

HV6BM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, biopsie digestive, hépatique, moëlle osseuse ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
En revanche, les liquides biologiques ne doivent pas être dilués
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum

HHV6G

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence indirecte
-  B 60 - réf 1752

Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum

HHV6M

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence indirecte
-  72.00 EUR non remboursable

Herpès virus type 7 - diagnostic direct - PCR

HV7BM

1 mL (minimum) sang et dérivés sanguins
500 µL LCR
Moëlle osseuse ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Herpès virus type 8 - charge virale

HV8Q

2 mL (minimum) sang total EDTA, 0,5 mL LCR (minimum); moëlle EDTA ° Réfrigéré

-  1 semaine ° PCR temps réel
-  134.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR

HV8BM

Biopsie (d'une lésion tumorale, cutanée ou organique), liquide de ponction (dont péritonéal, péricardique, pleural), moëlle osseuse (EDTA) ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable pour les biopsies / 134 EUR non remboursable pour le sang, dérivés sanguins, LCR

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
En revanche, les liquides biologiques ne doivent pas être dilués
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Herpès virus type 8 - sérologie IgG - sérum

HHV8

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence indirecte
-  50.00 EUR non remboursable

Histamine

HISTP

1mL Plasma EDTA non hémolysé ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  52.00 EUR non remboursable

 Pas de prélèvement sur tube en verre
Agiter le tube doucement par retournement. Le sang total se conserve 2h à température ambiante ou 12h à +4°C.
Dans ce temps, centrifuger 10 minutes à 900g. Aspirer le plasma doucement, à 1 cm minimum du culot. Après un choc anaphylactique, prélever 30 à 60 min après le début des signes cliniques (recommandations de la SFAR)

 K2: Kit de prélèvement - A utiliser uniquement en cas de choc anaphylactique

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 4 jours ° PCR temps réel

 39.00 EUR non remboursable

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
En l'absence d'attestation de consultation et/ou du consentement éclairé du patient, la technique de cytométrie en flux sera réalisée mais :
- la cytométrie en flux nécessite impérativement la transmission du sang total EDTA dans les 24 heures suivant le prélèvement
- sa sensibilité est inférieure à la technique de PCR en temps réel.

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 jour ° Cytométrie en flux

 39.00 EUR non remboursable

-  L'échantillon doit nous parvenir dans les 24H suivant le prélèvement

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 20 jours ° PCR-SSP

 B 380 - réf 1180 (+ B 200 - réf 1691 si le patient est porteur d'un allèle B57)

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Veuillez noter que cette analyse n'est effectuée qu'après la réalisation du typage HLA de classe 1 et en fonction du résultat de ce dernier.
Nous vous rappelons donc que si les deux analyses seront effectuées, elles seront alors toutes les deux facturées.
Joindre la fiche de renseignement disponible sur www.biomnis.com

HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total

HLA1

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 5 jours ° PCR SSO : trousse Histo Spot

 B 380 - réf 1180

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Nous vous rappelons que nous ne réalisons pas le génotypage HLA dans le cadre d'une étude d'histocompatibilité en vue d'une greffe ou d'un don d'organe. Les résultats de cette analyse ne sont interprétables que dans le cadre d'une association des marqueurs HLA à certaines maladies.
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total

HLA2

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 10 jours ° PCR LABTYPE SSO Typing test

 B 700 - réf 1181

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Nous vous rappelons que nous ne réalisons pas le génotypage HLA dans le cadre d'une étude d'histocompatibilité en vue d'une greffe ou d'un don d'organe. Les résultats de cette analyse ne sont interprétables que dans le cadre d'une association des marqueurs HLA à certaines maladies.
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

HOMA - index - sérum

HOMA

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour °



 Il est impératif de décanter rapidement le sérum
Prélèvement à jeun
Transmettre la valeur de la glycémie à jeun du même jour exprimée en g/L.

Homocystéine - plasma

HOCY

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Dosage immunologique latex automatisé

 66.00 EUR non remboursable

 Ne pas confondre avec HOMOCYSTINE
Prélèvement à jeun
Centrifuger l'échantillon dans l'heure suivant le prélèvement puis décanter et congeler le plasma à -20°C;
Si la centrifugation ne peut être réalisée dans l'heure, conserver le prélèvement dans la glace avant centrifugation (au maximum 8 heures).

HTLV 1/2 PCR qualitative - sang total**HTLBM ***

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 2 semaines ° PCR + hybridation 174.00 EUR non remboursable

HTLV 1/2 - sérologie confirmation - sérum**WBHTL**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 10 jours ° Immunoblot B 180 - réf 1755

HTLV 1/2 - sérologie dépistage - sérum**HTLV**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence B 65 - réf 1754 Réfrigéré, si acheminement en moins de 14 jours

Hydrolases acides - activité - sérum**HYDAA ***

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 mois ° Chromatographie sur couche mince B 100 - réf 4011 x 5 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Hydroquinidine - Sérum**HQUIN ***

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC B 70 - réf 1677 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Hydroxychloroquine - sang total

HCHLO *

2mL Sang total EDTA ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Hydroxyzine - Sérum

HYDRO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Hypoxanthine - urines

HXANTU *

10mL Urines échantillon ° Congelé

 3 mois °

 B 500 - réf 4001 + B6 ref 0627 : créatinine urinaire

 Congeler l'échantillon dans l'heure

Ibuprofène - Sérum

IBU *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 mois ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 B 95 - réf 1659

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum

GAM

2mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 56 - réf 1385

 Préciser l'âge et le sexe du patient

IgA - immunoglobulines A sécrétoires - selles**IGAS**

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA 40.00 EUR non remboursable Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

IgA - immunoglobulines A - sérum**IGA**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 20 - réf 1814 /cotation maximale B56 - réf. 1385 si IgA + IgG + IgM Préciser l'âge et le sexe du patient

IgA - immunoglobulines A - sous classes IgA1 et IgA2 - sérum**IGA12 ***

5mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Immunoturbidimétrie 55.00 EUR non remboursable Préciser l'âge et le sexe du patient

IgD - immunoglobulines D - sérum**IGD**

1mL Sérum ° Congelé

 1 semaine ° Immunoturbidimétrie 37.00 EUR non remboursable Congeler l'échantillon dans l'heure

IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum**RAM4**

2mL Sérum (exclusivement) ° Réfrigéré

 14 jours ° Enzymoimmunologie B 50 - réf 0968

IgE spécifiques - dépistage allergènes respiratoires et alimentaires -Phadiatop® nourrisson**PHABB**

300µL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie Réservé aux enfants jusqu'à l'âge de 2 ans B 50 - réf 1201

IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®**PHA**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie B 50 - réf 1201

IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® adulte - fx5/fx24/fx25**TROA**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie B 50 - réf 1202 x 3 CUMULABLE UNIQUEMENT avec un mélange pneumallergènes (aucun cumul avec des RAST unitaires hormis certains médicaments, venins d'hyménoptères et latex).

IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® enfant - fx26/fx27/fx28**TROE**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie B 50 - réf 1202 x 3 CUMULABLE UNIQUEMENT avec un mélange pneumallergènes (aucun cumul avec des RAST unitaires hormis certains médicaments, venins d'hyménoptères et latex qui font l'objet de règles de nomenclatures particulières)

IgE spécifiques : latex - allergène unique**IGESL**

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie Préciser les allergènes B 50 - réf 0966 un seul allergène remboursable, réf. NABM CUMULABLE avec tous les codes nomenclatures Allergie

IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Hycor

IGEMH

2mL Sérum ° Réfrigéré

 7 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 22.00 EUR non remboursable à l'exception des IgE spécifiques : Pénicilline G, Pénicilline V, Ampicilline, Amoxicilline, Morphine, Pholcodine, Suxaméthonium et Amonium IV (B50 - réf 0968 maximum 5 médicaments, réf NABM cumulable avec tous les codes nomenclature Allergie)

IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia

IGESM

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 0968 maximum 5 médicaments, réf. NABM CUMULABLE avec tous les codes nomenclatures Allergie

IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor

CPH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 7 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1204 maximum 5 pneumallergènes et 5 trophallergènes par prescription. Les médicaments, les venins d'hyménoptères et le latex font l'objet d'une nomenclature particulière. Ref. non cumulable avec IgE totales et IgE spécifiques multiallergéniques (mélange ou individualisés sur même support).

IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia

CP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1204 maximum 5 pneumallergènes et 5 trophallergènes par prescription. Les médicaments, les venins d'hyménoptères et le latex font l'objet d'une nomenclature particulière. Ref. non cumulable avec IgE totales et IgE spécifiques multiallergéniques (mélange ou individualisés sur même support).

IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes

MR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1201 un seul mélange pneumallergènes CUMULABLE UNIQUEMENT avec 3 mélanges trophallergènes (aucun cumul avec des RAST unitaires hormis certains médicaments, venins d'hyménoptères et latex).

IgE spécifiques : Puce ALEX - sérum

ALEX

200µL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° M-EIA

 Dosage de 300 extraits d'allergènes natifs et moléculaires
Dosage des IgE totales
Inhibition intégrée des CCD (Cross-Reactive Carbohydrate Déterminants)

 275.00 EUR non remboursable

IgE spécifiques - trophallergènes - allergène unique - Hycor

CTH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 7 jours °

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1205 maximum 5 trophallergènes et 5 pneumallergènes par prescription. Les médicaments, les venins d'hyménoptères et le latex font l'objet d'une nomenclature particulière. Ref. non cumulable avec IgE totales et IgE spécifiques multiallergéniques (mélange ou individualisés sur même support).

IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia

CT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1205 maximum 5 trophallergènes et 5 pneumallergènes par prescription. Les médicaments, les venins d'hyménoptères et le latex font l'objet d'une nomenclature particulière. Ref. non cumulable avec IgE totales et IgE spécifiques multiallergéniques (mélange ou individualisés sur même support).

IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum

MA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 1202 trois mélanges de trophallergènes
CUMULABLE UNIQUEMENT avec un mélange
pneumallergènes (aucun cumul avec des RAST unitaires
hormis certains médicaments, venins d'hyménoptères et
latex).

IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique

IGESV

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 B 50 - réf 0967 maximum 5 allergènes, réf. NABM
CUMULABLE avec tous les codes nomenclatures Allergie

IgE totales - larmes

IGEL

400µL Larmes ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Prélèvement de larme fait par l'ophtalmologiste

 19.00 EUR non remboursable

IgE totales - sérum

IGE

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 ATTENTION : interférence possible chez les patients
traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous
complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET
indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

 B 40 - réf 1200 Non cumulable avec les références
nomenclature 1201,1202,1203,1204,1205.

IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes - sérum

MM

1 * 1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 75 - réf 1203 un seul multitest par prescription (mixtes ou
pneumallergènes ou trophallergènes).
Non cumulable avec les autres références nomenclature
allergie(1200,1201,1202,1204,1205).

IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum

MP

1 * 1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 75 - réf 1203 un seul multitest par prescription
(pneumallergènes ou trophallergènes ou mixtes)
Non cumulable avec les autres références nomenclature
allergie(1200,1201,1202,1204,1205)

IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum

MT

1 * 1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 75 - réf 1203 un seul multitest par prescription
(trophallergènes ou pneumallergènes ou mixtes).
Non cumulable avec les autres références nomenclature
Allergie(1200,1201,1202,1204,1205).

IGF-1 - Somatomédine C - sérum

SOMC

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 75 - réf 0780

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser si traitement pour acromégalie

IGF-2 - sérum

IGF2 *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 mois ° Enzymoimmunologie

 61.00 EUR non remboursable

IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum

IGFBP

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° CLIA

 B 100 - réf 0783

 Préciser l'âge du patient.
Joindre les renseignements cliniques

IgG4 spécifiques - sérum

RG41

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 34.00 EUR non remboursable

IgG - immunoglobulines G - LCR

IGGPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° Néphélométrie ou Turbidimétrie

 B 35 - réf 1614

IgG - immunoglobulines G - sérum

IGG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 20 - réf 1815 /cotation maximale B56 - réf. 1385 si IgA + IgG + IgM

IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 1 - sérum

IGG1

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 70 - réf 1392 / B130 - réf. 1393, 2 ss-classes / B 190 - réf. 1394, 3 et 4 ss-classes

IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 2 - sérum

IGG2

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 70 - réf 1392 / B130 - réf. 1393, 2 ss-classes / B 190 - réf. 1394, 3 et 4 ss-classes

IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 3 - sérum

IGG3

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 70 - réf 1392 / B130 - réf. 1393, 2 ss-classes / B 190 - réf. 1394, 3 et 4 ss-classes

IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 4 - sérum

IGG4

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 70 - réf 1392 / B130 - réf. 1393, 2 ss-classes / B 190 - réf. 1394, 3 et 4 ss-classes

IgG spécifiques - sérum

RGG1

1mL Sérum ° Réfrigéré

 7 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 Préciser les allergènes

 34.00 EUR non remboursable

IgM - immunoglobulines M - sérum

IGM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 Préciser l'âge et le sexe du patient

 B 20 - réf 1816 /cotation maximale B56 - réf. 1385 si IgA + IgG + IgM

Imatinib - Plasma

IMAT *

1mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 15 jours ° Chromatographie liquide Haute Performance / Spectrométrie de masse à haute résolution

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R7 : Glivec)

 B 140 - réf 1657

Imipramine - Sérum

IMIP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° LCMS

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Immunofixation - sérum

IFS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunofixation (gel)

 B 160 - réf 1571 ; B 180 - réf 1572 (électrophorèse + immunofixation)

 A proscrire : sérum lactescent ou hémolysé

Immunophénotypage des hémopathies malignes

IPHEN

Sang total EDTA 1 tube 5 mL (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis sanguin non coloré.
Moelle sur EDTA 1 tube > 0,5 mL (proscrire les tubes avec séparateur) + 1 frottis médullaire non coloré ° T° ambiante

 Délai selon indication : - hémopathies aiguës : 2 jours - autres hémopathies : 5 jours ° Cytométrie en flux

 B 300 - réf 1103 x 2

 Analyse non réalisable sur LCR
Prélever le jour de l'envoi de l'échantillon
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Pour l'immunophénotypage des monocytes le prélèvement ne pourra pas être analysé au delà de 48H.
Immunophénotypage des monocytes non réalisable sur prélèvement médullaire.
Joindre les résultats de la dernière NF/Plaquettes.

Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total

B1

3mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 jour ° Cytométrie en flux

 29.00 EUR non remboursable

 Ne pas prélever le samedi
Prélever le jour de l'envoi de l'échantillon
Joindre la numération lymphocytaire du jour pour obtenir un résultat interprétable.

Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total

CD48

3mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 jour ° Cytométrie en flux

 B 78 - réf 1122

 Prélever le jour de l'envoi de l'échantillon
Prélèvement du samedi au jeudi
Joindre la numération lymphocytaire du jour pour obtenir un résultat interprétable ou la faxer au 01 49 59 17 98

Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total

NK

3mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 jour ° Cytométrie en flux

 29.00 EUR non remboursable

 Ne pas prélever le samedi
Joindre la numération lymphocytaire du jour pour obtenir un résultat interprétable.
L'échantillon doit nous parvenir dans les 24H suivant le prélèvement

Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total

CD57

3mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 jour ° Cytométrie en flux

 29.00 EUR non remboursable + 29 euros HN pour la réalisation des NK nécessaires au rapport CD57/CD56

 Ne pas prélever le samedi
Prélever le jour de l'envoi de l'échantillon
Joindre la numération lymphocytaire du jour pour obtenir un résultat interprétable.

Indinavir - Sérum

INDI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance ou Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps

INFAC

1mL Sérum ° Réfrigéré

 14 jours ° Enzymoimmunologie

 105.00 EUR non remboursable

 Eviter les sérums lipidiques et les prélèvements congelés/décongelés plus d'une fois.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R46 : Anti-TNF)

Inhibine A - ultra sensible - sérum

INHIA *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 mois ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 0777

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R38:Inhibine A)
Nous transmettre obligatoirement le contexte clinique :
- femme ménopausée
- contexte tumoral
Analyse réservée aux femmes : Inhibine A inexistante chez les hommes.

Inhibine B

INHIB

1mL Sérum non hémolysé (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 0777

 Joindre les renseignements cliniques et échographiques
Réaliser IMPERATIVEMENT le prélèvement entre le 3ème et 4ème jour du cycle.

Inhibine B - Enfant - sérum

INHIE *

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 mois ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 0777

 Réservé exclusivement pour les enfants de moins de 5 ans
Joindre les renseignements cliniques

INH - Isoniazide - Sérum

INH *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 15 jours ° Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

 B 120 - réf 1653

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Congeler l'échantillon dans l'heure
Privilégier le prélèvement 3h après la prise médicamenteuse(per os). Egalement possible T0 : avant la prise médicamenteuse, Tmax : 1/2h après l'injection

Instabilité microsatellitaire

MICSA *

Bloc tumoral inclus en paraffine - joindre impérativement un bloc / lame de tissu sain avec le bloc tumoral ° T° ambiante

 3 semaines ° PCR

 550.00 EUR non remboursable

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Insuline - sérum

INS

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 69 - réf 7422

 Il est impératif de décanter rapidement le sérum
Prélèvement à jeun
Pour le calcul de l'index HOMA, transmettre la valeur de la glycémie à jeun du même jour
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum

INFAA *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Test de neutralisation

 Joindre les renseignements cliniques

 47.00 EUR non remboursable (dosage de l'Interféron) +
59.00 EUR non remboursable (si la recherche d'anticorps
est réaliséé)

Interféron alpha - LCR

INAPL *

500µL LCR ° Réfrigéré

 15 jours ° Méthode biologique

 Joindre les renseignements cliniques

 47.00 EUR non remboursable

Interféron alpha - liquide biologique

INFAD *

1mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 1 semaine ° Méthode biologique

 Joindre les renseignements cliniques

 47.00 EUR non remboursable

Interféron alpha - sérum

INFA *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Méthode biologique

 L'échantillon doit nous parvenir dans les 24H suivant le
prélèvement
Joindre les renseignements cliniques

 47.00 EUR non remboursable

Interféron gamma - LCR

INGPL *

500µL LCR ° Congelé < 4h

 4 semaines ° Enzymoimmunologie

 Joindre les renseignements cliniques

 64.00 EUR non remboursable

Interféron gamma - sérum**INFGS**

3mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 55.00 EUR non remboursable

Interleukine 28B (IL28B polymorphisme C/T rs 12979860) - génotypage - sang total**IL28B ***

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 9 jours ° Discrimination allélique par courbe de fusion 116.00 EUR non remboursable Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Interleukine IL -10 - liquide**IL10D ***

200µL LCR, humeur aqueuse ou humeur vitrée ° Congelé < 4h

 60 jours ° Luminex (Biorad) 55.00 EUR non remboursable Préciser la nature de prélèvement
Préciser l'oeil prélevé (droit ou gauche).

Interleukine IL -10 - sérum**IL10**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-1 alpha - sérum**IL1A**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-1 bêta - sérum**IL1B**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-2 - récepteur - plasma**RIL2 ***

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 60 jours ° Enzymoimmunologie 55.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-2 - sérum**IL2**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-4 - sérum**IL4**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-5 - plasma**IL5 ***

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 1 mois ° Enzymoimmunologie 55.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-6 - liquide**IL6D ***

200µL LCR, humeur aqueuse ou humeur vitrée ° Congelé < 4h

 60 jours ° Luminex (Biorad) 55.00 EUR non remboursable Préciser la nature de prélèvement
Préciser l'oeil prélevé (droit ou gauche).

Interleukine IL-6 - sérum**IL6**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Interleukine IL-8 - sérum**IL8**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 85.00 EUR non remboursable

Intolérance primaire au lactose - caractérisation génétique - sang total**LCT**

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 mois ° kit LAMP Human Lactose Intolerance CE-IVD, Loop-mediated isothermal amplification 154.00 EUR non remboursable Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Iode - sérum**IOD**

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse 30.00 EUR non remboursable

Iode - urines

IODU

1tube(s) Urines de la 1ere miction du matin (ou éventuellement échantillon du recueil des urines de 24 heures pour rechercher une surcharge)

Ou

Urines de fin de poste de travail pour la médecine du travail ° Réfrigéré

 4 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 33.00 EUR non remboursable

 Préciser la diurèse
Noter sur le bon de demande s'il s'agit d'une Médecine du Travail

 T28 : tube urines (4mL)

Ionogramme fécal - selles

IONSP

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 7 jours ° Ionométrie

 B 45 - réf 1626

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Isavuconazole - Sérum

ISAV *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 47.00 EUR non remboursable (47.00 HN non remboursable x3 si 3 temps)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Isoleucine - plasma

ILEU

1mL Plasma Hépariné ° Congelé

 1 semaine ° HPLC

 53.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Isopropanol - Sérum

PANOL *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme

 47.00 EUR non remboursable

 Préciser le contexte clinique
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Isovaleryl glycine - urines

IVAG *

10mL Urines d'une miction ° Congelé < 4h

 1 semaine °

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Itraconazole et métabolite hydroxylé - Sérum

ITRA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 47.00 EUR non remboursable par dosage

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

JAK2 - gène - mutation VAL617PHE (V617F) - sang total

JAK2

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 10 jours ° PCR temps réel

 308.00 EUR non remboursable .
Tarification RIHN : nous consulter

 Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Pour un prélèvement datant de plus de 3 jours le résultat est rendu avec une réserve. Eviter de prélever le vendredi et veille de jours fériés
Joindre les résultats de la dernière NF/Plaquettes.
L'attestation de consultation et le consentement de la patiente ne sont pas obligatoires pour l'analyse.

Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total

FOLEJ

2mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 1 jour ° Chemiluminescence

 10.00 EUR non remboursable

 Prélèvement à jeun

Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total

GRAEJ

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 21 jours ° Chromatographie en phase gazeuse

 75.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Albumine - sérum**ALBJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie 2.00 EUR non remboursable Préciser l'âge et le sexe du patient

Juvenalis - Aluminium**ALUJ**

2mL Plasma héparinate de sodium, hépariné, héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 8 jours ° ICP/MS 16.00 EUR non remboursable Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi.

Juvenalis - Apolipoprotéines A1 - sérum**APOAJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie 2.00 EUR non remboursable Prélèvement à jeun

Juvenalis - Apolipoprotéines B - sérum**APOBJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie 2.00 EUR non remboursable Prélèvement à jeun

Juvenalis- Béta-défensine 2 - selles**BDEFJ**

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA 47.00 EUR non remboursable

Juvenalis - calprotectine - selles

CALPJ

Selles échantillon ° Réfrigéré

 2 jours ° Enzymoimmunologie

 62.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Utiliser des petits pots

Juvenalis - Candida albicans - sérologie dépistage - sérum

CANDJ

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Enzymoimmunologie et Hémagglutination indirecte

 24.00 EUR non remboursable

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Juvenalis - CAR - index - Salive

CARJ

0.5mL 0,5 mL salive T0 (prélèvement dans salivette)
0,5 mL salive T30 (prélèvement dans salivette) ° Congelé < 4h

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Radioimmunologie

 86.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Juvenalis - Coenzyme Q10 - CoQ10

Q10J

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 60.00 EUR non remboursable

Juvenalis - CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum

CRPUJ

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Turbidimétrie

 2.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Cuivre**CUJ**

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 jours ° ICP/MS 8.00 EUR non remboursable Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi.
Prélèvement hémolysé refusé T4 : Tube héparine de sodium

Juvenalis - DAO - activité - sérum**DAOJ**

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie 47.00 EUR non remboursable

Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum**SDHAJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence ou Luminescence 16.00 EUR non remboursable ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Juvenalis Elastase - selles**ELASJ**

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 7 jours ° Enzymoimmunologie 32.00 EUR non remboursable Utiliser des petits pots
Les selles liquides sont acceptées mais le résultat d'Elastase risque d'être sous-estimé par dilution.

Juvenalis - Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total**HBA1J**

2mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 4 jours ° Electrophorèse 6.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Histamine - plasma

HISTJ

1mL Plasma EDTA non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Radioimmunologie ou Enzymoimmunologie

 47.00 EUR non remboursable

 Pas de prélèvement sur tube en verre
Agiter le tube doucement par retournement. Le sang total se conserve 2h à température ambiante ou 12h à +4°C. Dans ce temps, centrifuger 10 minutes à 900g. Aspirer le plasma doucement, à 1 cm minimum du culot. Après un choc anaphylactique, prélever 30 à 60 min après le début des signes cliniques (recommandations de la SFAR)

Juvenalis - HOMA - index

HOMAJ

2 * 1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour °

 19.00 EUR non remboursable

 Prélèvement à jeun
Il est impératif de décanter et congeler le sérum dans les 30 min qui suivent le prélèvement
NB : La glycémie à jeun, nécessaire au calcul de l'index de HOMA, est réalisée par le laboratoire Eurofins Biomnis.

Juvenalis - Homocystéine - plasma

HOCYJ

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Dosage immunologique latex automatisé

 60.00 EUR non remboursable

 Prélèvement à jeun
Centrifuger l'échantillon dans l'heure suivant le prélèvement puis décanter et congeler le plasma à -20°C; Si la centrifugation ne peut être réalisée dans l'heure, conserver le prélèvement dans la glace avant centrifugation (au maximum 8 heures).

Juvenalis - IgA - immunoglobulines A - selles

IGASJ

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA

 36.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

Juvenalis - IGF-1 - Somatomedine C - sérum

SOMCJ

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Chimiluminescence



 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Préciser si traitement pour acromégalie

Juvenalis - IgG - blanc d'oeuf - sérum**F1GJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie 31.00 EUR non remboursable

Juvenalis - IgG - caséine - sérum**F78GJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie 31.00 EUR non remboursable

Juvenalis - IgG - gluten - sérum**F79GJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoro-Enzymoimmunologie 31.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Interleukine IL-1 alpha - sérum**IL1AJ**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 50.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Interleukine IL-1 bêta - sérum**IL1BJ**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 50.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Interleukine IL-6 - sérum**IL6J**

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence 50.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Iode - urines**IODUJ**

1tube(s) Urines de 1ère miction du matin ° Réfrigéré

 4 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse 27.00 EUR non remboursable T28 : tube urines (4mL)

Juvenalis - LDL oxydés - sérum**LDLOJ**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie 87.00 EUR non remboursable

Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum**LPAJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Turbidimétrie 18.00 EUR non remboursable Ne pas confondre les lipoproteines Lp(a) avec les lipoparticules LPA1 lors de la rédaction du bon de demande. Libeller précisément la demande

Juvenalis - Magnésium - sérum**MGJ**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie 2.00 EUR non remboursable

1g Selles ° T° ambiante

 6 semaines ° Séquençage nouvelle génération

 250.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le kit JUK12 (Kit Microbiote) à commander sur Biomnis Connect
Utiliser le bon de demande spécifique JU - B38 : Microbiote intestinal
Le niveau du prélèvement doit être en-dessous ou au niveau du trait bleu. Il ne doit pas dépasser le trait bleu.

 JUK12 : Kit Microbiote

5 ml sérum : réfrigéré;
2 x 2 ml sérum : congelé ;
1 ml plasma citraté congelé °

 3 semaines °

 80.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

5 ml sérum : réfrigéré;
2 x 2 ml sérum : congelé ;
1 ml plasma citraté congelé °

 3 semaines °

 80.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - BasicCheck

BASIC *

3 mL sang total EDTA : réfrigéré /
2 x 4 ml sérum : réfrigéré /
1 mL sérum : congelé /
2 mL sérum : congelé (1 aliquote spécifique) /
1 mL sérum (à l'abri de la lumière) : congelé <90 min /
1 mL plasma citraté : congelé °

 3 semaines °

 150.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - DermaCheck

DERMA *

5 ml sérum : réfrigéré;
1 mL sérum : congelé;
1 mL sérum (à l'abri de la lumière) : congelé <90 min;
4 ml urines (1ère miction du matin): réfrigéré °

 2 semaines °

 80.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - DigestCheck

DIGES *

1 échantillon de selles ° Réfrigéré

 4 semaines °

 175.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Joindre le questionnaire de santé spécifique (JU-Q01 : questionnaire de santé JUVENALIS)
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

2 x 3 mL sang total EDTA : réfrigéré;
2 x 3 mL sérum : réfrigéré;
2 mL sérum (abri lumière) : congelé <90 min;
2 mL sérum : congelé;
1 mL plasma citraté : congelé °

 4 semaines °

 145.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

3 mL sang total EDTA : réfrigéré;
4 mL sérum : réfrigéré;
2 mL sérum (abri lumière) : congelé <90 min;
2 mL sérum : congelé;
1 mL plasma citraté : congelé °

 4 semaines °

 145.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

3 mL sérum : réfrigéré;
4 mL d'urines (1ère miction du matin) : réfrigéré °

 2 semaines °

 40.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Joindre le questionnaire de santé spécifique (JU-Q01 : questionnaire de santé JUVENALIS)
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - MiniCheck

MINI *

2 x 2 ml sérum : réfrigéré;
2 x 1 ml sérum : réfrigéré;
2 x 2 ml sérum : congelé;
1 ml de plasma citraté : congelé °

 3 semaines °

 99.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - NutriCheck

NUTRI *

3 ml sang total EDTA : réfrigéré;
2 x 3 ml sérum : réfrigéré;
1 mL sérum(à l'abri de la lumière): congelé <90 min;
1 ml plasma citraté : congelé °

 4 semaines °

 145.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - OxyCheck

OXYC *

2 x 2 ml plasma hépariné : réfrigéré /
1 ml de sérum : congelé (<4h) /
1 ml de sérum : réfrigéré /
2 ml plasma hépariné : congelé (<1h30) /
1 culot globulaire héparine de lithium : congelé (<1h) °

 5 semaines °

 249.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel - VeggieCheck

VEGAN *

2 x 3 mL sang total EDTA : réfrigéré;
4 mL sérum : réfrigéré;
1 mL sérum (abri lumière) : congelé<90min;
1 mL plasma citraté : congelé;
4 mL d'urines (1ère miction du matin) : réfrigéré; °

 4 semaines °

 130.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Joindre le questionnaire de santé spécifique (JU-Q01 : questionnaire de santé JUVENALIS)
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Panel Vitamines

VITAM *

3 mL sang total EDTA :réfrigéré;
3 x 3 mL sang total EDTA(à l'abri de la lumière): congelé;
1 mL sérum : réfrigéré;
1 mL sérum (abri lumière): congelé <90 min;
2 mL plasma héparinate de Lithium(à l'abri de la lumière) :congelé °

 3 semaines °

 125.00 EUR non remboursable

 Il s'agit d'un panel d'analyses, qui doit entièrement être transmis à Eurofins Biomnis, sans être dissocié
Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Prélèvement à jeun
Consulter le protocole spécifique pré-analytique(JU-P47)
Il est impératif d'identifier la nature du prélèvement sur chaque tube envoyé.
Joindre le questionnaire de santé spécifique (JU-Q01 : questionnaire de santé JUVENALIS)
Ne pas associer sur un même dossier bilan Juvenalis et bilan Eurofins Biomnis

Juvenalis - Préalbumine - sérum

PREAJ

1mL Sérum °

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 6.00 EUR non remboursable

 Préciser l'âge et le sexe du patient

Juvenalis - Sélénium

SEJ

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur F54) ° Réfrigéré

 1 semaine ° ICP/MS

 35.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Juvenalis - Sulfate de prégnénone - sérum

SPREJ

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  10 jours ° Radioimmunologie
-  38.00 EUR non remboursable

-  RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

Juvenalis - T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum

FT3J

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Electrochimiluminescence
-  8.00 EUR non remboursable

-  ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Juvenalis - T3 - Triiodothyronine reverse - sérum

T3REJ

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  1 mois ° Radioimmunologie
-  80.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Joindre les renseignements cliniques
Joindre les résultats du bilan thyroïdien

Juvenalis - Testostérone biodisponible - sérum

TBHJ

3mL Sérum ° Congelé < 4h

-  4 jours ° Radioimmunologie
-  22.00 EUR non remboursable

-  Proscrire prélèvement lipémique
Prélèvement à jeun

Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum

TNFJ

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chemiluminescence
-  50.00 EUR non remboursable

Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum

TSHJ

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 7.00 EUR non remboursable

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Juvenalis - Vitamin B1 - Thiamine

VB1SJ

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 6 jours ° HPLC

 34.00 EUR non remboursable

 Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Juvenalis - Vitamine B2 - Riboflavine

VB2J

1mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 42.00 EUR non remboursable

 Sang total impératif
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal

VB6SJ

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 6 jours ° HPLC

 22.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Juvenalis - Vitamine C - acide ascorbique

VCPJ

2mL Plasma Héparine de lithium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 7 jours ° HPLC

 43.00 EUR non remboursable

 Centrifuger et congeler dans les 20 minutes
Prélèvements à réaliser dans votre laboratoire exclusivement les lundis, mardis ou mercredis et à transmettre le jour même à Eurofins (DELAÏ DE CONSERVATION DU PLASMA héparine de lithium CONGELE DE 48 HEURES AVANT TECHNIQUE).
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence 9.00 EUR non remboursable

-  La prise en charge de cet acte est limitée aux situations suivantes :
- suspicion de rachitisme
 - suspicion d'ostéomalcie
 - suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation
 - avant et après chirurgie bariatrique
 - évaluation et prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes répétées
 - respect des résumés des caractéristiques du produit(RCP) des médicaments préconisant la réalisation de l'acte 1139
- ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Juvenalis - Vitamine E - Tocophérol - Plasma

VEJ

2mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 jours ° HPLC 27.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans les 90 minutes. Domicile déconseillé
- 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
- Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Juvenalis - Vitamine PP - Niacine

VPPJ

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Ultra Haute Performance (UPLC) 34.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
- Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Juvenalis - Zinc

ZNJ

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 3 jours ° ICP/MS 8.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi. Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
- Proscrire les prélèvements hémolysés

 T4 : Tube héparine de sodium

Juvenalis - Zonuline - selles

ZONUJ

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA

 52.00 EUR non remboursable

Kétamine - Sérum

KETAS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 37.00 EUR non remboursable

 Réalisé uniquement en cas d'INTOXICATION. Aucun dosage réalisé en suivi thérapeutique. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Kétamine - urines

KETAU *

5mL Urines échantillon ° Congelé

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 37.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé. Réalisé uniquement en cas d'INTOXICATION. Aucun dosage réalisé en suivi thérapeutique. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Ketoconazole - Sérum

KETO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 94.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Kétoprofène - Sérum

KET *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 32.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Kingella kingae - diagnostic direct - PCR

KINGK

Liquide articulaire, sang, biopsies, pus, ponctions, écouvillons. ° Réfrigéré

 3 jours ° RT - PCR en temps réel

 108.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture (sachet VIOLET S14 fourni)

Kininogène de haut poids moléculaire - activité - plasma

KIN

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 mois ° Technique chromométrique

 18.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Lacosamide - Vimpat - Sérum

VIMPA *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines °

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Lamivudine - plasma

LAMIV *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Lamotrigine - sérum

LAMO

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 120 - réf 1671

 Dans le cadre du suivi thérapeutique, le prélèvement doit être réalisé au taux résiduel (juste avant la prise médicamenteuse)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Levetiracetam; Gabapentine; Lamotrigine; Oxcarbazepine/10-OH-Carbazepine; Topiramate.

L-carnitine - plasma séminal

LCAR

1mL Plasma séminal sur tube fluoré ° Congelé < 4h

 15 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 85 - réf 0073

 Recueil effectué après 2 à 5 jours d'abstinence.
Préciser obligatoirement le volume de l'éjaculat et le délai d'abstinence et si possible le pH, la numération des spermatozoïdes.
Centrifuger et congeler immédiatement le surnageant

LDH - Lactate-déshydrogénase

LDHD

2mL Liquide biologique autre que du sérum sauf LCR ° T° ambiante

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 7 - réf 1521

 Proscrire les prélèvements hémolysés

LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes

ILDH

2mL Sérum non hémolysé (pas de tube de 10 mL) ° T° ambiante

 1 semaine ° Electrophorèse

 B 6 - réf 0521 + 42.00 EUR non remboursable

 Prélever le jour de l'envoi de l'échantillon
Proscrire les prélèvements hémolysés

LDH - Lactate-déshydrogénase - sérum

LDH

1mL Sérum ° T° ambiante

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0521

 Proscrire les prélèvements hémolysés, sur EDTA, fluorure de sodium et oxalate de potassium

LDL Oxydés - sérum

LDLOX

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie

 96.00 EUR non remboursable

Lécithine cholestérol acyl transférase - sérum

LCAT *

2mL Sérum ° Congelé

 6 mois ° Technique immunoenzymatique

 40.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
A fournir impérativement :
- bilan lipidiques du patient et de ses apparentés le cas échéant
 - antécédents médicaux
 - indication et contexte clinique
 - coordonnées du prescripteur
- 2 aliquotes spécifiques pour cette analyse

Légionellose antigène LP1 - urines

LEGAG

10mL Urines ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochromatographie

 B 90 - réf 5235

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les urines sur conservateur borate sont acceptées
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Légionellose - diagnostic direct - PCR

LEGBM

Aspiration bronchique, Expectations, LBA, Liquide de ponction (dont pleural, péricardique), biopsie (dont pulmonaire, digestive, valve cardiaque) ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie confirmation IgG - sérum

LEGIT

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunofluorescence

 B 120 - réf 1337

-  Réalisation systématique en cas de dépistage positif

Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum

LEGIO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Enzymoimmunologie

 B 60 - réf 1336 ; si positif titrage B 120 - réf 1337

-  Si dépistage positif, réalisation du titrage des sérogroupes 1 à 6

Légionellose - sérotypage

LEGIS *

Souche ° T° ambiante

 15 jours ° Agglutination

 B 40 - réf 5249

Leishmaniose - diagnostic direct - PCR

LEIBM *

Biopsie cutanée (sauf biopsie cutanée sur buvard), biopsie ganglionnaire, sang total EDTA, moëlle osseuse sur EDTA ° Réfrigéré

 2 semaines ° PCR

 B 100 - réf 4346

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Sang sur buvard : utiliser du papier Whatmann 3mm, à placer dans un contenant stérile adapté au volume. A défaut, utiliser le buvard du test de Guthrie.

Joindre les renseignements cliniques

Biopsies : à placer dans un contenant stérile adapté au volume.

Les biopsies cutanées sur buvard ne sont pas acceptées.

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Leishmaniose - sérologie confirmation - sérum

LEIWB

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4345

Leishmaniose - sérologie - sérum

LEIS

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie et Immunofluorescence

 B 60 - réf 4344

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Lepticur - sérum

TROPA *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Leptine - sérum

LEP

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
ELISA

 66.00 EUR non remboursable

 Préciser obligatoirement la taille, le poids, l'âge du patient et la date du prélèvement

Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum

LEPTA *

2mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Micro-Agglutination

 105.00 EUR non remboursable

 A partir de 5 jours après le début des symptômes
Joindre la fiche de renseignements spécifique (CNR10 :
Leptospirose)

Leptospirose - diagnostic direct - PCR

LEPBM

1 mL Sérum, Plasma EDTA, Sang total EDTA, 10 mL Urines, 0.5 mL LCR : Réfrigéré °

 3 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 5262 (Sang, Sang total, Plasma, Sérum); 61.00
EUR (Urines, LCR)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R35 : Infectiologie)

A réaliser uniquement en phase virémique(dans les dix
premiers jours après le début de la maladie)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet
S14

Durée et température de stabilité : 5 jours entre la date de
prélèvement et arrivée en technique

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents
infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Leptospirose - sérologie IgM - sérum

LEPT

2mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 7 jours ° Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4718

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R35 : Infectiologie)

A réaliser uniquement en phase immune(détection des
IgM, sept jours environ après le début de la maladie,
pendant deux-trois mois)

Lévétiracetam - sérum

KEP

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 jours ° LCMSMS

 B 120 - réf 1671

-  Dans le cadre du suivi thérapeutique, le prélèvement doit être réalisé au taux résiduel (juste avant la prise médicamenteuse)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Levetiracetam; Gabapentine; Lamotrigine; Oxacarbazepine/10-OH-Carbazepine; Topiramate.

Levofloxacine - Sérum

LEVOX *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Lévomépromazine - Sérum

LEVO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Levures - antifongogramme - prélèvements divers

AMYC *

Prélèvements divers ° T° ambiante

 2 semaines °

 B 40 - réf 0271

-  Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
-  S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

LH - Hormone Lutéostimulante - sérum

LH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 45 - réf 0472

-  Joindre les renseignements cliniques.
Préciser âge et période du cycle
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

LH - Hormone Lutéostimulante - urines

LHU *

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

 15 jours ° Chimiluminescence

 54.00 EUR non remboursable pour les enfants(comprend le dosage de la FSH urinaire) Adulte: 27.00 EUR non remboursable

 Pour les enfants, inclus systématiquement la FSH urinaire en plus
Préciser la diurèse

Lidocaïne - Sérum

LIDO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 70 - réf 1676

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Lipase - liquide de ponction

LIPAD

1mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

 1 jour ° Colorimétrie

 18.00 EUR non remboursable

Lipase - sérum

LIPA

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0524

Lipase - urines

LIPAU

1tube(s) Urines échantillon de 24H ou miction ° Réfrigéré

 1 jour ° Colorimétrie

 18.00 EUR non remboursable

 Préciser la diurèse
 T28 : tube urines (4mL)

Lipoprotéine Lp-a - sérum

LPA

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Turbidimétrie
-  20.00 EUR non remboursable

-  Ne pas confondre les lipoproteines Lp(a) avec les lipoparticules LPA1 lors de la rédaction du bon de demande. Libeller précisément la demande

Listeria monocytogenes - diagnostic direct - PCR

LISBM

2 mL Sang total EDTA ou Plasma EDTA ou Sérum, 500µL(minimum) LCR ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Lithium érythrocytaire - sang total

LIE *

2mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

-  4 jours ° Spectrométrie
-  B 20 - réf 0557

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Forme standard : prélèvement le matin 12H après la prise et avant toute nouvelle prise
Forme LP (administration prolongée) administrée le soir : prélèvement le matin 12H après la prise ou prélèvement le soir 24H après la prise et avant toute nouvelle prise

Lithium - sérum

LI

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Colorimétrie
-  B 20 - réf 0557

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Forme standard : prélèvement le matin 12H après la prise et avant toute nouvelle prise
Forme LP (administration prolongée) administrée le soir : prélèvement le matin 12H après la prise ou prélèvement le soir 24H après la prise et avant toute nouvelle prise
Proscrire tout tube contenant de l'héparine de lithium ou iodo-acétate

Loflazépate d'Ethyl

LOFLA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 Délai variable : contacter notre Secrétariat Médical ° HPLC

 B 100 - réf 1662

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Lopinavir - Sérum

LOPI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

-  Prélèvement T0 (avant la prise), T3h et T5h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Loprazolam - Sérum

LOPRA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Lorazépam - Sérum

LORAZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Lormetazépam - Sérum

LORME *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Loxapine - Sérum

LOXAP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

LSD - Diéthylamide acide lysergique

LSDS *

2mL Sérum (à l'abri de la lumière) (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 95 - réf 1659

 Congeler IMPERATIVEMENT dans les 4 heures
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

LSD - Diéthylamide acide lysergique - liquide biologique

LSDD *

2mL Liquide biologique (à l'abri de la lumière) ° Congelé

 2 mois ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 184.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

LSD - Diéthylamide acide lysergique - urines

LSDC *

1tube(s) Urines échantillon (à l'abri de la lumière) ° Congelé

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 90 - réf 0659

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Lyso-Gb3

LGB3 *

3mL plasma EDTA (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé < 4h

 6 semaines ° Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Centrifuger, décanter, congeler rapidement

Lysozyme - sérum

LYSO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 4 jours ° Turbidimétrie

 B 60 - réf 1533

Magnésium érythrocytaire - Sang total

MGE *

3mL Sang total hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 jours ° Spectrométrie

 B 6 - réf 0584

Magnésium - sérum

MG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0584

Magnésium - urines

MGU

1tube(s) urines des 24H acidifiées (pH égal à 1) ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 2012

 Conserver les urines au frais pendant le recueil.
Urines acidifiées avec de l'HCL
Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Maladie du poumon de fermier - confirmation - sérum

FERMC

500µL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° Immunoélectrophorèse

 B 120 - réf 4350 x 2

Maladie du poumon de fermier - dépistage - sérum

FERM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4349 x 2

 Si dépistage positif, un test de confirmation est réalisé

Maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux - dépistage - sérum

OIS

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4347 x 2 ; itératif B 60 - réf 6347 x 2

 Si dépistage positif, un test de confirmation est réalisé
Le test confirmation de poumon d'oiseau code = OISC ne peut être réalisé sans demande concomitante d'un test de dépistage code OIS
Si possible, préciser le type d'oiseaux

Manganèse - Sang total

MNST *

5mL Sang total hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 10 jours ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

Manganèse - Sérum

MN *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 15 jours ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

Manganèse - urines

MNU *

10mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

 15 jours ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail et en fin de semaine de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Maprotiline - Sérum

MAPRH *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° GCMS

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Maraviroc - Sérum

MARA *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise.
Joindre la fiche de renseignement clinique

Marqueurs des myosites - sérum

SYNTH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunodot

 72.00 EUR non remboursable

Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum

SCLER

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° Immunodot

 72.00 EUR non remboursable

Mélatonine - 3 temps - urines

MELT3 *

1tube(s) Urines ° Congelé < 4h

 5 semaines °

 86.00 EUR non remboursable

-  Faire 3 recueils d'urines :
- 20h à 8h
- 8h à 12h
- 12h à 20h
Noter le volume d'urines émis pour chacun des recueils et nous les transmettre avec 5 mL d'urines de chacun des recueils.

 T28 : tube urines (4mL)

Mélatonine - plasma

MELAS *

2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 mois ° Radioimmunologie

 40.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement nocturne IMPERATIF entre minuit et 4 heures du matin

Mélatonine - salive

MELSA

1 * 0.5mL Salive prélevée dans "Salivette" ° Congelé < 4h

 1 mois ° ELISA

 54.00 EUR non remboursable

-  RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale la nuit), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique. Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Mélatonine - urines

MELAU *

1tube(s) Urines ° Congelé < 4h

 5 semaines °

 86.00 EUR non remboursable

-  Faire 3 recueils d'urines :
- 20h à 8h
- 8h à 12h
- 12h à 20h
Noter le volume d'urines émis pour chacun des recueils et nous les transmettre avec 4 mL d'urines de chacun des recueils
Joindre les renseignements cliniques

 T28 : tube urines (4mL)

Mépipvacaine - sérum

MEPI *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 118.00 EUR non remboursable

 Préciser :
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
- l'heure du prélèvement
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Méprobamate - Sérum

MEPS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Méprobamate - urines

MEPU *

1tube(s) Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse

 B 100 - réf 0662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

 T28 : tube urines (4mL)

Mercure - cheveux

HGCH *

200mg Cheveux ° T° ambiante

 2 semaines ° Absorption atomique

 74.00 EUR non remboursable

 Couper une mèche de cheveux de la taille d'une allumette au ras du cuir chevelu
Placer cette mèche dans un tube en verre ou en matière plastique

Mercure - liquide biologique

HGD *

5mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 34.00 EUR non remboursable

 Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE

Mercure - salive

HGS *

5mL Salive ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 50.00 EUR non remboursable

 Pas d'ingestion de produits marins pendant plus de 72H avant le prélèvement.
Prélèvement en fin de poste de travail

Mercure - sang total

HGST *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 54.00 EUR non remboursable

 Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Pas d'ingestion de produits marins pendant plus de 72H avant le prélèvement.

Mercure - urines

HGU *

20mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 16 jours ° Absorption atomique

 54.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Pas d'ingestion de produits marins pendant plus de 72H avant le prélèvement.
Prélèvement en fin de poste de travail

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Métapneumovirus - HMPV - diagnostic direct - PCR

METBM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 136.00 EUR non remboursable

 Existe aussi en PCR multiplex (VIRBM) comprenant les détections des virus VRS, HMPV et Rhinovirus
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Metformine érythrocytaire - sang total

METFE *

5mL Sang total Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 118.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Metformine - liquide biologique

METFD *

2mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 118.00 EUR non remboursable

-  Préciser :
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
 - l'heure du prélèvement
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Metformine - Sérum

METFO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 118.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Méthadone - dépistage - urines

MTD

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunologie (KIMS)

 B 90 - réf 0659

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Méthadone et EDDP - Sérum

MTDS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 B 95 - réf 1659

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Méthաqualone - Sérum

MQUAL *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  B 95 - réf 1659

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Méthémoglobine - sang total

METHB

1mL Sang total Héparinate de lithium ° Réfrigéré

-  1 jour ° Spectrophotométrie
-  B 25 - réf 0559

Méthionine

METHI

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

-  1 semaine ° HPLC
-  53.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Méthotrexate - Sérum

METHO *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  B 80 - réf 1655

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Méthoxy 1 propanol 2 - 2PG1ME - urines

MEPRO *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  64.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
Prélèvement en fin de poste de travail
-  T18 : Flacon verre, bouchon PTFE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Méthylation MGMT

MGMT *

Bloc tumoral en paraffine ° T° ambiante

 3 semaines °

 418.00 EUR non remboursable .
RIHN : N532

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Méthylation MLH1 isolée

MLH1 *

Bloc tumoral en paraffine ° T° ambiante

 3 semaines °

 418.00 EUR non remboursable .
RIHN : N533

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.1298A>C - Sang total

MTHF2

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 9 jours ° LAMP PCR

 67.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H

Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total

MTHFR

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 9 jours ° LAMP PCR

 67.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Méthyléthylcétone - urines

MECET *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme

 53.00 EUR non remboursable

 Flacon en verre avec bouchon en PTFE
Prélèvement en fin de poste de travail

 T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Méthylisobutylcétone - urines

MIBK *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur ionisation de flamme
-  53.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
-  T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Méthylphénidate - Sérum

RITAL *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  B 95 - réf 1659

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Métoprolol - Sérum

MTPRO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  Délai variable : contacter notre Secrétariat Médical ° HPLC
-  41.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Miansérine - Sérum

MIAN *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° HPLC
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Microalbumine - urines

MALB

1tube(s) Urines de 24H ou échantillon ° Réfrigéré

-  1 jour ° Immunoturbidimétrie
-  B 14 - réf 1133

-  Préciser la diurèse
-  T28 : tube urines (4mL)

Microdélétions du Chromosome Y - (régions AZFa, AZFb, AZFc) - sang total

DELY

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 9 jours ° PCR multiplex

 160.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Midazolam - Sérum

MIDAZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Milnacipran - Sérum

MILNA *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 B 120 - réf 1665

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Minocycline - Sérum

MINO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Méthode microbiologique

 B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Mirtazapine - sérum

MIRTA

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Mitotane - plasma

MITH *

2mL Plasma Hépariné ° Congelé

 3 semaines ° HPLC

 B 140 - réf 1657

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)

Moclobémide - Sérum

MOCL *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)

Molybdène - plasma

MOLYP *

2mL Plasma Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie
de masse

 47.00 EUR non remboursable

Molybdène - urines

MOLYU *

2mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie
de masse

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR

MPOX

Écouvillonnage lésions cutanées, écouvillonnage génital, écouvillonnage anal, écouvillonnage oropharyngé/nasopharyngé,
biopsies de lésions cutanées, pus ° Réfrigéré

 2 jours ° PCR en temps réel

 B 150 - réf 5273 / 86 EUR non remboursable si exigences
particulières

 Pour les prélèvements sur écouvillons : milieu de transport
virologique, ne pas utiliser de milieu APTIMA ou eswab,
gratter les lésions afin de récupérer des cellules
Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un
tube sec
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés
tel quel(sans milieu de transport)
Joindre la fiche de renseignement cliniques spécifique
(R70-Virus_monkeypox PCR)
Transport UN3373 : diagnobox triple emballage

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture (sachet
VIOLET S14 fourni)

Morphologie des globules rouges

SCHIZ

1 Frottis sanguins minces non colorés ° T° ambiante

 1 jour ° Microscopie

 17.00 EUR non remboursable

Moxifloxacine - Sérum

MOXIF *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Préciser la posologie, l'heure de prélèvement et l'heure d'administration : taux "pic"(à la fin de la perfusion ou 2h après la prise per os)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

MUC1 Néphropathie - sang total

MUC1

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 1 mois ° SnapShot

 350.00 EUR non remboursable

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
Joindre les renseignements cliniques

Mucopolysaccharides - urines

MPSU *

30mL Urines échantillon de 24H ou miction (enfant) ° Congelé < 4h

 4 semaines °

 B 500 - réf 4001

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - prénatal

MUCOL

Liquide amniotique frais ou cultivé, trophoblaste frais ou cultivé ° T° ambiante

 1 semaine ° technique Elucigene CF EU2v1 ou séquençage

 B 700 - réf 4083

 5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R23 : Mucoviscidose)

5mL Sang total EDTA (exclusivement) ° T° ambiante

 10 jours ° technique Elucigene CF EU2v1 ou séquençage

 B 400 - réf 4041

 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R23 : Mucoviscidose)
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Mutation CXCR4 - Moëlle osseuse

CXCR4 *

Moëlle osseuse ° T° ambiante

 1 mois ° RT-PCR semi-quantitative

 275.00 EUR non remboursable

 Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat de l'immunophénotypage
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Mutation Domaine tyrosine kinase ABL

ABLR *

5 mL sang total EDTA ou 5 mL Moëlle ° T° ambiante

 1 mois ° Séquençage du transcrite de fusion BCR-ABL

 539.00 EUR non remboursable

 Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
- les renseignements cliniques et thérapeutiques
- le résultat de la NFS - plaquettes
- les précédents résultats de quantification BCR-ABL, si le suivi n'est pas réalisé au laboratoire

Mutation MYD88

MYD88 *

5 mL Sang total EDTA ou Moëlle ° T° ambiante

 1 mois ° RT-PCR semi-quantitative

 275.00 EUR non remboursable

 Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat de l'immunophénotypage
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies

Mutation PIK3CA isolée (Sanger)

PIK3 *

Bloc tumoral en paraffine ° T° ambiante

 3 semaines °

 440.00 EUR non remboursable

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Mutations BRCA1 et BRCA2 somatiques

BRCA5 *

Bloc tumoral en paraffine ° T° ambiante

 3 semaines °

 1787.00 EUR non remboursable .
RIHN : N453

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Mycobactéries - antibiogramme

ABMA

Souche pure sur milieu solide ou liquide (en triple emballage étanche) ° T° ambiante

 20 jours ° Milieu liquide ou solide

 B 60 - réf 0274 par antibiotique

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Préciser l'identification si elle est connue

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux aminoglycosides (NTMDR)

NTMDR

Souche pure sur milieu solide ou liquide (en triple emballage étanche) ° T° ambiante

 3 jours ° PCR - GenoType® NTM-DR (Hain)

 174.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Mycobactéries - culture

BKDEF

Expectoration (3 jours consécutifs), LBA, Aspiration bronchique, Prélèvements pulmonaires, Liquide pleural, Liquide d'ascite, Liquide articulaire, Liquide péricardique, Liquide gastrique, Tubage gastrique : 5 mL, Urines : 50 mL des urines du matin (3 jours consécutifs), LCR : 1 mL, Selles : 20 g, Biopsies, Ecouvillonnage : 2 écouvillons (ne pas ajouter de liquide), Pus ou abcès : 2mL ou écouvillons (ne pas ajouter de liquide), Sang total citraté : 10 mL minimum, Moëlle osseuse. ° Réfrigéré

 6 semaines (résultat définitif). Tout résultat positif est communiqué le jour même ° Milieu liquide et solide

 B 80 - réf 1242 sang, biopsie et selles / B 60 - réf 1241, autre prélèvement

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Préciser la nature de prélèvement
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Mycobactéries - examen direct

BKDIR

Expectoration (3 jours consécutifs), LBA, Aspiration bronchique, Prélèvements pulmonaires, Liquide pleural, Liquide d'ascite, Liquide articulaire, Liquide péricardique, Liquide gastrique, Tubage gastrique : 5 mL, Urines : 50 mL des urines du matin (3 jours consécutifs), LCR : 1 mL, Selles : 20 g, Biopsies, Ecouvillonnage : 2 écouvillons (ne pas ajouter de liquide), Pus ou abcès : 2mL ou écouvillons (ne pas ajouter de liquide). ° Réfrigéré

-  1 jour pour les prélèvements respiratoires, LCR, biopsie, selles.
-  2 jours pour les urines ° Auramine et Ziehl

 B 30 - réf 0240

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Mycobactéries - identification

BKAT

Souche pure sur milieu solide ou liquide (en triple emballage étanche) ° T° ambiante

-  2 à 5 jours ° Biologie moléculaire

 B 150 - réf 4101

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Préciser la nature de prélèvement
Préciser la date d'ensemencement

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide, l'éthionamide, aux fluoroquinolones et aux antibiotiques injectables de deuxième ligne (aminosides)

BKXDR

Prélèvements pulmonaires, liquide de ponction, ganglion, biopsies, urines (50 mL), LCR (1 mL)
Cultures positives à M. tuberculosis complex en BBL MGIT ° Réfrigéré

-  2 jours ° PCR en temps réel

 200.00 EUR non remboursable

-  Les prélèvements sanguins prélevés sur tubes héparinés sont refusés.
Notion de présence de Mycobacterium tuberculosis complex (PCR ou culture positives) à transmettre obligatoirement

 #VALEURMULTI

Mycobactéries - PCR détection de résistances à la Rifampicine (rpoB) et l'Isoniazide (katG, inhA) de M. tuberculosis complex (BKRES)

BKRES

Souche pure sur milieu solide ou liquide (en triple emballage étanche) ° T° ambiante

-  3 jours ° Biologie moléculaire

 174.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Prélèvements pulmonaires, tissulaires, liquide de ponction, Urines (30 mL), LCR (1 mL), biopsies, Sang total EDTA(1mL), Moëlle osseuse, expectoration (crachat). ° Réfrigéré

 2 jours ° Biologie moléculaire

 B 250 - réf 4102

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Mycobacterium tuberculosis - identification

Souche pure sur milieu solide ou liquide (en triple emballage étanche) ° T° ambiante

 1 à 5 jours ° Biologie moléculaire

 B 150 - réf 4101

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R12 : Mycobactéries)
Préciser la nature de prélèvement
Préciser la date d'ensemencement

 S10 : Diagnobox (triple emballage étanche)

Mycophénolate - plasma

2mL Plasma EDTA ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 65 - réf 1377 +38 euros non remboursables si calcul d'aire sous la courbe

 Joindre impérativement les fiche de renseignements cliniques:
- R13: Si dosage de médicaments pour dosage unique
- R31: Si Calculs d'Aires sous la courbe AUC. La fiche R31 doit accompagner IMPERATIVEMENT un ou plusieurs dossiers. Elle doit être complétée INTEGRALEMENT. Le calcul d'aire sous la courbe (AUC) est utilisé pour l'ajustement thérapeutique du CELLCEPT mycophénolate : une cinétique du CELLCEPT sur plusieurs temps de prélèvement après la prise du médicament doit être effectuée.

Chaque dosage fait l'objet d'un dossier séparé dans lequel il faut bien documenter les dates et heures de prélèvement et de prise pour identifier les différents temps T0 , T20, T30, T60, T120, T180.

Les temps nécessaires en fonction du contexte clinique et prescription sont indiqués dans le tableau joint avec la fiche R31 :

Les différents dossiers de dosage de mycophénolate à un temps donné sont rendus séparément et un calcul de l'AUC est ajouté.

Se référer au tableau

Prélèvement en tube Aptima (Hologic)- Kit K11 : Ecouvillonnage cervical, urétral, vaginal, Ecouvillonnage conjonctival, Biopsie, Stérilet. Pour les liquides suivants 200 µL minimum : Sperme, Liquide de Douglas, Liquide de Bartolin, Liquide péritonéal
Kit K14 : Auto-Prélèvement vaginal, Prélèvements et auto-prélèvements pharyngés et anaux - Kit K12 : urines du 1er jet du matin ° T° ambiante

-  3 jours ° Biologie moléculaire
-  30.00 EUR non remboursable

-  K11 : Kit de collecte d'écouvillons unisexes Aptima pour écouvillons endocervicaux et écouvillons urétraux
K12 : Kit de collecte d'urine Aptima pour échantillons d'urines
En absence de milieu APTIMA K12 : Envoyer un pot à urine stérile sans additif.
PROSCRIRE les pots munis d'aiguille ou canule de transfert intégrée.
K14 : Kit de collecte d'écouvillons multitest Aptima pour échantillons vaginaux et auto-prélèvement d'échantillons vaginaux, anaux et pharyngés.
Ne pas utiliser les KITS K1 (milieu NEST)

1mL Urines, Prélèvement vaginal, Auto-prélèvement vaginal, Endocol, Urètre, Anaux, rectaux
Gorge, pharynx, Sperme ° 15 jours à température ambiante ou réfrigérée

-  10 jours ° PCR
-  50.00 EUR non remboursable

-  K11 : Kit de collecte d'écouvillons unisexes Aptima pour écouvillons endocervicaux et écouvillons urétraux
K12 : Kit de collecte d'urine Aptima pour échantillons d'urines
En absence de milieu APTIMA K12 : Envoyer un pot à urine stérile sans additif.
PROSCRIRE les pots munis d'aiguille ou canule de transfert intégrée.
K14 : Kit de collecte d'écouvillons multitest Aptima pour échantillons vaginaux et auto-prélèvement d'échantillons vaginaux, anaux et pharyngés.
Proscrire les milieux NEST
Proscrire les pots munis d'aiguille ou de canules de transfert intégrées

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, crachats, biopsie (pulmonaire, vasculaire ou cardiaque), liquide péricardique, liquide articulaire, LCR (0.5 mL minimum) ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel (sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgG - sérum

MYCPN

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence

 B 50 - réf 1246 ; itératif B 90 - réf 3246

 Pour les enfants, l'analyse de sérologie de Mycoplasme pneumoniae IgM sera automatiquement réalisée.

Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgM - sérum

MYCOM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence

 B 50 - réf 1247 ; itératif B 90 - réf 3247

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Mycoplasmes urogénitaux - culture

MYCC *

Urines 1er jet, Prélèvement vaginal, Endocol, Urétral, Sperme, Liquide de coelioscopie, liquide articulaire, LCR, surnageant d'hémoculture.

Chez le nourrisson : gorge, sécrétions naso-pharyngées, brossage oculaire et liquide d'aspiration bronchique. ° Réfrigéré

 4 jours ° Culture

 B 40 - réf 5253 (+ 21.00 EUR si antibiogramme réalisé)

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie
Les prélèvements liquides sont transportés tels quels réfrigérés

Les prélèvements sur écouvillons sont préconisés sur un milieu de transport spécifique mycoplasme :

Ecouvillons E-swab en milieu Mycoplasme

Milieu UTM1MLR, UTM3MLR, UTM 1MLN (Copan),

Milieu REMEL M5 (Thermo Scientific)

Certains milieux sont acceptés mais non conseillés (risque de résultat

ininterprétable par contamination bactérienne par la flore commensale) :

Ecouvillons e-swab sur milieu AMIES

Milieux AMIES

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum

MYCGE

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Inhibition métabolique

 53.00 EUR non remboursable

 A distance (72h minimum) de tout traitement antibiotique

Myélogramme

MYELO

6 Lames de Moëlle osseuse non fixées, non colorées ° T° ambiante

 2 jours ° Cytologie

 B 100 - réf 1101

 Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre les résultats de la dernière NF/Plaquettes et les renseignements cliniques
En fonction des résultats sur la coloration standard, il peut être réalisé des colorations complémentaires : Perls et myéloperoxydase.

 S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Myélogramme - coloration de Perls

PERLS

2 Lames de Moëlle osseuse non fixées, non colorées ° T° ambiante

 4 jours °

 B 25 - réf 1102

 Joindre les résultats de l'hémogramme

 T25 : Porte-Lames pour frottis sanguin ou médullaire (fourni sur demande)

Myoglobine - sérum

MYOG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° ECLIA

 25.00 EUR non remboursable

Myoglobine - urines

MYOGU *

1tube(s) Urines échantillon de 24H ou miction ° Congelé < 4h

 4 jours ° Electrochimiluminescence

 25.00 EUR non remboursable

 Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Naphtols (alpha et béta) - urines

NAPHT *

15mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Fluorimétrie

 77.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Naropeine - sérum

NARO *

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

NASH-FibroTest - sérum

NASHT

3mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 5 jours ° Biochimie

 B 9 - réf 0522 + B 5 - réf 0519 + B 25 - réf 1805 + B 20 - réf 1813 + B 5 - réf 0552 + B 6 - réf 1601 + B 5 - réf 0580 + B 6 - réf 0590 + 71.00 EUR non remboursable dont 10.00 EUR pour l'Apolipoprotéine A

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Prélèvement à jeun

Neisseria gonorrhoeae - Détection par amplification moléculaire

NGOBM

Prélèvement en tube Aptima (Hologic)- Kit K11 : Ecouvillonnage cervical, urétral, vaginal, Ecouvillonnage conjonctival, Biopsie, Stérilet. Pour les liquides suivants 200 µL minimum : Sperme, Liquide de Douglas, Liquide de Bartolin, Liquide péritonéal
Kit K14 : Auto-Prélèvement vaginal, Prélèvements et auto-prélèvements pharyngés et anaux - Kit K12 : urines du 1er jet du matin ° T° ambiante

 3 jours ° Biologie moléculaire

 B 85 - réf 5301 (1 prélèvement) / B110 - réf 5302 (2 prélèvements) / B130 - Réf 5303 (3 prélèvements)

 K11 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour prélèvements endocervicaux et urétraux
K12 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour prélèvements urinaires :
En absence de milieu APTIMA K12 : Envoyer un pot à urine stérile sans additif.
PROSCRIRE les pots munis d'aiguille ou canule de transfert intégrée.
K14 : Kit Chlamydia trachomatis et/ou Neisseria gonorrhoeae APTIMA pour auto-prélèvement d'échantillons vaginaux, anaux et pharyngés.
Kit K11 : Seuls les écouvillons bleus doivent être déchargés dans le milieu APTIMA et leur tige cassée avant de refermer le tube. Kit K12 : Les urines doivent être transférées dans le milieu de transport APTIMA dans les 24 heures (2 mL). Les biopsies doivent être mises immédiatement dans le milieu M4RT ou APTIMA (Kit K11)
Ne pas utiliser les KITS K1 (milieu NEST)

Néoptérine - LCR

NEOPL *

1mL LCR ° Congelé

 3 semaines ° Radioimmunologie

 40.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Néoptérine - plasma

NEOP *

1mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 1 mois ° Radioimmunologie

 40.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Néoptérine - urines

NEOPU *

20mL Urines du matin - miction ° Congelé

 60 jours ° Radioimmunologie

 40.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Nesdonal - Sérum

NESDO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 47.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Névirapine - plasma

NEVI *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T4h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Niaprazine - sérum

NIAPR *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
- la fiche de suivi médical

Nickel - liquide biologique

NID *

2mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 semaines ° Absorption atomique

 36.00 EUR non remboursable

Nickel - Sérum

NI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 20 jours ° ICP/MS

 48.00 EUR non remboursable

Nickel - urines

NIU *

10mL Urines de fin de poste ° Réfrigéré

 15 jours ° ICP/MS

 39.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail ou à la reprise

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Ninalia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNIc) - prénatal

DPNI

1 * 10mL Tube Streck sang total ° T° ambiante

 5 jours ouvrés (lundi-vendredi) à réception au laboratoire Eurofins Biomnis ° Séquençage nouvelle génération

 B 1344 - réf 4087 (Le contrôle effectué sur un 2ème prélèvement suite à un premier résultat ininterprétable est facturé B1344 - réf 4088.)

398 EUR non remboursable si le contexte n'est pas compatible avec les exigences réglementaires.

 L'échantillon doit parvenir au Laboratoire Eurofins Biomnis sous 5 jours maximum

Immédiatement après le prélèvement, mélanger le tube par plusieurs retournements doux (minimum 10 fois)

Utiliser le bon de demande spécifique B39 : DPNI

Conformément au décret n°2014-32 modifié ainsi que l'arrêté du 14 décembre 2018, joindre impérativement l'attestation d'information et de consentement dûment remplie et signée par le prescripteur et la patiente, la prescription médicale et la fiche de renseignements comprenant notamment le résultat de l'échographie de dépistage et en fonction des cas le résultat du calcul de risque du dépistage ou le résultat de l'examen cytogénétique en cas d'antécédent.

 K39 : Kit de prélèvement DPNI

Nitrazépam - Sérum

NITRA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

N -méthylacétamide - urines

NMAC *

10 Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur thermoionique

 66.00 EUR non remboursable

 Prélèvement en fin de poste de travail
 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

N- Méthylformamide - urines

NMF *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Détecteur thermoionique

 66.00 EUR non remboursable

 Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail
 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Nordazépam - Sérum

NORDA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles

NORBM

Selles ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR

 136.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

500mg Selles ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunochromatographie B 70 - réf 4221 Délai de 5 jours maximum entre date de prélèvement et arrivée en technique
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

NSE - Neuron Specific Enolase - liquide biologique

NSED

1mL Liquide biologique ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence 37.00 EUR non remboursable Proscrire les prélèvements hémolysés
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

NSE - Neuron Specific Enolase - sérum

NSE

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 79 - réf 0814 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Centrifuger et décanter dans l'heure suivant le prélèvement
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement
Les tubes avec séparateur de phase doivent être centrifugés et décantés avant congélation.

NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum

PRBNP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence B 60 - réf 1821 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines**NTX**

2tube(s) Urines de 1ère ou 2ème miction du matin ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie B 69 - réf 7310 (+ B 6 - réf 0627) Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul du résultat, est réalisé systématiquement
Prélèvement à jeun
La créatininurie sera effectuée systématiquement sur le même échantillon (recommandations SFBC). Le mode de prélèvement choisi doit être conservé dans les prescriptions renouvelées T28 : tube urines (4mL)

Nutritol - Panel IgG alimentaires - 100 aliments - sérum**PA100**

3mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° ELISA 239.00 EUR non remboursable

Nutritol - Panel IgG alimentaires - 25 aliments - sérum**PAG25**

3mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° ELISA 99.00 EUR non remboursable

Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments - sérum**PAG50**

3mL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° ELISA 149.00 EUR non remboursable

Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments VEGAN - sérum**PA50V**

3mL Sérum ° Réfrigéré

 21 jours ° ELISA 169.00 EUR non remboursable

O-Crésol - urines

CRESO *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  77.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement sur flacon en plastique
Prélèvement en fin de poste de travail
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Ofloxacin - Sérum

OFLO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° HPLC
-  47.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Préciser la posologie , l'heure de prélèvement et l'heure d'administration : taux "pic"(à la fin de la perfusion ou 2h après la prise per os)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Olanzapine

OLAN

2mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Risperidone.

Oligosaccharides - recherche - urines

OLIGU *

Urines ° Congelé

-  3 semaines °
-  B 120 - réf 4002

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
Congeler l'échantillon dans l'heure
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Opiacés confirmation - dosage sanguin

OPIS

1mL Plasma fluoré en première intention. Plasma sur héparinate de lithium accepté. Proscrire les tubes avec gel séparateur. ° Réfrigéré

-  10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 95 - réf 1659

-  Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi. Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Opiacés - confirmation - urines

OPIC *

1tube(s) Urines d'une miction ° Réfrigéré

-  2 semaines ° LCMS
-  100.00 EUR non remboursable

-  Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Opiacés - dépistage - urines

OPI

1tube(s) Urines (miction) ° Réfrigéré

-  2 jours ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)
-  B 90 - réf 0659

-  Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Opiacés - liquide biologique

OPID *

2mL Liquide biologique ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  121.00 EUR non remboursable

-  Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

Oreillons - diagnostic direct - PCR

OREBM

Rhinopharynx, salive, 0.5 mL LCR (minimum) : Réfrigéré ° Réfrigéré

 3 jours ° RT - PCR en temps réel

 136.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum

ORE

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 110 - réf 1757

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Oreillons - sérologie IgG - sérum

OREG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 70 - réf 1758

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Orosomucoïde - sérum

ORO

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 30 - réf 1808

 Préciser l'âge et le sexe du patient

Osmolarité - sérum

OSM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Cryoscopie

 B 15 - réf 1607

Osmolarité - urines

OSMU

1tube(s) Urines des 24H ou miction non acidifiées et sans conservateur ° Réfrigéré

-  2 jours ° Cryoscopie
-  18.00 EUR non remboursable

 T28 : tube urines (4mL)

Ostéocalcine - sérum

OSTEO

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

-  1 jour ° Electrochimiluminescence
-  B 85 - réf 1138

 Les tubes gel doivent être décantés avant envoi pour éviter toute hémolyse à la décongélation.
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Oxacilline - Sérum

OXAC *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Méthode microbiologique
-  B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Oxazépam - Sérum

OXAZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° LCMS
-  B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Oxyde de carbone - sang total

OX

1mL Sang total Héparinate de lithium ° Réfrigéré

-  1 jour ° Biochimie
-  B 35 - réf 1680

P1NP - Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total - sérum**P1NP**

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence B 69 - réf 7310 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

PAI1 - Inhibiteur de type 1 de l'activateur du plasminogène - plasma**PAI1**

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Enzymoimmunologie 32.00 EUR non remboursable 1 aliquote spécifique pour cette analyse. Prélever de préférence sur un tube contenant des agents stabilisants des plaquettes sanguines (CTAD). Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Paludisme - sérologie - sérum**PALU**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 14 jours ° ELISA B 40 - réf 4354

Panel Cytokine - IL1 bêta, IL2, IL4 et IL6 - sérum**CYTPA**

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chemiluminescence 110.00 EUR non remboursable

Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum**PA287**

200µL Sérum ° Réfrigéré

 3 semaines ° EIA 384.00 EUR non remboursable

Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR

COVGR

Ecouvillonnage nasopharyngé ° Réfrigéré

 24h ° RT - PCR

 B 76 - réf 5271 + B 60 - réf 5272 / 40.00 EUR non remboursable si exigences particulières (Grippe)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R71 : Panel infectieux Covid / Grippe PCR)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Utiliser un triple emballage.

 KCOVID19: Kit pour COVID-19

Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR

PEV

Sang ou dérivés sanguins, Ecouvillon cutanéomuqueux ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4506 + B 100 - réf 4507

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture (sachet VIOLET S14 fourni)

Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles

GIP

Selles ° Réfrigéré

 2 jours ° PCR temps réel

 187.00 EUR non remboursable

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR

PIR

Ecouvillon nasopharyngé ° Réfrigéré

 2 jours ° PCR temps réel

 187.00 EUR non remboursable + B76 - Réf 5271 + B60 - Réf 5272 (si prélèvement naso-pharyngé)

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles

ISTBM

Prélèvement endocervical, vaginal, urétral, urines (1er jet), sperme, liquide péritonéal. ° Réfrigéré

 1 semaine ° Amplification et hybridation moléculaire

 B 85 - réf 5301 + 121.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR

MENVI

LCR ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 150 - réf 4504 + B 100 - réf 4506 + B 100 - réf 4507 + B 150 - réf 4505 + 165.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR

PUG

Écouvillon cutanéomuqueux ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4506 + 165.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Panel LAM (Leucémie Aiguë Myéloblastique)

MYSLA

2 mL Moelle sur tube EDTA ou 2x5 mL Sang total EDTA (si infiltration blastique en périphérie) ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

 10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes

 Nous consulter

 Prélever du Lundi au Jeudi
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat du myélogramme
- le résultat de l'immunophénotypage

 S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF

COLO1

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

 10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes

 850.00 EUR non remboursable .
RIHN/LC : N523 + N501

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique

 S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, SMAD4, STK11, TP53

COLO2

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  1200.00 EUR non remboursable .
RIHN : N452

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF

GIST

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  850.00 EUR non remboursable .
LC : N501 + N508

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS - LMMC (Leucémie MyéloMonocytaire Chronique)

MYSMO

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  Nous consulter

-  Prélever du Lundi au Jeudi
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
 - les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
 - le résultat du myélogramme
 - le résultat de l'immunophénotypage(si réalisé dans le cadre d'une suspicion de LMMC - panel d'Ac dédié pour la LMMC)
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT

MELA

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  850.00 EUR non remboursable .
RIHN/ LC : N408 + N525

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS "NMP - DP(Diagnostic/Pronostic)"**MYSDP**

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  Nous consulter

-  Prélever du Lundi au Jeudi
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
 - les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
 - le résultat du myélogramme
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Panel NGS - NMP (Néoplasie MyéloProliférative) Diagnostic 2 : JAK2/CALR/MPL/CSF3R/SETBP1/SRSF2**MYSD2**

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

- 
- 

-  Cette analyse est remplacée par l'analyse MYSDG.
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Panel NGS - NMP (Néoplasie MyéloProliférative) Diagnostic-(DG) JAK2/CALR/MPL/CSF3R/SETBP1/SRSF2/SF3B1**MYSDG**

5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

-  10 jours ° Recherche de mutations sur un panel de gènes ciblés par technique de séquençage haut-débit: Préparation de la
-  Nous consulter

-  Prélever du Lundi au Jeudi
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
 - les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
 - le résultat du myélogramme
-  S9L : Enveloppes pour caryotypes LYON jaunes

Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NOTCH1, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, SMAD4, STK11, TP53**PAN**

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  1300.00 EUR non remboursable .
RIHN : N452

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS

POUM1

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  850.00 EUR non remboursable .
RIHN / LC : N408+N501+N524

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, STK11, TP53

POUM2

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames(6 lames 5µm)ou ADN extrait. ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  1200.00 EUR non remboursable .
RIHN : N452

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS - RNASeq - Tumeurs solides

RNATS *

Bloc tumoral en paraffine ° T° ambiante

-  3 semaines °
-  1788.00 EUR non remboursable

-  Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25
Joindre le compte rendu anatomopathologique
-  S25 : Enveloppe Génétique et Oncologie moléculaire

Panel NGS-SMD (Syndrome Myélodysplasique)

MYSM

2mL 5 mL Sang total EDTA ou 2 mL de Moelle sur EDTA ou ADN extrait : (200ng d'ADN au minimum) ° T° ambiante

-  10 jours (1 semaine supplémentaire si vérification nécessaire par Sanger) ° Recherche de mutations sur un panel de gènes
-  Nous consulter

-  Prélever du Lundi au Jeudi
Réfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
 - les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
 - le résultat du myélogramme

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrites lors d'une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2, EPAS1, FH, GOT2, LZTR1, MAX, MDH2, MEN1, MERTK, MET, NF1, NF2, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SLC25A11, SMARCB1, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrites lors d'une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, CHEK2, EGFR, ERBB2, MET, NBN, PRKN, RTEL1, STN1, TP53, VHL

EOPOU

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B, MET, MITF, PBRM1, PTEN, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETD2, TMEM127, TSC1, TSC2, VHL, WT1

EOREI

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1

CUR10 *

2 tubes de 7 mL de sang total EDTA ou 1 tube de 10 mL de sang total sur ACD ou ADN(préciser le tissu d'origine et concentration) ° T° ambiante

-  3 mois °
-  Nous consulter

-  Cette analyse ne concerne que les prescriptions réalisées par un oncogénéticien. Les prescriptions d'autres praticiens ne peuvent être acceptées.
Cas particulier : lorsqu'une mutation précise est déjà connue dans la famille du patient, elle peut être recherchée de façon ciblée, et la prescription peut émaner de tout médecin. Dans ce cas le prélèvement du patient doit être impérativement envoyé dans le laboratoire qui a identifié la mutation familiale.
Utiliser le bon de demande B67

Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN , RAD51C, RAD51D, TP53

EOSOP

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

 K34 : Kit Exome

Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11

EODIG

1 * 5mL Sang total EDTA (tube complètement rempli) ou 1 tube ADN extrait (volume minimum 50µL avec une quantité minimale de 1µg) °

-  4 semaines pour le panel interprété - hors analyse de confirmation ° Lib Twist, Seq Illumina 2x150 Novaseq 6000.
-  Nous consulter

-  Ces analyses doivent être prescrite lors d' une consultation dédiée réalisée par un oncogénéticien, un conseiller en génétique en lien avec une équipe d'oncogénétique ou un médecin spécialisé avec les compétences en oncogénétique.
Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
En cas de transport à température ambiante le prélèvement doit nous parvenir sous 4 jours, en cas de délai d'acheminement supérieur à 4 jours le prélèvement doit être envoyé réfrigéré.
En cas de prélèvement urgent, merci de nous prévenir lors de l'envoi.
Utiliser le bon de demande B67

Panel stéroïdes - Exploration de la fonction gonadique - sérum

STERS

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Radioimmunologie
-  B 68 - réf 1136 + B 79 - réf 1134 + B 70 - réf 1135 + B 80 - réf 7414 + B 90 - réf 7415

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R41-SB : Prescription d'un panel de stéroïdes)

Panel stéroïdes - Exploration d'un hirsutisme

HIRSU

5mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Radioimmunologie

 B 68 - réf 1136 + B 79 - réf 1134 + B 70 - réf 1135 + B 59 - réf 1802

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R41-SB : Prescription d'un panel de stéroïdes)

Panel stéroïdes - Recherche d'un syndrome des ovaires polykystiques

SOPK

5mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Radioimmunologie

 B 45 - réf 0472 + B 45 - réf 0473 + B 68 - réf 1136 + B 80 - réf 0701 + B 79 - réf 1134 + B 59 - réf 1802

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R41-SB : Prescription d'un panel de stéroïdes)

Panel stéroïdes - Recherche d'un trouble de la biosynthèse des stéroïdes - sérum

STERB

5mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Radioimmunologie

 B 79 - réf 1134 + B 70 - réf 1135 + 162.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R41-SB : Prescription d'un panel de stéroïdes)

- 1 mL sérum : réfrigéré
- 1 mL plasma EDTA + Aprotinine non hémolysé : congelé
- 5 mL salive prélevée dans "Salivette" : congelé
- 4 ml urines des 24H non acidifiées : réfrigéré °

 2 semaines ° Electrochimiluminescence et Radio-immunologie

 B 49 - réf 0462 + B 73 - réf 0476 + B 95 - réf 7420 + 47.00
EUR non remboursable

 Conditions de prélèvement et de transport :
Prélèvement sur tube EDTA : sur tube refroidi, centrifugation réfrigérée et congélation immédiates
OU prélèvement sur tube spécial (EDTA + Aprotinine), centrifugation (< 25°C) et congélation.
Effectuer le prélèvement du matin entre 7h et 10h ou selon l'indication du prescripteur
Proscrire les prélèvements hémolysés
Préciser la diurèse
Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible risque - PCR

HPVBM

Biopsie cutanée ou muqueuse, prélèvement laryngé, prélèvement oro-pharyngé, prélèvement génital (endocol, urètre) ou urines, sperme, anal ° Réfrigéré

 1 semaine ° Amplification et hybridation moléculaire

 121.00 EUR non remboursable

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Mettre les urines dans un flacon sec stérile
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Paragonimose - sérum

PARAG *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 mois ° Western-Blot

 165.00 EUR non remboursable

Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum

PINF

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 15 jours ° SERION ELISA classic

 28.00 EUR non remboursable

Paraquat - Sérum

PARAQ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 108.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Paraquat - urines

PARQU *

20mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 10 jours ° Colorimétrie

 108.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Parasitologie - microscopie - Selles

PARSP *

Selles ° Réfrigéré

 5 jours ° Examen microscopique

 B 95 - réf 0286

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Utiliser le bon de demande spécifique B18 : Bactériologie-Parasitologie-Mycologie

ATTENTION : la parasitologie des selles n'inclut pas la recherche d'anguillule, qui doit être effectuée par une méthode de concentration de Baermann.

Cette analyse est réalisé en collaboration avec le CHU de Clermont-Ferrand ; toutefois, elle peut être réalisée au sein de notre laboratoire.

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Parechovirus - diagnostic direct - PCR

PECBM

Selles, LCR, Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA, Prélèvement cutanéomuqueux, oculaire ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  136.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Paroxétine - sérum

PAROX

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Parvovirus B19 - charge virale

PARVQ

2mL Sang total EDTA ou dérivés sanguins (sérum/plasma) ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  134.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum

PARVG

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Chimiluminescence
-  B 70 - réf 1764

-  Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Sur demande précise

Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR

PARBM

Moëlle osseuse (EDTA), biopsie hépatique, liquide de ponction ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

PARLA

5mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 B 600 - réf 4070

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum

PARV

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 100 - réf 1763

PDF - Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine - plasma

PDF

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Dosage immunologique latex automatisé

 B 30 - réf 1021

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

PDGFR alpha - exons 12, 14, 18

PDGFR *

Bloc tumoral en paraffine ou lames en paraffine ° T° ambiante

 4 semaines ° PCR + séquençage

 275.00 EUR non remboursable

 Joindre le compte rendu anatomopathologique

Péfloxacin - Sérum

PEFLO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Méthode microbiologique

 B 70 - réf 5293 + 32.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)

Peptide C - sérum

CPEP

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 65 - réf 1137

 Prélèvement à jeun
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Peptide C - Urines

CPEPU

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 70 - réf 0756

 Préciser la diurèse
 T28 : tube urines (4mL)

Peptide libérant la pro-gastrine (ProGRP)

PRGRP

1mL Sérum sur tube avec séparateur de phase ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Electrochimiluminescence

 39.00 EUR non remboursable

 Centrifugation directement après le prélèvement. Domicile proscrit.
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Pérampanel - Sérum - PERAMPANEL

PERAM *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° HPLC

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum

PFAS *

4mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 14 jours ° LCMSMS

 360.00 EUR non remboursable

 Centrifuger dans les 4 heures
Transférer dans un tube secondaire avant envoi

Périciazine - Sérum

PERIZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Pesticides - recherche et/ou dosage

PESTS *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 40 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 156.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Pesticides - recherche et/ou dosage - liquide biologique

PESTD *

15mL Liquide biologique ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 156.00 EUR non remboursable

Pesticides - recherche et/ou dosage - urines

PESTU *

15mL Urines ° Congelé < 4h

 21 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 156.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Phencyclidine - recherche - urines

PHEN

1tube(s) Urines ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunochimie : interaction cinétique des microparticules en solution (KIMS)

 B 90 - réf 0659

 Nous vous rappelons que le laboratoire Eurofins Biomnis ne réalise pas d'analyses toxicologiques dans un cadre médico-légal : ne pas transmettre de demande sur réquisition judiciaire. Ce type d'analyses relève de laboratoires spécialisés dans le domaine de l'expertise judiciaire.

 T28 : tube urines (4mL)

Phencyclidine - Sérum

PHENS *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  156.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Phénobarbital - sérum

PHENO

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Enzymoimmunologie
-  B 55 - réf 0333

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Phénol - urines

PHENU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  52.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement en fin de poste de travail
-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Phénothiazines - liquide de ponction

PHIAD *

2mL Liquide de ponction ° Réfrigéré

-  10 jours ° HPLC
-  B 100 - réf 0662

-  Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
 - la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Phénothiazines - Sérum

PTHIA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  10 jours ° HPLC
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Phénotype érythrocytaire - antigène KEL2(k ou cellano) - sang total

K2

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 1 jour ° Gel-filtration ou Technique d'immuno-capture

 B 15 - réf 1146

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R3 : RAI)

Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total

FENO

5mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 jour ° Gel-filtration ou Technique d'immuno-capture

 B 15 - réf 1146 cotation limitée à 5 antigènes

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R3 : RAI)
Préciser l'état civil complet sur le bon de demande et le tube primaire : nom de naissance, nom marital ou nom d'usage s'il y a lieu, prénom (si prénom composé, en toutes lettres), sexe et date de naissance. Nous adresser le tube primaire
Préciser obligatoirement l'antigène érythrocytaire à identifier : Cellano (KEL2 ou k), Cw, Lewis...
Dans les systèmes bi-alléliques, les 2 antigènes seront déterminés.
En l'absence de précision, l'appellation « phénotype étendu » correspond en général à la détermination des antigènes érythrocytaires JK1, JK2, FY1, FY2, MNS3 et MNS4.

Phénotype RH-KEL1 - Sang total

RH

5mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 1 jour ° Gel-filtration ou Technique d'immuno-capture

 B 33 - réf 1145

 Préciser l'état civil complet sur le bon de demande et le tube primaire : nom de naissance, nom marital ou nom d'usage s'il y a lieu, prénom (si prénom composé, en toutes lettres), sexe et date de naissance. Nous adresser le tube primaire
Nous transmettre si possible la notion de transfusion récente (moins de 4 mois).
Nous préciser le type de difficulté technique rencontrée lors de la détermination de groupe RH-KEL1
Le groupage sanguin ABO-RH1(D)- sang total est réalisé systématiquement
Joindre la fiche de renseignement disponible sur www.biomnis.com

Phénylalanine

PHEAL

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 1 semaine ° HPLC

 53.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Phénylalanine - urine

PHEAU

2tube(s) Urines échantillon des premières urines du matin (à jeun) ° Congelé

 1 semaine ° HPLC

 53.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul
du résultat, est réalisé systématiquement
Prélèvement à jeun

 T28 : tube urines (4mL)

Phénytoïne - sérum

PHENY

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 55 - réf 0332

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle
prise

Phosphatases acides totales - sérum

PAT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 18.00 EUR non remboursable

Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum

IPAL

2mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrophorèse

 B 5 - réf 0514 + 42.00 EUR non remboursable

 Proscrire les prélèvements hémolysés

Phosphatases alcalines osseuses

PALO

1mL sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 90 - réf 7309

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Les tubes gel doivent être décantés avant envoi pour éviter
toute hémolyse à la décongélation.
Proscrire le plasma EDTA

Phosphatases alcalines - sérum

PAL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 5 - réf 0514

 Proscrire le plasma EDTA

Phospholipides - sérum

PLIP *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 10 semaines ° Biochimie

 18.00 EUR non remboursable

Phosphore - sérum

P

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0563

Phosphore - taux de réabsorption tubulaire

TRP

1 mL Sérum + 5 mL Urines de 2H acidifiées(pH <3) ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0563 + B 6 - réf 0592 + B 6 - réf 0627 + B 6 - réf 0629

 Le calcul du TRP nécessite les dosages de la créatinine et du phosphore sur le sérum et sur les urines.
Le sujet à jeun depuis la veille, vide sa vessie à 8h et absorbe 250 mL d'eau. Recueillir les urines émises de 8 à 10h

Phosphore - urines

PU24

1tube(s) urines des 24H acidifiées (pH < 3) ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 6 - réf 0629

 Urines acidifiées avec de l'HCL
Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

pH - selles

PHS

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 7 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 10 - réf 1419

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

Pimozide - Sérum

PIMO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 100 - réf 1662

 Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase 1 aliquote spécifique pour cette analyse. Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :

- la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
- la fiche de suivi médical

Pipampérone - Sérum

PIPAM *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments) 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Pipéracilline - Sérum

PIPE *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments) 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Pipothiazine - sérum

PIPO *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPERATIVEMENT :
 - la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Plasminogène - plasma

PLAS

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Technique chromogénique
-  62.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Platine - urines

PLATU *

5mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  3 semaines ° Spectrométrie de masse couplée à un plasma induit
-  72.00 EUR non remboursable

-  T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Plomb - sang total

PBST

5mL Sang total Héparinate de sodium, Héparinate de lithium, EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  4 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse
-  B 60 - réf 0565

-  Acheminement rapide après prélèvement étant donné la stabilité du prélèvement de 14 jours
L'usage de tube sous vide est recommandé.
Saturnisme infantile : attention toute demande de plombémie infantile doit être accompagnée de la fiche "Saturnisme chez l'enfant mineur" téléchargeable sur le site https://www.formulaires.service-public.fr/gf/cerfa_12378.do
Afin d'éviter les risques de pollution externe:
Ne pas effectuer le prélèvement sur le lieu contaminé.
La peau doit être savonnée avant la désinfection.

-  T4 : Tube héparine de sodium

Plomb - urines

PBU

1tube(s) Urines de fin de poste de travail - miction ou échantillon des urines de 24H ° Réfrigéré

 5 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 B 60 - réf 0566 (+ B 6 - réf 0627)

 T28 : tube urines (4mL)

Pneumocystose - Pneumocystis jirovecii - PCR quantitative / Charge fongique

PJICF

LBA, Prélèvements respiratoires (hors biospsie) ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 130 - réf 4363

 Les écouvillons nasopharyngés sont à proscrire. Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Poliovirus - sérologie - sérum

POLIO

2mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Test de neutralisation

 66.00 EUR non remboursable

Polyomavirus BK - charge virale

POPCR

5 mL Urines (sans conservateur, 2 mL Sang total EDTA (minimum), 2 mL sérum ou plasma (EDTA ou ACD): Réfrigéré ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 124 euros pour toute nature de prélèvement, à l'exception de LCR et biopsie : 98 EUROS

 Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR

JCPL

1 mL sang total EDTA, 5 mL urines (sans conservateur), 0.5 mL LCR (minimum) : Réfrigéré; biopsie cérébrale ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 132.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Polypeptide pancréatique - Sérum

PPA

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 119.00 EUR non remboursable

 Centrifuger rapidement à température réfrigérée et congélation immédiate du sérum

Ponatinib - Plasma

PONAT *

1mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 semaines ° Chromatographie liquide Haute Performance / Spectrométrie de masse à haute résolution

 B 140 - réf 1657

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R7 : Glivec)

Porphobilinogène - urines

PORFU *

70mL Urines du matin - miction (à l'abri de la lumière) ° Réfrigéré

 10 jours ° Chromatographie échangeuse d'ions - Colorimétrie

 B 120 - réf 4002 x 2 +/- B70 (0638)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Porphyries érythrocytaires

POE *

10mL Sang total EDTA (à l'abri de la lumière) ° Réfrigéré

 10 jours ° Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R43 : Porphyries)
L'échantillon doit nous parvenir dans les 48H suivant le prélèvement
Prélever du Lundi au Mercredi

Porphyries - selles

POS *

Selles échantillon (à l'abri de la lumière) ° Réfrigéré

 15 jours ° Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R43 : Porphyries)
Recommander au patient de conserver les selles au réfrigérateur avant envoi au laboratoire
REGIME ALIMENTAIRE : éviter dans les 72 heures précédant le dosage, la consommation de viande rouge saignante

Porphyrines - Urines

POU

2tube(s) Urines du matin - miction (à l'abri de la lumière) ° Congelé < 4h

 14 jours ° HPLC

 B 70 - réf 0638 (+ B 6 - réf 0627)

 Le dosage de la créatinine urinaire, indispensable au calcul du résultat, est réalisé systématiquement
2 aliquotes spécifiques pour cette analyse

 T28 : tube urines (4mL)

Posaconazole - Sérum

POSA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° LCMS

 47.00 EUR non remboursable (47.00 EUR non remboursable x2 si 2 dosages réalisés)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)
Joindre la fiche de renseignement disponible sur www.biomnis.com

Pouvoir anti-élastasique - sérum

PELAS *

1mL Sérum ° T° ambiante

 2 semaines ° Cinétique enzymatique

 39.00 EUR non remboursable

Pouvoir antioxydant - plasma

PAOXS *

1mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 20 jours ° Colorimétrie

 55.00 EUR non remboursable

 Centrifugation réfrigérée (10 minutes/2860g)
Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé

Prazépam - Sérum

PRAZE *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Préalbumine - sérum

PREAL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 19 - réf 1817

 Préciser l'âge et le sexe du patient

Prééclampsie - Estimation du risque - sérum

PECLA

3mL Sérum (1 tube spécifique pour le dépistage de prééclampsie) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Fluoroimmunologie temps résolu

 54.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R4 : Pre-éclampsie)
Prélèvement non lipémique, non ictérique et non hémolysé.
Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures.
Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Garder une sérothèque jusqu'à réception du résultat.
Calcul de risque possible uniquement pour une grossesse monofoetale.
Le prélèvement doit être effectué entre 11,0 et 13,6 semaines d'aménorrhée
La pression artérielle se prend idéalement aux deux bras simultanément, sinon à un seul bras.
Un délai maximal de 10 jours entre l'échographie, la prise de tension et le prélèvement sanguin doit être respecté.

 S20 : Enveloppe Pré-éclampsie

Pré-éclampsie - sFlt-1 et PIGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PIGF - sérum

TPREE

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 110.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures.
Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Prélèvement à partir de 20 semaines d'aménorrhée
Nous communiquer la date de prélèvement et la datation de la grossesse (date échographie 1er trimestre et longueur crânio-caudale (LCC) ou date de grossesse)

 S20 : Enveloppe Pré-éclampsie

Prégabaline

PREGA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines °

 B 120 - réf 1671

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Prégnérolone - sérum

PREG

3mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Chromatographie - Extraction - Radioimmunologie
-  42.00 EUR non remboursable

Prékallitréine - activité - plasma

PREK

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  1 mois ° Technique chronométrique
-  43.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Primidone - sérum

PRIPH *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° LCMSMS
-  B 140 - réf 1670

-  Associé au dosage du phénobarbital.
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Avant une nouvelle prise, toujours à la même heure

Procalcitonine

PCT

1mL sérum ° Congelé < 4h

-  1 jour ° Dosage immunologique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA)
-  B 70 - réf 7307

-  Eviter plus de 3 cycles de congélation/décongélation
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Procollagène type III - sérum

P3P

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Radioimmunologie
-  48.00 EUR non remboursable

-  Centrifuger, décanter, congeler rapidement

plasma. ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie B 150 - réf 4103

-  Joindre impérativement le protocole spécifique (K4P : Quantiferon) en renseignant l'indication. Prélèvement à réaliser avec le kit Quantiferon à commander 3 jours avant le prélèvement. Le respect scrupuleux de la phase pré-analytique conditionne la qualité des résultats, en particulier :
- agiter consciencieusement les tubes avant de les incuber 16 à 24h à 36-38°C, le délai et la température d'incubation doivent être rigoureusement respectés.
 - centrifuger avant de les adresser, à + 4°C, s'assurer que le gel s'est positionné entre le culot et le plasma.

 K4 : Kit de prélèvement - Quantiferon**Profil protéique d'orientation sans électrophorèse - sérum**

PPO

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 56 - réf 1385

-  Cette analyse comprend : albumine, transferrine, haptoglobine, orosomucoïde, C3, IgG, IgA, IgM
Préciser l'âge et le sexe du patient

Profil protéique hémolytique - sérum

PPHEM

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 30 - réf 1808 + B 20 - réf 1813

-  Cette analyse comprend : orosomucoïde et haptoglobine

Profil protéique immunitaire sans électrophorèse - sérum

PPIMM

2mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 56 - réf 1385

-  Cette analyse comprend : IgA, IgG, IgM
Préciser l'âge et le sexe du patient

Profil protéique inflammatoire - sérum

PPINF

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie B 8 - réf 1804 + B 30 - réf 1808 + B 20 - réf 1813

-  Cette analyse comprend : orosomucoïde, haptoglobine, CRP
Préciser l'âge et le sexe du patient

Profil protéique nutritionnel - sérum

PPN

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 30 - réf 1808 + B 19 - réf 1817

 Cette analyse comprend : préalbumine, albumine, orosomucoïde
Préciser l'âge et le sexe du patient

Progestérone - salive

PGSA

0.5mL Salive ° Congelé < 4h

 1 mois ° ELISA

 54.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Progestérone - sérum

PG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 45 - réf 0334

 Les tubes avec séparateur de phase doivent être centrifugés et décantés.
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Proinsuline - sérum

PRINS

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 7 jours ° Chimiluminescence

 48.00 EUR non remboursable

Prolactine - formes moléculaires - sérum

PRLCH *

5mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 mois ° ECLIA, Radiommuanalyse et Radiommuanalyse après précipitation au PEG (+ chromatographie)

 B 45 - réf 0343 x 3 + B 200 - réf 0884 si la chromatographie est réalisée

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R20 : Prolactine Formes moléculaires)

Prolactine - sérum

PROL

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 45 - réf 0343

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Prométhazine - sérum

PROME *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 jours °

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Propafénone - Sérum

PROPF *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 120 - réf 1678

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Properdine - fraction du complément

PPER *

5 mL Sang total Citraté + 3 mL Sérum ° Réfrigéré

 2 mois °

 26.00 EUR non remboursable

 Envoi rapide après prélèvement(sous 48h impérativement)

Propranolol - Sérum

AVLO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 1678

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Protéine 14.3.3 - LCR

WBP14 *

1mL LCR ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Western-Blot
-  138.00 EUR non remboursable

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R33 Protein-14.3.3)
Centrifuger et décanter immédiatement le prélèvement en double emballage étanche
-  TAU-20 : Kit protéine TAU -20°C (Alzheimer/Creutzfeldt-Jacob) ponction lombaire

Protéine C - activité

PC

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  1 jour ° Technique chromogénique
-  B 50 - réf 0191 (+PCAG (B50 - réf.1027) en cas de diminution de la PC)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
La PC et la PS sont vitamine K dépendants et doivent être dosées à distance de tout traitement AVK (1 mois)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire...)
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Protéine C - antigène - plasma

PCAG

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

-  5 jours ° Enzymoimmunologie
-  B 50 - réf 1027 (remboursée uniquement si PC diminuée)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Préciser le traitement anticoagulant en cours
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Protéine chimio attractive des monocytes (MCP-1) - sérum

MCP1

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chimiluminescence
-  55.00 EUR non remboursable

Protéine S100 - LCR

100PL

1mL LCR non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Electrochimiluminescence

 100.00 EUR non remboursable

Protéine S100 - sérum

PS100

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Electrochimiluminescence

 100.00 EUR non remboursable

 Laisser coaguler 20 à 30 minutes à température ambiante
Centrifuger, décanter, congeler rapidement

Protéine S - activité

PS

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 50 - réf 0190 (+PSLI(B50-réf.1025) en cas de diminution de la PS)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
La PC et la PS sont vitamine K dépendants et doivent être dosées à distance de tout traitement AVK (1 mois)
Ne pas doser l'activité de la Protéine S si traitement en cours par anticoagulant direct actif par voie orale (XARELTO, ELIQUIS, PRADAXA).
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire...)
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.
Si activité basse, nous réalisons PSLI/Protéine S libre - antigène
Le dosage doit être réalisé après un arrêt de 5 jours du traitement par les AOD

Protéines - dosage - sérum

PROT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Colorimétrie

 B 6 - réf 2258

 ATTENTION : Si une électrophorèse des protéines est associée, uniquement du sérum.

1tube(s) Urines des 24H ° Réfrigéré

 1 jour ° Turbidimétrie

 B 6 - réf 2004

 Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

Protéine S libre - antigène - plasma

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 50 - réf 1025 (remboursée uniquement si PS diminuée)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif ; traitement anticoagulant éventuel.

La PS libre antigène est enclenchée si l'activité est abaissée (conformément à la NABM) en dehors d'un traitement par AVK.

Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Protéines - liquide biologique

2mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimie - Spectrophotométrie

 B 9 - réf 0691

Protéines TAU - Amyloïde - LCR

3mL LCR ° Congelé < 4h

 2 mois ° Enzymoimmunologie

 203.00 EUR non remboursable si dosage de 03 marqueurs,
264 EUR non remboursable si dosage de 04 marqueurs.

 Kit de prélèvement disponible sur demande
Se référer à la fiche d'envoi pour toutes informations pratiques

 TAU-20 : Kit protéine TAU -20°C (Alzheimer/Creutzfeldt-Jacob) ponction lombaire

Protéine S totale - antigène - plasma

PSAG

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 1026 (remboursée uniquement si PS diminuée)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R5 : Hémostase)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

PSA - Antigène spécifique prostatique libre - sérum

PSALI

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 54 - réf 7320

 Centrifuger et congeler immédiatement
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

PSA - Antigène spécifique prostatique total - liquide de ponction

PSAD

1mL Liquide de ponction ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 25.00 EUR non remboursable

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum

PSA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 35 - réf 7318

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction

PTHD

1mL Liquide de ponction ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 30.00 EUR non remboursable

 Congeler le plus rapidement possible. Une seule congélation possible

PTH - Parathormone intacte - sérum

PTH

1mL Sérum non hémolysé ° Congelé < 4h

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 58 - réf 0983

-  En raison de la courte demi-vie de la PTH, il est recommandé de centrifuger le sang dans les plus brefs délais pour l'obtention du sérum avant congélation
Les tubes gel doivent être décantés avant envoi pour éviter toute hémolyse à la décongélation. Une seule congélation possible.
Proscrire le plasma hépariné
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

PTH-RP - Parathormone related protein - plasma

PTHRP

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 B 70 - réf 0785

-  Centrifuger rapidement à température réfrigérée et congélation immédiate du plasma
Prélever sur tube spécial (EDTA + Aprotinine)
-  T2 : Tube EDTA + aprotinine

Pyrazinamide - Sérum

PYRA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

-  Congeler IMPERATIVEMENT dans les 4 heures
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Pyruvate kinase érythrocytaire - sang total

PKE *

5mL Sang total sur ACD ° Réfrigéré

 2 semaines ° Spectrophotométrie

 B 40 - réf 1527

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Ne pas prélever avant l'âge de 1 an
-  T16 : Tube ACD (fourni sur demande)

Quétiapine

QUETA

3mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

- 15 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie
- B 100 - réf 1662

- Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement en taux résiduel
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Rispéridone.

Quinidine - Sérum

QUIN *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
- B 70 - réf 1677

- Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Quinine - Sérum

QUINI *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
- 47.00 EUR non remboursable

- Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Rage - sérologie - sérum

RAGE

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

- 2 semaines ° Enzymoimmunologie
- B 70 - réf 1767

- Cet examen est réservé au contrôle après vaccination
Proscrire tube de 10 ml avec ou sans gel

Raltégravir - Sérum

RALTE *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

- 3 semaines ° LCMSMS
- B 120 - réf 4117

- Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Bloc tumoral inclus en paraffine ou lames blanches (3 minimum) ° T° ambiante

 10 jours ° Cytogénétique moléculaire ou FISH

 B 500 - réf 0905

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Joindre le compte rendu anatomopathologique
Utiliser IMPERATIVEMENT l'enveloppe de transport S25 ou S9L

 #VAEURMULTI

Récepteur soluble de la Transferrine - sérum

RSTR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 60 - réf 1822

Recherche de la mutation T790M du gène EGFR - Sang périphérique prélevé sur tube Cell Free DNA : Ambient ou Aliquots de plasma : Congelé

EGFRS *

4 * 1tube(s) Sang périphérique prélevé sur tube Cell Free DNA : Ambient ou Aliquots de plasma : Congelé °

 3 semaines °

 660.00 EUR non remboursable

 Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides
Joindre le compte rendu anatomopathologique

Recherche par QF-PCR des Aneuploïdies des chromosomes 13, 18, 21, X et Y - prénatal

NCDR

2mL Liquide amniotique frais (non hémorragique), villosités chorales ° T° ambiante

 2 jours ° QF-PCR

 B 700 - réf 4083

 Afin d'assurer la traçabilité des prélèvements, nous vous invitons à prendre contact avec notre secrétariat avant toute transmission d'échantillon
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

réinterprétation d'exome

REINT

Pas de prélèvement nécessaire. L'analyse exome ou panel doit avoir été réalisé chez Eurofins-Biomnis initialement. °



 644.00 EUR non remboursable

 L'exome initial doit avoir été réalisé au laboratoire Biomnis

Rénine active

REN

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 2 jours ° Radioimmunologie

 B 78 - réf 0776

 Préciser debout ou couché, merci de préciser les codes analyses spécifiques:
Prélèvement debout après 1H de déambulation : REND
Prélèvement couché après 1H de décubitus : RENC
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Rénine active - couché

RENC

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 2 jours ° Radioimmunologie

 B 78 - réf 0776

 Préciser debout ou couché (prélèvement debout après 1H de déambulation ; prélèvement couché après 1H de décubitus)
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Rénine active - debout

REND

1mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 2 jours ° Radioimmunologie

 B 78 - réf 0776

 Préciser debout ou couché (prélèvement debout après 1H de déambulation ; prélèvement couché après 1H de décubitus)
REGIME ALIMENTAIRE : Nos valeurs de référence ne sont valables qu'en régime normosodé (80-250mEq/24h de natriurèse)

Résistance à la protéine C activée

RPC

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 35.00 EUR non remboursable

 Il est préférable de ne pas prélever un patient sous traitement par anticoagulant direct actif par voie orale (XARELTO, ELIQUIS, PRADAXA): interférence sur les temps de coagulation et risque de mauvaise interprétation du test. A réaliser après la fin du traitement ou pratiquer directement la recherche de la mutation du Facteur V Leiden par biologie moléculaire.
Merci de préciser si nous devons réaliser le facteur V Leiden lorsque le test de résistance à la protéine C activée est positif (nous joindre IMPERATIVEMENT une attestation de consultation et un consentement éclairé du patient conformément aux conditions réglementaires et 5mL de sang total EDTA).
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

1mL sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Néphélométrie

 B 35 - réf 1818

RH3(E) foetal - génotypage

GRHE *

3 * 5mL Sang total EDTA maternel ° T° ambiante

 15 jours ° PCR temps réel

 113.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R22 : Typage Groupe Foetal)
Prélever du Lundi au Jeudi
L'échantillon doit nous parvenir dans les 48H suivant le prélèvement
Prélèvement à partir de 13 semaines d'aménorrhée Nous transmettre la date de grossesse et le phénotype RH3/RH5 du conjoint.
Conformément à l'article du 14 janvier 2014, joindre la prescription médicale, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente

RHc foetal - génotypage

GRHC *

3 * 5mL Sang total EDTA maternel ° T° ambiante

 15 jours ° PCR temps réel

 113.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R22 : Typage Groupe Foetal)
Prélever du Lundi au Jeudi
L'échantillon doit nous parvenir dans les 48H suivant le prélèvement
Prélèvement à partir de 13 semaines d'aménorrhée
Nous transmettre la date de grossesse et le phénotype RH2/RH4 du conjoint
Conformément à l'article du 14 janvier 2014, joindre la prescription médicale, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente

2 * 5mL Sang total EDTA maternel non centrifugé(proscrire les tubes avec séparateur) ° T° ambiante

 3 jours (si envoi au CNRHP : 14 jours) ° PCR en temps réel TaqMan

 B 260 - réf 4085 (Le contrôle effectué sur un 2ème prélèvement suite à un premier résultat négatif ou ininterprétable est facturé B260 - réf. 4086)

 Joindre le bon de demande (B37 : Génotypage Rhésus D foetal) ou assimilé, renseigné avec attestation ET consentement signés.
joindre le compte-rendu du premier résultat s'il y a lieu.
Date de grossesse renseignée.
Statut immunitaire de la patiente : RAI négative ou si RAI positive Allo Immunisation ou Injection de Rophylac ?
Joindre le compte-rendu de RAI autant que possible.
2 tubes de 5 ml pleins, spécifiques pour cette analyse.
Prélever du samedi au jeudi ; le jeudi avant le passage du coursier ; le samedi ne prélever que si il y a un passage de coursier
L'échantillon doit nous parvenir IMPERATIVEMENT dans les 72H suivant le prélèvement et le vendredi à 14h au plus tard.
Absence d'interférence du traitement par les immunoglobulines anti-D (Rhophylac)

 B37 : Bons de demande pour Génotypage rhésus (feuilles)

Rhésus Kell - génotype foetal - sang total - prénatal

3 * 5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 15 jours ° Biologie moléculaire

 113.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R22 : Typage Groupe Foetal)
Prélever du Lundi au Jeudi
L'échantillon doit nous parvenir dans les 48H suivant le prélèvement
Prélèvement à partir de 13 semaines d'amenorrhée.
Nous transmettre le phénotype KEL1/KEL2 du procréateur.
Conformément à l'article du 14 janvier 2014, joindre la prescription médicale, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente

Rhinovirus - diagnostic direct - PCR

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 136.00 EUR non remboursable

 Existe aussi en PCR multiplex (VIRBM) comprenant les détections des virus VRS, HMPV et Rhinovirus
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Ribavirine - plasma

RIBAV *

3mL Plasma Hépariné ° Congelé

 3 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Décanter
Congeler l'échantillon dans l'heure
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R25 : Ribavirine)

Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum

RICCT

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunofluorescence

 B 40 - réf 1317 ; si positif titrage B 60 - réf 1318

 Dépistage : Ig totales. Si positif, recherche des IgM

Rifabutine - Sérum

RIFAB *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable (47.00 EUR non remboursable x2 si 2 dosages réalisés)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)

Rifampicine - sérum

RIFA *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° HPLC

 58.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)
Prélèvement 3H après la prise

Rilpivirine - plasma

RILPI *

3mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise.
Joindre la fiche de renseignement clinique

Rispéridone

RISPE

2mL Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélever en résiduel (avant une nouvelle prise)
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Aripiprazole; Clozapine; Haloperidol; olanzapine; Quétiapine; Rispéridone.

Ritonavir - Sérum

RITO *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° LCMSMS
-  B 120 - réf 4117

-  Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

RITUX *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Enzymoimmunologie
-  142.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Rivaroxaban - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma

RIVA

1.5mL Plasma Citraté ° Congelé

-  1 jour ° Technique chromogénique
-  34.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Préciser IMPÉRATIVEMENT la posologie de Xarelto et les horaires de prise et de prélèvement
Les prélèvements sont à réaliser en résiduel(juste avant une prise)ou au pic d'activité , 2 heures après la prise.
L'état d'équilibre est obtenu à partir du 3ème jour de traitement.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Rotavirus - recherche rapide - Selles

ROTSE

Selles ° Réfrigéré

-  1 jour ° Enzymoimmunologie
-  B 70 - réf 4267

-  Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Rougeole - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum

ROUGG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 70 - réf 1770

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Sur demande précise

Rougeole - diagnostic direct - PCR

ROUBM

Salive, gorge, nez, naso-pharyngé, LBA, sécrétions bronchiques, 1 mL sang total EDTA, plasma EDTA, sérum, urines, 0.5 mL LCR (minimum) ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B 120 - réf 5270 / 136.00 EUR non remboursable hors recommandations ou renseignements cliniques non communiqués

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R53 : Rougeole par RT-PCR)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Rougeole IgG - Index de synthèse intrathécal - LCR + sérum

ROUPL *

1 mL LCR + 1 mL Sérum (IMPERATIF) ° Réfrigéré

 20 jours ° Enzymoimmunologie

 Examen réalisé à titre gracieux

 Joindre IMPERATIVEMENT la fiche de renseignements cliniques du CNR - Rougeole
Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Rougeole - sérologie IgG/IgM - sérum

ROUG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 120 - réf 1768

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum

RUBAV *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 semaines ° Traitement à l'urée

 81.00 EUR non remboursable

 Joindre OBLIGATOIREMENT la fiche de renseignements cliniques spécifique (R27 : Rubéole)
Sur demande précise

Rubéole - diagnostic direct - PCR

RUBM *

Aspiration Nasopharyngée recommandée, gorge, plasma EDTA, LCR, urines, humeur aqueuse, humeur vitrée ° Congelé

 Délai variable : tout résultat positif est immédiatement communiqué ° PCR

 156.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre les résultats sérologiques

Rubéole - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

RUBLA *

5mL Liquide amniotique ° Congelé < 4h

 3 semaines ° PCR

 B 450 - réf 4069

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Rubéole - sérologie IgG - sérum

RUBEO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° EIA

 B 35 - réf 1773 ; itératif B 57 - réf 3773

Rubéole - sérologie IgM - sérum

RUBEM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° EIA

 B 50 - réf 3783

 Joindre IMPERATIVEMENT les renseignements cliniques suivants : l'âge de la grossesse, les dates de contagion, d'éruption, de vaccination et les résultats des sérologies antérieures

Rufinamide - Sérum

RUFIN *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° HPLC

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Salmonellose - sérologie - sérum

SALMO

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Agglutination

 B 40 - réf 1319

Saquinavir - Sérum

SAQUI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R6 : Anti-rétroviraux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Screening toxicologique - Sérum

SCRIB *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance

 89.00 EUR non remboursable

Screening toxicologique - urines

SCRIU *

6mL Urines ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance

 89.00 EUR non remboursable

Sélénium

SE

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur F54) ° Réfrigéré

 1 semaine ° ICP/MS

 41.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Sélénium - urines

SEU *

20mL Urines d'une miction ° Réfrigéré

 3 semaines ° Absorption atomique

 47.00 EUR non remboursable

 Préciser le moment du prélèvement.

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Séquençage Ciblé - Postnatal

SEPOS

Sang total EDTA, tissu foetal, produit d'aspiration, placenta, cordon foetal, ADN extrait °

 6 semaines ° Séquençage par Sanger

 B 500 - réf 4082 et / ou N353

 5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test

Etude ciblée pour vérification, étude familiale ou DPN

Utiliser la fiche de renseignements cliniques R66.

Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement du patient conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

Séquençage Ciblé - Prénatal

SEPRE

Liquide amniotique frais ou cultivé, villosités chorales fraîches ou cultivées ; Sang foetal ; ADN extrait °

 4 semaines ° Séquençage de Sanger

 B 700 - réf 4083 et / ou N353

 5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce test

Etude ciblée pour vérification, étude familiale ou DPN

Utiliser le bon de demande spécifique B3:Diagnostic anténatal

Utiliser la fiche de renseignements cliniques R66.

Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement du patient conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

Sérodiagnostic du Poumon des champignonnistes (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum

POCH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4351 x 2

Sérodiagnostic du Poumon des fromagers (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum

POFR

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4351 x 2

Sérodiagnostic du Poumon domestique (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum

PODO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4351 x 2

Sérodiagnostic du Poumon du boulanger (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum

POBO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4351 x 2

Sérologie diagnostic Alvéolite Allergique Extrinsèque - dépistage - sérum

PDEP

1mL Sérum ° Réfrigéré

 4 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 40 - réf 4351 ; itératif B 60 - réf 6351 par antigène

 Préciser les allergènes

Sérotonine - sang total

SEROT

2 * 2mL Sang total Hépariné (pas de tube en verre)(proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

 4 jours ° UPLC

 B 120 - réf 0364

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
REGIME ALIMENTAIRE: éviter dans les 48h précédant le prélèvement les aliments ou boissons riches en tryptophane (acide aminé essentiel constituant de la sérotonine) : poisson gras, foies de volaille, riz complet, produits laitiers, banane, chocolat/cacao, fruits secs (noix, amande, noix de cajou, dattes), mangue, avocat, tomate, prune, kiwi, ananas, mollusques, fèves et légumineuses, graine de courge
A noter que la prise d'antidépresseurs de type IRRS (inhibiteurs de la recapture de la sérotonine) peut diminuer le taux basal de sérotonine.

Sertraline - sérum

SERT

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Sérum Amyloïde A Protéine - SAA - sérum

SAA

2mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Néphélométrie
-  29.00 EUR non remboursable

Sex Binding Globulin - SHBG - sérum

TEBG

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Electrochimiluminescence
-  B 68 - réf 0358

-  ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Silicium - Plasma

SILIC *

2mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse
-  118.00 EUR non remboursable

-  Prélèvement sur tube en plastique (polypropylène ou polystyrène) à bouchon plastique
-  T1 : Tubes secs 5 ml en polypropylène

Sirolimus

SIRO

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

-  3 jours ° LCMSMS
-  B 65 - réf 1377

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement en taux résiduel (juste avant la prise)

Somatostatine - plasma

SOMAT

1mL Plasma EDTA + Aprotinine ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Radioimmunologie

 58.00 EUR non remboursable

 Centrifuger rapidement à température réfrigérée et congélation immédiate du plasma
Prélever sur tube spécial (EDTA + Aprotinine)

 T2 : Tube EDTA + aprotinine

Sotalol - sérum

SOTAL *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 11 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 118.00 EUR non remboursable

 Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
Réalisé uniquement en cas d'INTOXICATION. Aucun dosage réalisé en suivi thérapeutique.

Préciser :

- les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité),
- l'heure du prélèvement
- la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie,
- les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration),
- l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible.

Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH - sérum

ALPHA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 semaine ° Radioimmunologie

 48.00 EUR non remboursable

Spermocytogramme

SPCG

3 Lames séchées rapidement non fixées ° T° ambiante

 2 jours ° Microscopie

 19.00 EUR non remboursable

 Préciser la concentration des spermatozoïdes.
Analyse non réalisée pour les concentrations de spermatozoïdes < 4 millions/ml.

Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total

EMA *

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 15 jours ° Cytométrie en flux

 22.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R39 : EMA)
La technique doit être réalisée dans les 72H qui suivent le prélèvement(96H max)

Statut mutationnel Ig-VH

IGVH *

5 mL sang total EDTA ou 5 mL Moëlle ° T° ambiante

 1 mois ° PCR / Analyse de fragments / Séquençage Sanger

 473.00 EUR non remboursable

-  Utiliser le bon de demande spécifique B8 : Biologie des Hémopathies
Joindre :
- les résultats de la dernière NFS/Plaquettes
- le résultat du myélogramme
- le résultat de l'immunophénotypage

Stavudine - plasma

STAVU *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrophotométrie

 B 120 - réf 4117

-  Prélèvement T0 (avant la prise), T1h et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Stéatorrhée - dosage des graisses - selles

STEAT

Totalité des selles de 24H ° Réfrigéré

 2 jours ° Technique physicochimique

 B 90 - réf 0666 + B 70 - réf 1622 (examen physique)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)
Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures.
Si recueil sur 2 ou 3 jours, transmettre le tout en un seul envoi.
Régime enrichi par 50g de beurre les 3 jours précédant le recueil et pendant le recueil.

 T10 : Pot à coprologie ou stéatorrhée 1L

Stiripentol - Sérum

STIRI *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° HPLC

 B 120 - réf 1671

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Streptococcus pneumoniae - polysaccharide capsulaire - sérologie - sérum

PNUAC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie

 35.00 EUR non remboursable

Strontium - sang total

STRO *

2mL Sang total Hépariné ° Réfrigéré

 1 semaine ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 90.00 EUR non remboursable

Strychnine - sang total

STRYC *

5mL Sang total Hépariné ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse - CLHP/UV-BD

 118.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Strychnine - urines

STRYU *

5mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse - CLHP/UV-BD

 94.00 EUR non remboursable

Styrène - sang total

STYRE *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 58.00 EUR non remboursable

 Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE

 T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Styrène - urines

STYRU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 58.00 EUR non remboursable

 Flacon en verre avec bouchon en PTFE

 T18 : Flacon verre, bouchon PTFE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Succinylacetone-Tyrosinémie de type I - papier buvard

TYRBU *

Papier buvard impératif ° T° ambiante

 3 semaines °



Succinylacetone-Tyrosinémie de type I - urines

SUCCI *

10mL Urines ° Congelé < 4h

 3 semaines ° GCMS

 B 120 - réf 4002

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Sucres - recherche - selles

SUCSP

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 4 jours ° Chromatographie - Colorimétrie

 24.00 EUR non remboursable

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R29 : Coprologie fonctionnelle)

Sulfamides hypoglycémiants - sérum

SULS *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 118.00 EUR non remboursable

 Préciser le contexte clinique
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Sulfamides hypoglycémiants - urines

SULU *

1tube(s) Urines ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 118.00 EUR non remboursable

 T28 : tube urines (4mL)

Sulfate de DHEA salivaire - salive

SDHSA

0.5mL Salive ° Congelé < 4h

-  1 mois ° ELISA
-  54.00 EUR non remboursable

-  Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Sulfate de prégnénolone - sérum

SPRE

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  10 jours ° Radioimmunologie
-  42.00 EUR non remboursable

-  RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

Sulfatides - urines

SULFA *

Miction complète non transvasée ° Congelé < 4h

-  6 semaines ° Spectrométrie de masse en tandem (MS/MS)
-  B 500 - réf 4001

-  Joindre les renseignements cliniques

Sulpiride - Sérum

SULPI *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Sultiame - Sérum

SULTI *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  15 jours ° HPLC
-  B 120 - réf 1671

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement en taux résiduel

Sultopride - Sérum

SULTO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Superoxyde dismutase - SOD

SOD *

300µL Culot globulaire sang total héparinate de lithium ° Congelé

-  3 semaines ° Spectrométrie
-  35.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Préparation du culot globulaire :
 - sang total recueilli sur héparinate de lithium
 - centrifugation réfrigérée à 2860g pendant 10 minutes
 - rejeter le plasma et la couche leucocytaire
 - congeler à -20 °C

Syndrome de Gilbert - recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347)

GILB

5mL Sang total Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° PCR temps réel
-  156.00 EUR non remboursable

-  Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicale
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle

Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum

WBSG

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  8 jours ° Immunoblot Mikrogen
-  B 180 - réf 1250 ou 66.00 EUR non remboursable (si ne répondant pas aux exigences réglementaires c'est-à-dire prise en charge limitée à la femme enceinte présentant un test tréponémique ET non tréponémique positif)

Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum

WBSM

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  8 jours ° Immunoblot Mikrogen
-  B 180 - réf 1251 ou 66.00 EUR non remboursable (si ne répondant pas aux exigences réglementaires c'est-à-dire prise en charge limitée à la recherche chez l'enfant d'une syphilis congénitale)

Syphilis - sérologie IgM - sérum

BWIGM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 8 jours ° Enzymoimmunologie

 B 30 - réf 1330 ou 33.00 EUR non remboursable (si ne répondant pas aux exigences réglementaires c'est-à-dire prise en charge limitée à la recherche chez l'enfant de moins de 1 an suspect d'une syphilis congénitale)

Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum

BW

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 B 20 - réf 1256

 en cas de dépistage positif, enclenchement d'un test non tréponémique.

Syphilis - titrage - LCR

BWQPL

1mL LCR ° Réfrigéré

 2 jours ° VDRL-TPHA

 B 20 - réf 1257

Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif

BWQ

1mL Sérum non lipémique ° Réfrigéré

 3 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 20 - réf 1257 En cas de séroconversion : B20 - réf 1258 /
En cas de suivi de traitement : B30 - réf 1259

T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum

FT3

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 B 27 - réf 1206 / B 54 - réf 1209, T3L+T4L / B 44 - réf 1210,
T3L+TSH / B 52 - réf 1212, les 3 paramètres

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

T3 totale - Triiodothyronine totale - sérum

T3TOT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 20.00 EUR non remboursable

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

T3 - Triiodothyronine reverse

T3RE

1mL sérum ° Congelé < 4h

 1 mois ° Radioimmunologie

 88.00 EUR non remboursable

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Joindre les renseignements cliniques
Joindre les résultats du bilan thyroïdien

T3 - Triiodothyronine - urines

T3U

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Radioimmunologie

 25.00 EUR non remboursable

 Préciser la diurèse

 T28 : tube urines (4mL)

T4 libre - Thyroxine libre - sérum

FT4

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 27 - réf 1207 / B 54 - réf. 1209, T3L+T4L / B 40 - réf. 1211, T4L+TSH / B 52 - réf. 1212, les 3 paramètres

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

T4 - Thyroxine - urines

T4U

1tube(s) Urines des 24H non acidifiées ° Réfrigéré

 2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) °
Radioimmunologie

 25.00 EUR non remboursable

 Préciser la diurèse
RYTHME CIRCADIEN : Il existe pour ce paramètre biologique un rythme circadien (concentration maximale le matin), d'une amplitude suffisamment importante pour avoir une influence significative sur l'interprétation clinique

 T28 : tube urines (4mL)

T4 totale - Thyroxine totale - sérum

T4TOT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Electrochimiluminescence

 20.00 EUR non remboursable

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Tacrolimus - FK506

FK506

1mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 3 jours ° LCMSMS

 B 65 - réf 1377

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement en taux résiduel (juste avant la prise)

Taux de Prothrombine - plasma

TPH

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chromométrique

 B 16 - réf 0126

 Si un traitement par AVK est en cours, demander plutôt un INR.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Teicoplanine - sérum

TEI

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie

 B 70 - réf 1650

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Témazépam - Sérum

TEMAZ *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Temps de céphaline activé - TCA - plasma

TCA

2mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 B 16 - réf 1127 (+B20 - réf. 0182 si TCA allongé)

 En cas de demande d'exploration d'allongement du TCA sans précision, un dosage des FVIII, IX, XI est ajouté au TCA. Dans un contexte pré-opératoire, la recherche d'anticoagulant circulant est limitée au TCA, TCA M+T et calcul de l'indice de Rosner.
Indiquer le contexte clinique et préciser si le patient est sous anticoagulant.
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Temps de thrombine

TT

1mL Plasma Citraté ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique chronométrique

 18.00 EUR non remboursable

 Joindre les données cliniques concernant le patient (syndrome inflammatoire important, grossesse, notion familiale...) et les circonstances (hémorragies, thrombose, bilan pré-opératoire), traitement substitutif
Préciser le traitement anticoagulant en cours
Il est recommandé de nous adresser un prélèvement citraté centrifugé et congelé selon les recommandations pré-analytiques du GFHT.

Temps d'hémolyse 50 - Complément voie alterne - sérum

AP50 *

3mL Sérum ° Congelé < 4h

 2 mois ° Enzymoimmunologie

 17.00 EUR non remboursable

 Envoi rapide après prélèvement(sous 48h impérativement)
Proscrire tube avec gel

Ténofovir - plasma

TENO *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMS

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise), T1h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Test de signature moléculaire pour le pronostic du cancer du sein - Test PROSIGNA

PAM50 *

Bloc de tissu de cancer mammaire inclus en paraffine ° T° ambiante

-  10 jours ° Cette analyse est réalisée en collaboration avec l'Institut Curie - Paris
-  1980.00 EUR non remboursable , si le résultat du pourcentage d'infiltration ne permet pas de réaliser l'analyse PAM50, l'analyse d'anatomo-cytopathologie sera facturée 110.00 EUR non remboursable.

-  Joindre le compte rendu anatomopathologique et immunohistochimique
Utiliser le bon de demande spécifique B9 : Biologie des Tumeurs Solides

Test moléculaire non invasif pour le suivi du cancer de la vessie (Test Xpert Bladder Cancer Monitor) - Urines

URMOL

5mL Urines ° T° ambiante

-  Nous consulter.
RIHN:5xN408

-  Utiliser le bon de demande spécifique B7 : Test moléculaire urinaire cancer de la vessie
Consulter le protocole spécifique de prélèvement et de conservation (K7P)
-  K7 : Kit Test Xpert® Bladder Cancer Monitor

Testostérone biodisponible - femme/enfant - sérum

TBEF

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  6 jours ° Radioimmunologie
-  B 80 - réf 0701

-  Prélèvement à jeun IMPERATIF

Testostérone biodisponible - sérum

TBH

3mL Sérum ° Congelé < 4h

-  4 jours ° Radioimmunologie
-  B 80 - réf 0701

-  Prélèvement à jeun
Proscrire prélèvement lipémique

Testostérone - femme/enfant - sérum

TEF

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  2 jours ° Radioimmunologie
-  B 68 - réf 1136

Testostérone - homme - sérum

TH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 50 - réf 0357

 **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Testostérone libre - Sérum

TLI

1mL Sérum non hémolysé et non lipémique ° Congelé < 4h

 3 jours ° Radioimmunologie

 B 80 - réf 0701

Testostérone - salive

TESSA

0.5mL Salive ° Congelé < 4h

 1 mois ° ELISA

 54.00 EUR non remboursable

 Le prélèvement s'effectue sur "Salivette". Avant le prélèvement, le patient doit observer un délai d'au moins 30 minutes sans prise de nourriture ou de boisson acide. Il est très important de ne pas contaminer l'échantillon de salive avec du sang, aussi faut-il éviter le brossage des dents avant le recueil. Le protocole de recueil est décrit dans la notice accompagnant le kit de prélèvement.

 K5 : Kit de prélèvement Recueil de salive

Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum

TET

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 50 - réf 1332

Tétrachloréthylène - sang total

TCHLS *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur d'électrons

 64.00 EUR non remboursable

 Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE

 T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Tétrachloréthylène - urines

TCHLU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur d'électrons
-  64.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
-  T18 : Flacon verre, bouchon PTFE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Tétrachlorométhane - sang total

TCM *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur d'électrons
-  64.00 EUR non remboursable

-  Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE
-  T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Tétragluucose - urines

GLC4 *

Urines fraîchement émises ° Congelé

-  2 mois °
-  B 500 - réf 4001

-  Congeler l'échantillon dans l'heure

Tétrazépam - Sérum

TETRA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° HPLC
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Thallium - plasma

THALS *

2mL Plasma EDTA ° Réfrigéré

-  3 semaines °
-  47.00 EUR non remboursable

Thallium - urines

THALU *

5mL Urines ° Réfrigéré

 3 semaines °

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Théophylline - sérum

THEO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Immunoturbidimétrie

 B 50 - réf 0335

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Thiocyanates - ion - Sérum

CYANP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Spectrophotométrie

 29.00 EUR non remboursable

 Prélever avant l'administration du traitement. Préciser le contexte clinique.

Thiocyanates - ion - urines

CYAN *

1tube(s) Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Spectrophotométrie

 29.00 EUR non remboursable

 Prélever avant l'administration du traitement. Préciser le contexte clinique.

 T28 : tube urines (4mL)

Thiols - plasma

THIOL *

1mL Plasma Héparine de lithium ° Congelé

 3 semaines ° Chimie - Spectrophotométrie

 17.00 EUR non remboursable

 Centrifugation réfrigérée (10 minutes/4000 rpm)
Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Identification des tubes d'aliquotage : nom et date naissance du patient et nom de l'analyse.

Thiopurine S-Méthyltransférase - activité

ACTPM *

5mL Sang total Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 8 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance

 53.00 EUR non remboursable

 Envoyer le jour même du prélèvement
Prélever du Lundi au Mercredi

Thiopurine S-méthyltransférase - génotypage - sang total

TPMT *

5mL Sang total EDTA ° Réfrigéré

 8 semaines ° Biologie moléculaire

 161.00 EUR non remboursable

 Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente
Faire le prélèvement le jour même de l'envoi. stabilité courte. Evitez la livraison les vendredis ou les samedis.
Analyse sous traitée

Thioridazine - Sérum

THIO *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 à 3 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)

Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel

AGREG *

4 aliquots de 1.5 à 2 mL de Plasma citraté (non CTAD)pauvre en plaquettes obtenu après centrifugation à 3500g entre 15 et 25°C et par défaut double centrifugation. ° Congelé < 4h

 10 jours ° HIPA (test fonctionnel-agrégation plaquettaire)

 B 100 - réf 1011 X 3 (test fonctionnel uniquement)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R19 : TIH)
Prélèvement réalisé avant la mise sous Orgaran et 6 heures après la prise d'antiagrégants plaquettaire (autres que GPIIa-IIIa)
Si vous disposez d'un résultat d'anticorps anti-Pf4/héparine, merci de nous l'indiquer (valeur et technique utilisée)

Thymidine kinase - Sérum

TKREA *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Radioimmunologie

 78.00 EUR non remboursable

Thyroglobuline - liquide biologique

THYRD

2mL Liquide biologique ° Congelé < 4h

-  5 jours ° Chimiluminescence
-  31.00 EUR non remboursable

-  **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Thyroglobuline - sérum

THYRO

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimiluminescence
-  B 60 - réf 0821

-  **ATTENTION** : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. **ARRET** indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Thyroxine Binding globuline - TBG - sérum

TBG

1mL Sérum ° Congelé < 4h

-  2 semaines (si dilution/contrôle nécessaire - délai 4 semaines) ° Radioimmunologie
-  34.00 EUR non remboursable

Tiagabine - Sérum

TIAGA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  B 120 - réf 1671

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Tianeptine - sérum

TIAN *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
-  B 120 - réf 1665

-  Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter **IMPERATIVEMENT** :
 - la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

Tiapride - Sérum

TIAPR *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Tipranavir - Sérum

TIPRA *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 4117

 Prélèvement T0 (avant la prise) et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Titane

TITAN *

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

 1 mois ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie d'Emission Atomique

 47.00 EUR non remboursable

Titane - liquide biologique

TITAD *

2mL Liquide biologique ° Réfrigéré

 10 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie d'Emission Atomique

 47.00 EUR non remboursable

Titane - urines

TITAU *

15mL Urines ° Réfrigéré

 15 jours ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie d'Emission Atomique

 47.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum

TNF

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chimiluminescence

 55.00 EUR non remboursable

Tobramycine - sérum

TOB

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Technique immunoenzymatique

 B 70 - réf 1650 / B 120 - réf. 1651 (2 dosages)

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R18 : Anti-infectieux)
Taux résiduel = avant injection ; Pic = 30 mn après la fin de la perfusion ou 1h après injection IM

Tocilizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

TOCI *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 142.00 EUR non remboursable

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Toluène - sang total

TOLS *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 1 mois ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 64.00 EUR non remboursable

 Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE

 T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Toluène - urines

TOLU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse

 58.00 EUR non remboursable

 Flacon en verre avec bouchon en PTFE
Prélèvement en fin de poste de travail

 T18 : Flacon verre, bouchon PFTE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Topiramate - sérum

TOPIR

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMSMS

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Levetiracetam; Gabapentine; Lamotrigine; Oxcarbazepine/10-OH-Carbazepine; Topiramate.

Toscana virus - diagnostic direct - PCR

TOSBM

Plasma EDTA, Sérum, Urines, salive ° Réfrigéré

 3 jours ° RT - PCR en temps réel

 136.00 EUR non remboursable

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Toxine botulique - Clostridium botulinum - botulisme

BOTU *

10mL Sérum, selles ° Réfrigéré

 Délai variable : premier résultat possible au bout de 4 jours °

 Acte gratuit. ATTENTION si recherche sur aliment 260.00 EUR HT non remboursable

Toxocarose - sérologie confirmation - sérum

TOXC

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 4 jours ° Western-Blot

 B 180 - réf 4343

Toxocarose - sérologie - sérum

TCAR

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 3 jours ° Enzymoimmunologie

 B 80 - réf 4340 ; itératif B 68 - réf 6340

 Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence Sur demande précise

 B 120 - réf 1438 , chez la femme enceinte.
A réaliser à l'initiative du biologiste sur le sérum initiale en cas de présence d'IgG et d'IgM(IgM confirmées sur un nouveau prélèvement)
48 EUR non remboursable pour les autres cas.

Toxoplasmose - diagnostic direct - PCR

Sécrétions bronchiques, LBA, humeur aqueuse, biopsie ganglionnaire, cérébrale, 1 mL sang total EDTA (nouveau-né uniquement), 0.5 mL LCR (minimum) : Réfrigéré °

 3 jours ° PCR temps réel

 B 150 - réf 4508 / 68.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec ou avec du milieu de transport M4RT.
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Toxoplasmose - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

5mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

 1 semaine °

 B 600 - réf 4063

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Toxoplasmose - IgM confirmation - sérum

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° ELFA

 B 20 - réf 1428 .
A réaliser sur un nouveau prélèvement en cas de résultats équivoques ou positifs d'IgM, obtenus lors du test TOXO - Toxoplasmose - sérologie IgG/IgM (B40 - réf.1420)

Toxoplasmose - recherche de néosynthèse d'IgG, d'IgM ou d'IgA

TOXWB *

1 mL Sérum de la mère + 1 mL Sérum de l'enfant prélevé 5 j après naissance ° Réfrigéré

 11 jours ° Western-Blot

 B 320 - réf 1439

 Préciser le contexte clinique
ATTENTION : toujours associé le sérum de la mère et celui de l'enfant (prélevé au 5ème jour après la naissance) pour comparaison des profils

Toxoplasmose - sérologie IgG/IgM - sérum

TOXO

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Chimiluminescence - Enzymoimmunologie

 B 39 - réf 1420 .

En présence de résultats d'IgG douteux, enclenchement de l'analyse WBTXG - Toxoplasmose - test de confirmation IgG (B180 - Réf.1427)

Si deuxième prélèvement : B60 - Réf.1421

 En cas de résultat douteux réalisation automatique d'un test de confirmation par westernblot code WBTXG
Préciser le type : dépistage, dépistage contrôle, suivi, suivi contrôle, grossesse dépistage, grossesse dépistage contrôle, grossesse suivi, grossesse suivi contrôle ou nouveau né

Toxoplasmose - test de confirmation IgG - sérum

WBTXG

500µL Sérum ° Réfrigéré

 1 semaine ° western blot LDBIO

 B 180 - réf 1427

TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum

TPA

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 jours ° Chimiluminescence

 B 90 - réf 0813

 Centrifuger rapidement, séparer le surnageant et le congeler
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prière de libeller la demande en toutes lettres et de proscrire toute abréviation
Ne pas confondre avec le tPA - Activateur Tissulaire du Plasminogène

Tramadol - Sérum

TRAMA *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV

 B 95 - réf 1659

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Transferrine Carboxy déficiente - contrôle - technique alternative - sérum**CDTC ***

1mL Sérum ° Réfrigéré

 8 jours ° Néphélométrie B 55 - réf 0779 Proscrire le plasma

Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum**CDTHN**

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrophorèse capillaire 21.00 EUR non remboursable Proscrire le plasma

Transferrine Carboxy déficiente - sérum**CDT**

1mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrophorèse capillaire B 55 - réf 0779 Proscrire le plasma

Transferrine - sérum**SIDER**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoturbidimétrie 15.00 EUR non remboursable Préciser l'âge et le sexe du patient

Trazodone - Sérum**TRAZO ***

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° HPLC B 120 - réf 1671 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Écouvillonnage cutanéomuqueux, génital
500 µL LCR
biopsie ou ponction ganglionnaire, sang de cordon, sécrétions nasales ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPÉRATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Spectrométrie UV à barette de diodes
-  B 100 - réf 1662

-  Ne pas utiliser de tube avec séparateur de phase
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Conformément à la NABM, toute demande doit comporter IMPÉRATIVEMENT :
 - la date et l'heure de prélèvement, la date et l'heure de la dernière prise
 - les raisons de la prescription (recherche d'efficacité et/ou de toxicité)
 - la date de début du traitement et/ou de l'éventuelle modification de posologie
 - l'âge, la taille et le poids du sujet lorsque cela est possible
 - les renseignements posologiques (quantité administrée, fréquence, voie d'administration)
 - la fiche de suivi médical

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Western-Blot
-  B 120 - réf 4359

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  B 40 - réf 4358 ; itératif B 60 - réf 6358

-  Si dépistage positif réalisation du test de confirmation

Trichloréthylène - sang total

TCES *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  58.00 EUR non remboursable

-  Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE
-  T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Trichlorométhane - sang total

CHLOR *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Capteur d'électrons
-  64.00 EUR non remboursable

-  Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE
-  T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Trichomonas vaginalis - diagnostic direct - PCR

TRIBM

2mL Prélèvement génital, urines ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel (sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Trihéxyphénidyle - Sérum

TRIHE *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  118.00 EUR non remboursable

-  Prélever avant l'administration du traitement. Préciser le contexte clinique.
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Trimipramine - Sérum

TRIMI *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

3mL Sérum (proscrire le plasma) ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoroimmunologie temps résolu

 B 145 - réf 4006

 Prélèvement non lipémique, non ictérique et non hémolysé. Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures. Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Garder une sérothèque jusqu'à réception du résultat. Conformément à l'arrêté du 23 juin 2009 (JO du 3 juillet 2009), joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements, la copie du compte-rendu échographique et le formulaire de consentement de la femme enceinte (modèle donné par l'arrêté du 14 janvier 2014) dûment rempli et signé par le prescripteur et la patiente.

Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum

21T

3mL Sérum (proscrire le plasma) ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoroimmunologie temps résolu

 B 110 - réf 4004

 Prélèvement non lipémique, non ictérique et non hémolysé. Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures. Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Garder une sérothèque jusqu'à réception du résultat. Conformément à l'arrêté du 23 juin 2009 (JO du 3 juillet 2009), joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements, la copie du compte-rendu échographique et le formulaire de consentement de la femme enceinte (modèle donné par l'arrêté du 14 janvier 2014) dûment rempli et signé par le prescripteur et la patiente.

Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum

E21

3mL Sérum (proscrire le plasma) ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoroimmunologie temps résolu

 B 110 - réf 4004

 Prélèvement non lipémique, non ictérique et non hémolysé. Le prélèvement doit être centrifugé le plus rapidement possible, dans un délai maximum de 4 heures. Pour les DOM-TOM et l'International : CONGELE < 4H IMPERATIF
Garder une sérothèque jusqu'à réception du résultat. Conformément à l'arrêté du 23 juin 2009 (JO du 3 juillet 2009), joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements, la copie du compte-rendu échographique et le formulaire de consentement de la femme enceinte (modèle donné par l'arrêté du 14 janvier 2014) dûment rempli et signé par le prescripteur et la patiente.

Tropheryma whipplei - diagnostic direct - PCR

WHIBM

LBA, Plasma ou sang total EDTA, sérum, biopsie, selles, liquides de ponction, salive, 0.5 mL LCR (minimum), urines ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  132.00 EUR non remboursable

-  Les biopsies doivent être déposées telles quelles dans un tube sec
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Proscrire tout fixateur histologique
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Troponine Ic HS

TROPI

1mL sérum ° Congelé < 4h

-  1 jour ° CMIA
-  B 58 - réf 7335

-  Joindre les renseignements cliniques
Centrifuger, Décanter et Congeler entre 30 min et 2 heures. Eviter les tubes en verres.

Trypanosoma cruzi - confirmation - sérum

WBTRY

500µL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  7 jours ° Western-Blot
-  66.00 EUR non remboursable

Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum

TRYPA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence indirecte
-  B 40 - réf 4361

Trypanosoma gambiense - recherche - LCR

TRYPL *

1mL LCR ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Immunofluorescence
-  B 30 - réf 0268

Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR

TRYL *

1mL LCR ° Réfrigéré

 15 jours ° Agglutination (CATT) et Immunofluorescence

 B 40 - réf 4360

Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum

TRYS *

1mL Sérum ° Réfrigéré

 15 jours ° Agglutination (CATT) et Immunofluorescence

 B 40 - réf 4360

Tryptase - sérum

TRYPT

1mL Sérum ° Réfrigéré

 3 jours ° Fluoro-Enzymoimmunologie

 B 80 - réf 0969

 En cas de réaction anaphylactique, prélever le plus rapidement possible après le choc, puis à + 2H et + 8H

 K2: Kit de prélèvement - A utiliser uniquement en cas de choc anaphylactique

Tryptophane

TRYPO

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

 2 semaines ° LCMSMS

 53.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R26 : Biochimie métabolique)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

TSH - Hormone Thyro Stimulante - 3ème génération - sérum

TSH

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Electrochimiluminescence

 B 20 - réf 1208 / B 40 - réf. 1211, T4L +TSH / B 42 - réf. 1210, T3L+TSH / B 52 - réf.1212, les 3 paramètres

 ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Tularémie - Francisella tularensis - sérologie - sérum

TUL

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  4 jours ° Chimiluminescence
-  34.00 EUR non remboursable

Tyrosine

TYROS

1mL plasma hépariné (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé

-  1 semaine ° HPLC
-  53.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun (pour les nourrissons, prélever 3 à 4H
après le biberon)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Tyrosine - urine

TYROU

2tube(s) Urines échantillon des premières urines du matin (à jeun) ° Congelé

-  1 semaine ° HPLC
-  53.00 EUR non remboursable

-  Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique
(R1 : Acides-amines - Acides-organiques)
Prélèvement à jeun
-  T28 : tube urines (4mL)

UGT1A1 : recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347) - impliqué dans le métabolisme de l'irinotécan

UGT1A

1tube(s) Sang total Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Réfrigéré

-  10 jours ° PCR temps réel
-  86.00 EUR non remboursable

-  1 tube spécifique pour cette analyse
Conformément aux dispositions réglementaires, toute
demande doit être accompagnée de l'attestation de
consultation et du consentement éclairé du patient et de la
prescription médicale

Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)

5FUU

2tube(s) Plasma Héparinate de lithium (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé

-  5 jours ° LCMSMS
-  B 120 - réf 0500

-  Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
Effectuer le prélèvement avant toute administration de
fluoropyrimidines (5-FU ou capécitabine) ou à distance
d'au moins une semaine de la dernière cure de
chimiothérapie comportant des fluoropyrimidines
Congeler l'échantillon dans l'heure

Ustekinumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

USTEK *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 142.00 EUR non remboursable

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Vanadium - urines

VANAU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

 3 semaines ° Source Plasma à Couplage Inductif/Spectrométrie de masse

 53.00 EUR non remboursable

 Prélèvement 16H après la fin de poste de travail sur flacon plastique

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Vancomycine - sérum

VANC

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 1 jour ° Enzymoimmunologie

 B 70 - réf 1650

 1 tube spécifique pour cette analyse
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R18 : Anti-infectieux)
Moment du prélèvement : taux résiduel = avant injection IV ; pic post-injection = 45 à 60 mn après la fin de la perfusion IV

Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR

VZVBM

500µL Prélèvement cutanéomuqueux, oculaire, sécrétions bronchiques, LBA, 1 mL sang total EDTA, 0.5 mL LCR (minimum) : Réfrigéré °

 3 jours ° PCR temps réel

 B 100 - réf 4507 / 68.00 EUR non remboursable hors recommandations

 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel(sans milieu de transport)
Joindre la fiche de renseignements spécifique (R52 : PCR-cotation-NABM)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.

 K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique

VZVLA

5mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

 1 semaine ° PCR temps réel

 B 600 - réf 4066

 Joindre obligatoirement le bon de demande (B3) et le consentement éclairé de la patiente (D44)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Varicelle Zona - sérologie IgG - sérum

VARZG

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 B 60 - réf 1779 , uniquement dans les cas suivants :
Détermination du statut immunitaire dans les contextes suivants :
a) femme enceinte en contact avec une personne atteinte de varicelle.
b) candidats à la vaccination.
c) avant traitement immunosuppresseur au long cours.
33
EUR non remboursable pour les autres cas.

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours
Sur demande précise

Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum

VARZM

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence

 33.00 EUR non remboursable

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total

VASP

1 * 2mL Sang total Citraté ° T° ambiante

 2 jours ° Cytométrie en flux

 72.00 EUR non remboursable

 L'échantillon doit nous parvenir dans les 24H (technique réalisable dans les 48H maximum)
Réaliser les prélèvements du lundi au jeudi avant le passage de la société de collecte
Utiliser des tubes à prélèvement en plastique non mouillable
Indiquer le type de molécule, le nombre de comprimés/j et l'indication.

Vedolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

VEDO *

1mL Sérum ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Enzymoimmunologie

 142.00 EUR non remboursable

 Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise

Venlafaxine - sérum

VENLA

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 9 jours ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem

 B 120 - réf 1665

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Prélèvement toujours à la même heure avant une nouvelle prise
Les examens suivants peuvent être réalisés sur le même prélèvement : Citalopram; Duloxetine; Fluoxetine; Fluvoxamine; Mirtazapine; Paroxetine; Sertraline; Venlafaxine.

Vérapamil - Sérum

VERAP *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse

 B 120 - réf 1678

 Précisez le contexte clinique (intoxication / suivi thérapeutique pharmacologique). Intoxication : précisez l'heure supposée d'ingestion. Suivi thérapeutique pharmacologique : mesure résiduelle (juste avant la prise médicamenteuse) réalisée à l'état d'équilibre (5 demi-vies à posologie constante)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Vigabatrin - Sérum

SABRI *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Fluorimétrie

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique d'immuno-transfert - sérum

WB12

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Immunoblot

 B 220 - réf 0390

 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie dépistage - sérum**HIV**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 2 jours ° Chimiluminescence B 42 - réf 0388 Réfrigéré, si acheminement en moins de 7 jours

VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma**HIVQ**

2.5mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 3 jours ° TMA en temps réel B 175 - réf 4122 Utiliser des tubes EDTA standard avec centrifugation puis transfert du plasma dans un nouveau tube.
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma**HIVQ2 ***

2 * 2mL Plasma EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 15 jours ° B 175 - réf 4122 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum**P24AG**

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Enzymoimmunologie B 55 - réf 0392 Avec test de neutralisation si positif
ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR**HIVQL ***

1mL LCR ° Congelé < 4h

 1 semaine ° PCR B 175 - réf 4122 1 aliquote spécifique pour cette analyse.

VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase et de la protéase): profil de résistance aux anti-viraux - plasma

RVIH *

2 * 2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

-  14 jours (21 jours si une technique complémentaire est requise)
° Séquençage
-  B 1300 - réf 0805

-  La charge virale minimale conseillée est de 50 copies (85 UI)
Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée.
Préciser les différents traitements anti-viraux

VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) : profil de résistance aux antiviraux - plasma

RVIH2 *

2 * 2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

-  14 jours (21 jours si une technique complémentaire est requise)
° Séquençage
-  B 550 - réf 0806

-  La charge virale minimale conseillée est de 50 copies (85 UI)
Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée.
Préciser les différents traitements anti-viraux

VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotype de résistance aux anti-rétroviraux (inhibiteur de l'intégrase) - plasma

RVIH3 *

2 * 2mL Plasma EDTA ° Congelé < 4h

-  14 jours (21 jours si une technique complémentaire est requise)
° Séquençage
-  B 1300 - réf 0805

-  La charge virale minimale conseillée est de 50 copies (85 UI)
Le test ne pourra être effectué que si le résultat d'une charge virale contemporaine du prélèvement est précisée.
Préciser les différents traitements anti-viraux

Viloxazine - Sérum

VILOX *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  10 jours ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma

VIP

1mL Plasma EDTA + Aprotinine - non hémolysé ° Congelé

-  10 jours ° Radioimmunologie
-  B 90 - réf 0774

-  Centrifugation réfrigérée
Congeler l'échantillon dans l'heure. Domicile déconseillé
Prélever sur tube spécial (EDTA + Aprotinine)
-  T2 : Tube EDTA + aprotinine

Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic direct - PCR

VIRBM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  259.00 EUR non remboursable

-  Existe aussi en PCR mono-paramétrique
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture (sachet VIOLET S14 fourni)

Virus respiratoire syncytial - VRS - diagnostic direct - PCR

VRSBM

Rhinopharynx, sécrétions bronchiques, LBA ° Réfrigéré

-  3 jours ° PCR temps réel
-  136.00 EUR non remboursable

-  Existe aussi en PCR multiplex (VIRBM) comprenant les détections des virus VRS, HMPV et Rhinovirus
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Les autres prélèvements biologiques doivent être envoyés tel quel (sans milieu de transport)
Les prélèvements sur écouvillons nécessitent l'utilisation d'un milieu de transport fourni dans le kit K13.
-  K1 : Kit recherche de virus par PCR ou culture

Virus respiratoire syncytial - VRS - sérologie IgG - sérum

VRS

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  1 semaine ° Enzymoimmunologie
-  B 70 - réf 3787

Vitamine A - Rétinol - Plasma

VA

2mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  4 jours ° HPLC
-  B 80 - réf 7301

-  Congeler l'échantillon dans les 90 minutes. Domicile déconseillé
Si demandée avec la vitamine E, 1 aliquote spécifique pour les 2 dosages
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine B12 - sérum

B12

1mL Sérum ° Réfrigéré

-  1 jour ° Chimiluminescence
-  B 35 - réf 1374

-  ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Vitamine B1 - Thiamine

VB1ST

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 6 jours ° LCMSMS

 40.00 EUR non remboursable

 Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine B2 - Riboflavine

VB2

1mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 46.00 EUR non remboursable

 Sang total impératif
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal

VB6ST

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 6 jours ° LCMSMS

 B 80 - réf 7305

 1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine B8 ou H - Biotine

VB8

2mL Plasma Héparine de lithium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 2 semaines ° Technique immunoenzymatique

 74.00 EUR non remboursable

 Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine C - Acide ascorbique

VCP

2mL Plasma Héparine de lithium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 7 jours ° HPLC

 47.00 EUR non remboursable

 Centrifuger et congeler dans les 20 minutes
Prélèvements à réaliser dans votre laboratoire exclusivement les lundis, mardis ou mercredis et à transmettre le jour même à Eurofins (DELAI DE CONSERVATION DU PLASMA héparine de lithium CONGELE DE 48 HEURES AVANT TECHNIQUE).
1 aliquote spécifique pour cette analyse.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum

125D

3mL Sérum non hémolysé ° Réfrigéré

 3 jours ° CLIA

 B 80 - réf 1820

Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum

25D

1mL Sérum ° Réfrigéré

 1 jour ° Chimiluminescence

 B 30 - réf 1139

 La prise en charge de cet acte est limitée aux situations suivantes :

- suspicion de rachitisme
- suspicion d'ostéomalcie
- suivi ambulatoire de l'adulte transplanté rénal au-delà de trois mois après transplantation
- avant et après chirurgie bariatrique
- évaluation et prise en charge des personnes âgées sujettes aux chutes répétées
- respect des résumés des caractéristiques du produit(RCP) des médicaments préconisant la réalisation de l'acte 1139

ATTENTION : interférence possible chez les patients traités par biotine (vitamine B7, B8 ou H) ou sous complément alimentaire contenant de la biotine. ARRET indispensable du traitement 8 jours avant le prélèvement

Vitamine E - Tocophérol - Plasma

VE

2mL Plasma Hépariné (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 4 jours ° HPLC

 B 100 - réf 7302

 Congeler l'échantillon dans les 90 minutes. Domicile déconseillé
Si demandée avec la vitamine A, 1 aliquote spécifique pour les 2 dosages.
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine K1 - Phylloquinone

VK

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° LCMSMS

 134.00 EUR non remboursable

 Congeler l'échantillon dans les 90 minutes. Domicile déconseillé
Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Vitamine PP - Niacine

VPP

2mL Sang total EDTA (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chromatographie Liquide Ultra Haute Performance (UPLC)
-  37.00 EUR non remboursable

-  1 aliquote spécifique pour cette analyse. Stocker les prélèvements à l'abri de la lumière mais ne pas emballer le tube.

Voriconazole - Sérum

VORI *

3mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  47.00 EUR non remboursable (47.00 HN non remboursable x3 si 3 temps)

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R8 : Antifongiques et antituberculeux)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Vortioxétine - Sérum

VORTI *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec gel séparateur) ° Congelé < 4h

-  15 jours ° HPLC
-  B 120 - réf 1665

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

West Nile virus - WNV - diagnostic direct - PCR

WNVBM

0.5 mL LCR
2 mL Plasma EDTA, Sérum
2 ml urines ° Réfrigéré

-  3 jours ° RT - PCR en temps réel
-  B 180 - réf 5269 /108,00 EUR non remboursable (si prélèvements ne répondant pas aux exigences réglementaires/renseignements cliniques non communiqués)

-  Prélèvement jusqu'à J7 après le début des signes cliniques et jusqu'à J14 pour les sujets immunodéprimés. Joindre impérativement la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile -Zika)
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum

WNV

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chimiluminescence
-  B 90 - réf 1253 ; itératif B 135 - réf 3253

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)

20mL Urines échantillon ° Congelé

 3 mois ° B 500 - réf 4001 + B6 ref 0627 : créatinine urinaire Congeler l'échantillon dans l'heure

X Fragile - syndrome - prénatal

XFRAP

Liquide amniotique frais ou cultivé, trophoblaste frais ou cultivé ° T° ambiante

 9 jours PCR - 15 jours confirmation par PCR Amplidex ° PCR - PCR Amplidex (confirmation) B 700 - réf 4083 5 ml de sang total sur EDTA de chaque parent (cotation 2 x B500 - réf 4082) sont nécessaires à la réalisation de ce testUtiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

X Fragile - syndrome - sang total

XFRA

5mL Sang total EDTA ° T° ambiante

 9 jours PCR - 15 jours confirmation par PCR Amplidex ° PCR - PCR Amplidex (confirmation) B 500 - réf 4050 Conformément aux dispositions réglementaires, toute demande doit être accompagnée de l'attestation de consultation et du consentement éclairé du patient et de la prescription médicaleRéfrigérer l'échantillon si transport > 48H
Utiliser le bon de demande spécifique B12 : Génétique moléculaire constitutionnelle
Joindre les renseignements cliniques

Xylènes - sang total

XYLEN *

5mL Sang total EDTA ou Hépariné ° Réfrigéré

 2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse 58.00 EUR non remboursable Proscrire les tubes contenant du merthiolate
Prélèvement en fin de poste de travail
Transfert du sang total dans un tube en verre avec bouchon PTFE T17 : Tube verre, bouchon PTFE pour solvants - sang total (fourni sur demande)

Xylènes - urines

XYLU *

10mL Urines échantillon ° Réfrigéré

-  2 semaines ° Chromatographie en phase gazeuse / Spectrométrie de masse
-  58.00 EUR non remboursable

-  Flacon en verre avec bouchon en PTFE
-  T18 : Flacon verre, bouchon PTFE pour solvants - urines (fourni sur demande)

Xylose - sérum

XYL *

2mL Sérum ° Congelé < 4h

-  1 semaine ° Chimie - Spectrophotométrie
-  B 60 - réf 1414

-  Nature de prélèvement : 2 sérums
 - Prélèvement à temps TO avant l'ingestion de xylose OBLIGATOIRE.
 - Prélèvement à temps + 1 heure après ingestion de xylose (5g pour les adultes /0.7g/kg de poids pour les enfants Prélèvement à jeun.
 - Prélèvement à jeunAnalyse effectuée dans le cadre d'un Test au D-xylose.

Zidovudine - plasma

ZIDO *

3mL Plasma EDTA centrifugé rapidement ° Congelé < 4h

-  3 semaines ° Chromatographie Liquide Haute Performance / Détection UV
-  B 120 - réf 4117

-  Prélèvement T0 (avant la prise), T1h et T3h (après la prise)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R6 : Anti-rétroviraux)

Zika - détection ARN viral - PCR - liquide amniotique

ZIKLA

8mL Liquide amniotique ° Réfrigéré

-  5 jours ° PCR temps réel
-  108.00 EUR non remboursable

-  Joindre obligatoirement le bon de demande (B3)
Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifiques R28 (Dengue-Chikungunya-Zika) et le consentement éclairé de la patiente
Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
Par la suite, merci de nous faire parvenir la fiche de suivi de grossesse(R10: suivi-grossesse-Agents-infectieux)
-  S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

2mL Plasma EDTA, Sérum, Urines, salive, sperme ° Réfrigéré

 3 jours ° PCR temps réel

 B180 - réf 5263 (si prélèvement sanguin répondant aux exigences de la NABM)
 B180 - réf 5264 (si prélèvement urinaire répondant aux exigences de la NABM)
 B180 - réf 5268 (si sperme répondant aux exigences de la NABM)
 B320 - réf 5265 (si prélèvement sanguin demandé avec Dengue et Chikungunya)
 B250 - réf 5266 (si prélèvement sanguin demandé avec Dengue)
 B250 - réf 5267 (si prélèvement sanguin demandé avec Chikungunya)
 108.00 EUR non remboursable (si salive, LCR ou ne répondant pas aux exigences réglementaires/ renseignements cliniques non communiqués)
 ou 121.00 EUR non remboursable (si 2 natures de prélèvement ou ne répondant pas aux exigences réglementaires)

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)
 Utiliser IMPERATIVEMENT le sachet de transport violet S14
 Pour 2022 , les départements français sous surveillance renforcée du 1 mai au 30 novembre sont :
 Ain (01), Aisne (02), Alpes-de-Haute-Provence (04), Hautes-Alpes (05), Alpes-Maritimes (06), Ardèche (07), Ariège (09), Aude (11), Aveyron (12), Bouches-du-Rhône (13), Cantal (15), Charente (16), Charente-Maritime (17), Cher (18), Corrèze (19), Haute Corse (2B), Corse du Sud (2A), Côte d'Or (21), Dordogne (24), Doubs (25), Drôme (26), Gard (30), Haute-Garonne (31), Gers (32), Gironde (33), Hérault (34), Indre (36), Indre et Loire (37) , Isère (38), Jura (39), Landes (40), Loire (42), Loire Atlantique (44), Loiret (45), Lot (46), Lot-et-Garonne (47), Lozère (48), Maine-et-Loire (49), Mayenne (53), Meurthe et Moselle (54) , Nièvre (58), Puy-de-Dôme (63), Pyrénées-Atlantiques (64), Hautes-Pyrénées (65), Pyrénées-Orientales (66), Bas-Rhin (67), Haut-Rhin (68), Rhône (69), Saône-et-Loire (71), Savoie (73), Haute Savoie (74), Paris (75), Seine-et-Marne (76), Yvelines (78), Deux Sèvres (79), Tarn (81), Tarn-et-Garonne (82), Var (83), Vaucluse (84), Vendée (85), Vienne (86), Haute-Vienne (87), Essonne (91), Hauts-de-Seine (92), Seine-Saint-Denis (93), Val-de-Marne (94), Val d'Oise (95).

 S14 : Sachets VIOLET de transport pour recherche d'agents infectieux (méthode moléculaire & mycobactéries)

Zika - sérologie - sérum

ZIKA

1mL sérum (pas de tube de 10 mL) ° Réfrigéré

 1 semaine ° Enzymoimmunologie B 90 - réf 1253

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R28 : Dengue-Chikungunya-West Nile-Zika)

Zinc

ZN

2mL Plasma héparinate de sodium(proscrire les tubes avec séparateur) ° Réfrigéré

 4 jours ° ICP/MS B 30 - réf 2003

 Centrifuger et décanter IMPERATIVEMENT avant l'envoi.
 Centrifuger le prélèvement et décanter rapidement
 Proscrire les prélèvements hémolysés

 T4 : Tube héparine de sodium

Zinc - plasma séminal

ZNSP

1mL Plasma séminal sur tube fluoré ° Congelé < 4h

 15 jours ° ICP/MS

 B 175 - réf 0072 (comporte le dosage du fructose, citrate et zinc). Si réalisé seul 24.00 EUR non remboursable

 Recueil effectué après 2 à 8 jours d'abstinence. Préciser obligatoirement le volume de l'éjaculat et le délai d'abstinence et si possible le pH, la numération des spermatozoïdes. Centrifuger et congeler immédiatement le surnageant

Zinc - urines

ZNU *

20mL Urines de fin de poste ° Réfrigéré

 15 jours ° ICP/MS

 26.00 EUR non remboursable

 T9 : Flacon urines 70 ml en polypropylène

Zolpidem - Sérum

ZOLPI *

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 100 - réf 1662

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Zonisamide - Sérum

ZONI *

1mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

 2 semaines ° HPLC

 B 120 - réf 1671

 Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Zonuline - selles

ZONUL

20g Selles échantillon ° Réfrigéré

 8 jours ° ELISA

 57.00 EUR non remboursable

2mL Sérum (proscrire les tubes avec séparateur) ° Congelé < 4h

-  2 semaines ° Chromatographie en phase liquide / Spectrométrie de masse en tandem
-  B 100 - réf 1662

-  Joindre la fiche de renseignements cliniques spécifique (R13 : Dosage de médicaments)
1 aliquote spécifique pour cette analyse.

Liquide amniotique frais ou cultivé, villosités chorales ° T° ambiante

-  3 semaines ° Etude de microsatellites par PCR
-  B 700 - réf 4083

-  Joindre IMPERATIVEMENT la prescription médicale, la fiche de renseignements cliniques, l'attestation de consultation et le consentement de la patiente conformément à l'article R.2131-1 du décret 2006-1661 du 22 décembre 2006

INDEX DES EXAMENS CLASSES PAR SPECIALITES

Allergie

ALEX	IgE spécifiques : Puce ALEX - sérum
CP	IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia
CPH	IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor
CT	IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia
CTH	IgE spécifiques - trophallergènes - allergène unique - Hycor
DAO	Diamine Oxydase (DAO) - activité - sérum
ECP	ECP - Eosinophil Cationic Protein
FERM	Maladie du poumon de fermier - dépistage - sérum
FERMC	Maladie du poumon de fermier - confirmation - sérum
HISTP	Histamine
IGE	IgE totales - sérum
IGEL	IgE totales - larmes
IGEMH	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Hycor
IGEMP	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia
IGESL	IgE spécifiques : latex - allergène unique
IGESM	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia
IGESV	IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique
MA	IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum
MM	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes - sérum
MP	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum
MR	IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes
MT	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum
OIS	Maladie du poumon d'éleveur d'oiseaux - dépistage - sérum
PDEP	Sérologie diagnostic Alvéolite Allergique Extrinsèque - dépistage - sérum
PHA	IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
PHABB	IgE spécifiques - dépistage allergènes respiratoires et alimentaires -Phadiatop® nourrisson
POBO	Sérodiagnostic du Poumon du boulanger (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum
POCH	Sérodiagnostic du Poumon des champignonnistes (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum
PODO	Sérodiagnostic du Poumon domestique (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum
POFR	Sérodiagnostic du Poumon des fromagers (Alvéolite Allergique Extrinsèque) - dépistage - sérum
RAM4	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
RG41	IgG4 spécifiques - sérum
RGG1	IgG spécifiques - sérum
TAB	Basophiles - test d'activation - sang total
TROA	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® adulte - fx5/fx24/fx25
TROE	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® enfant - fx26/fx27/fx28
TRYPT	Tryptase - sérum

Biochimie

100PL	Protéine S100 - LCR
17HSA	17 OH progestérone - salive
17OHP	17 Hydroxy Progestérone - sérum
17PRE	17 Hydroxy Prénégénolone - sérum
21DF	21 Désoxycortisol - sérum
21OHA	Anticorps anti-21 Hydroxylase - sérum
5NUC	5' Nucléotidase - activité - sérum
7DCHO	7 Déhydrocholestérol
A1TRS	Alpha-1 Antitrypsine - selles - selles
A2PLA	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
ACBI	Acides biliaires - sérum
ACTH	ACTH - Corticotrophine
ACTHM	ACTH - Corticotrophine - matin
ACTHS	ACTH - Corticotrophine - soir
ADAD	Adénosine Désaminase - ADA
ADH	ADH - Hormone antidiurétique
ADHU	ADH - Hormone antidiurétique - urine
ADIPO	Adiponectine - sérum
ADOLA	Aldolase - sérum
AFP	AFP - Alpha foetoprotéine - sérum
AFPD	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide divers
ALB	Albumine
ALBD	Albumine - liquide de ponction
ALBPL	Albumine - LCR
ALDO	Aldostérone
ALDOC	Aldostérone - couché
ALDOD	Aldostérone - debout ou assis

Biochimie

ALDOU	Aldostérone - urines
ALFA1	Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum
ALFA2	Alpha-2 Macroglobuline - sérum
ALFMU	Alpha-1 Microglobuline - urines
ALPHA	Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH - sérum
AMH	AMH - Hormone anti-Mullérienne - sérum
AMHE	AMH - Hormone anti-Mullérienne - Enfant - sérum
AMMO	Ammoniémie - plasma
AMY	Amylase - sérum
AMYD	Amylase - liquide de ponction
AMYU	Amylase - urines
ANGIO	Angiotensine II - plasma
APEBM	Apolipoprotéine E - génotypage
APOA	Apolipoprotéine A1 - sérum
APOB	Apolipoprotéine B - sérum
APOC3	Apolipoprotéine C3 - sérum
B2M	Bêta 2 Microglobuline - sérum
B2MLC	Bêta 2 Microglobuline - LCR
B2MU	Bêta 2 Microglobuline - Urines
B2TRA	Bêta 2 Transferrine
BDEF2	Bêta-défensine 2 - selles
BGAL	Bêta Galactosidase - sang total
BHCG	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
BHCGD	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - prélèvements divers
BILI	Bilirubine - totale - libre - conjuguée - sérum
BILIT	Bilirubine totale - sérum
BIOSP	Biochimie séminale - plasma séminal
BIOTI	Biotinidase - sérum
BJ	Bence Jones - recherche
BNP	BNP - Brain Natriuretic Peptide - plasma
C125D	Antigène CA 125 - liquide de ponction
C153D	Antigène CA 15-3 - liquide de ponction
C199D	Antigène CA 19-9 - liquide de ponction
C724D	Antigène CA 72-4 - liquide de ponction
CA125	Antigène CA 125 - sérum
CA153	Antigène CA 15-3 - sérum
CA199	Antigène CA 19-9 - sérum
CA50	Antigène CA 50 - sérum
CA724	Antigène CA 72-4 - sérum
CAIO	Calcium ionisé
CALCD	Calcitonine - liquide de ponction
CALCI	Calcitonine - sérum
CAR	CAR - index - Salive
CBG	CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum
CDT	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
CDTC	Transferrine Carboxy déficiente - contrôle - technique alternative - sérum
CDTHN	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
CEA	ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - sérum
CEAD	ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - liquide de ponction
CER	Céroléoplasmine - sérum
CHOLI	Cholinestérase - activité enzymatique - sérum
CHRA	Chromogranine A
CK	CPK - Créatine phosphokinase totale - sérum
CKMB	CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum
CLALF	Alpha-1 Antitrypsine - clairance
CLCRE	Créatinine - clairance
COMPS	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
COR	Cortisol - Composé F - sérum
CORS	Cortisol - Composé F - soir - sérum
CORSA	Cortisol - Composé F - salive
CORSM	Cortisol - Composé F - matin - salive
CORSS	Cortisol - Composé F - soir - salive
CORTI	Cortisone - Composé E - plasma
CORTU	Cortisone - Composé E - urines
COS	Corticostérone - Composé B - sérum
COSAT	Fer - coefficient de saturation - sérum
CPEP	Peptide C - sérum
CPEPU	Peptide C - Urines

Biochimie

CROSS	Cross-laps
CROSU	Cross-laps - urines
CRP	CRP - Protéine C Réactive - sérum
CRPUS	CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
CRU24	Créatinine avec diurèse - urines
CTST	Fer - capacité totale de fixation - sérum
CUSH	Panel syndrome de Cushing - Recherche syndrome de Cushing
CYF	Antigène Cyfra 21-1 - sérum
CYFD	Antigène Cyfra 21-1 - liquide de ponction
CYS	Cystatine C - sérum
D4	D4A - Delta 4 androstènedione - sérum
DENSU	Densité - urines
DHA	DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum
DHASA	DHEA - Déhydroépiandrostérone - salive
DHT	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
DOC	11 Désoxycorticostérone - sérum
E1CH	Estrone - sérum
E2EH	Estradiol - homme/enfant - sérum
E2F	Estradiol - femme - sérum
E2SA	Estradiol - salive
ECA	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - sérum
ECAD	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - LBA
ECAPL	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine
EIF	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
ELASS	Elastase - selles
EPLCR	Focalisation isoélectrique - LCR + sérum
EPPRO	Electrophorèse des protéines - sérum
EPROU	Electrophorèse des protéines - urines
ERBB2	HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - Protéine c-erbB-2 - sérum
ERY	Erythropoïétine - sérum
FBRON	Fibronectine
FE	Fer - sérum
FEU	Fer - urines
FGF23	FGF 23 - Fibroblast Growth Factor 23 - Plasma
FIACC	Fibrotect - Actitest - Fibrotect remboursé/ Actitest HN - sérum
FIACT	Fibrotect - Actitest - non remboursé - sérum
FIB3	Fibromètre - Hors nomenclature - score de fibrose, cirromètre et inflamètre
FIBI	Fibromètre - remboursé - score de fibrose, cirromètre et inflamètre
FIBRO	Fibrotect - remboursé - sérum
FIMAC	FIBROMAX - remboursé - sérum
FIMAX	FIBROMAX - non remboursé - sérum
FLU	Cortisol libre - Composé F - urines
FRUC	Fructosamine - sérum
FRUSP	Fructose - plasma séminal
FSH	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
FSHU	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
FT	Ferritine - sérum
FT3	T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum
FT4	T4 libre - Thyroxine libre - sérum
FTE	Ferritine érythrocytaire
FTGLY	Ferritine glycosylée - sérum
FVCTE	Fibromètre VCTE (avec FibroScan)
G6PD	G6PD - Glucose-6 phosphate déshydrogénase
GAA	Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard
GADIO	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
GAST	Gastrine - sérum
GH	GH - Hormone de croissance - sérum
GHREL	Ghréline - acylée et non acylée - plasma
GHRH	GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma
GLUC	Glucagon - plasma
GLUPS	Glutathion peroxydase - plasma
GLYD	Glucose - liquide biologique
GRAS	Acides gras libres non estérifiés - sérum
HAP	Haptoglobine - sérum
HCGD	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - liquide biologique
HCGT	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum
HDL	Cholestérol HDL - sérum
HE4	HE4 - Calcul ROMA - sérum

Biochimie

HEMOP	Hémopexine - sérum
HIRSU	Panel stéroïdes - Exploration d'un hirsutisme
HOMA	HOMA - index - sérum
ICK	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
IFS	Immunofixation - sérum
IGAS	IgA - immunoglobulines A sécrétoires - selles
IGF2	IGF-2 - sérum
IGFBP	IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum
ILDH	LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes
INHIA	Inhibine A - ultra sensible - sérum
INHIB	Inhibine B
INHIE	Inhibine B - Enfant - sérum
INS	Insuline - sérum
IONSP	Ionogramme fécal - selles
IPAL	Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum
LDH	LDH - Lactate-déshydrogénase - sérum
LDHD	LDH - Lactate-déshydrogénase
LDL	Cholestérol LDL direct - sérum
LEP	Leptine - sérum
LGB3	Lyso-Gb3
LH	LH - Hormone Lutéostimulante - sérum
LHU	LH - Hormone Lutéostimulante - urines
LIPA	Lipase - sérum
LIPAD	Lipase - liquide de ponction
LIPAU	Lipase - urines
LPA	Lipoprotéine Lp-a - sérum
LYSO	Lysozyme - sérum
MALB	Microalbumine - urines
MELAS	Mélatonine - plasma
MELAU	Mélatonine - urines
MELSA	Mélatonine - salive
MELT3	Mélatonine - 3 temps - urines
METHB	Méthémoglobine - sang total
MG	Magnésium - sérum
MGE	Magnésium érythrocytaire - Sang total
MGU	Magnésium - urines
MYOG	Myoglobine - sérum
MYOGU	Myoglobine - urines
NASHT	NASH-FibroTest - sérum
NEOP	Néoptérine - plasma
NEOPL	Néoptérine - LCR
NEOPU	Néoptérine - urines
NSE	NSE - Neuron Specific Enolase - sérum
NSED	NSE - Neuron Specific Enolase - liquide biologique
NTX	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
ORO	Orosomucoïde - sérum
OSM	Osmolarité - sérum
OSMU	Osmolarité - urines
OSTEO	Ostéocalcine - sérum
OX	Oxyde de carbone - sang total
P	Phosphore - sérum
P1NP	P1NP - Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total - sérum
P3P	Procollagène type III - sérum
PAL	Phosphatases alcalines - sérum
PALO	Phosphatases alcalines osseuses
PAOXS	Pouvoir antioxydant - plasma
PAT	Phosphatases acides totales - sérum
PCT	Procalcitonine
PELAS	Pouvoir anti-élastasique - sérum
PG	Progestérone - sérum
PGSA	Progestérone - salive
PKE	Pyruvate kinase érythrocytaire - sang total
PLIP	Phospholipides - sérum
PPA	Polypeptide pancréatique - Sérum
PPHEM	Profil protéique hémolytique - sérum
PPIMM	Profil protéique immunitaire sans électrophorèse - sérum
PPINF	Profil protéique inflammatoire - sérum
PPN	Profil protéique nutritionnel - sérum

Biochimie

PPO	Profil protéique d'orientation sans électrophorèse - sérum
PRBNP	NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum
PREAL	Préalbumine - sérum
PREG	Prégnénolone - sérum
PRGRP	Peptide libérant la pro-gastrine (ProGRP)
PRINS	Proinsuline - sérum
PRLCH	Prolactine - formes moléculaires - sérum
PROL	Prolactine - sérum
PROT	Protéines - dosage - sérum
PROTD	Protéines - liquide biologique
PRPSA	[2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
PRU24	Protéines - dosage - urines
PS100	Protéine S100 - sérum
PSA	PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum
PSAD	PSA - Antigène spécifique prostatique total - liquide de ponction
PSALI	PSA - Antigène spécifique prostatique libre - sérum
PTAU	Protéines TAU - Amyloïde - LCR
PTH	PTH - Parathormone intacte - sérum
PTHHD	PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction
PTHHP	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma
PU24	Phosphore - urines
RBP	Retinol Binding Protein - RBP
REN	Rénine active
RENC	Rénine active - couché
REND	Rénine active - debout
RSTR	Récepteur soluble de la Transferrine - sérum
SAA	Sérum Amyloïde A Protéine - SAA - sérum
SCC	Antigène SCC - TA4 - sérum
SCCD	Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction
SDHA	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
SDHSA	Sulfate de DHEA salivaire - salive
SEROT	Sérotinine - sang total
SGP	Hémoglobine - recherche - selles
SIDER	Transferrine - sérum
SOD	Superoxyde dismutase - SOD
SOMAT	Somatostatine - plasma
SOMC	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
SOPK	Panel stéroïdes - Recherche d'un syndrome des ovaires polykystiques
SPRE	Sulfate de prégnénolone - sérum
STERB	Panel stéroïdes - Recherche d'un trouble de la biosynthèse des stéroïdes - sérum
STERS	Panel stéroïdes - Exploration de la fonction gonadique - sérum
T3RE	T3 - Triiodothyronine reverse
T3TOT	T3 totale - Triiodothyronine totale - sérum
T3U	T3 - Triiodothyronine - urines
T4TOT	T4 totale - Thyroxine totale - sérum
T4U	T4 - Thyroxine - urines
TBEF	Testostérone biodisponible - femme/enfant - sérum
TBG	Thyroxine Binding globuline - TBG - sérum
TBH	Testostérone biodisponible - sérum
TEBG	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
TEF	Testostérone - femme/enfant - sérum
TESSA	Testostérone - salive
TH	Testostérone - homme - sérum
THIOL	Thiols - plasma
THYRD	Thyroglobuline - liquide biologique
THYRO	Thyroglobuline - sérum
TLI	Testostérone libre - Sérum
TROPI	Troponine Ic HS
TRP	Phosphore - taux de réabsorption tubulaire
TSH	TSH - Hormone Thyro Stimulante - 3ème génération - sérum
URIC	Acide urique - sérum
URID	Acide urique - liquide biologique
URIU	Acide urique
VIP	VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma
WBP14	Protéine 14.3.3 - LCR
ZONUL	Zonuline - selles

Biologie de la reproduction - Assistance Médicale à la Procréation (AMP)

Biologie de la reproduction - Assistance Médicale à la Procréation (AMP)

FRASP	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
SPACD	Anticorps anti-spermatozoïdes - recherche indirecte
SPCG	Spermocytogramme

Biologie des tumeurs solides

BRCAS	Mutations BRCA1 et BRCA2 somatiques
EGFRS	Recherche de la mutation T790M du gène EGFR - Sang périphérique prélevé sur tube Cell Free DNA : Ambient ou Aliquots de plasma : Congelé
MGMT	Méthylation MGMT
MLH1	Méthylation MLH1 isolée
PIK3	Mutation PIK3CA isolée (Sanger)
RNATS	Panel NGS - RNASeq - Tumeurs solides

Biologie moléculaire

RMGEN	Mycoplasma genitalium Recherche de mutations associées à la résistance aux macrolides
-------	---

Biologie préventive

25DJ	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
AAFEM	Juvenalis - Panel - AgeCheck - femme
AAMAS	Juvenalis - Panel - AgeCheck - homme
ALBJ	Juvenalis - Albumine - sérum
ALUJ	Juvenalis - Aluminium
APOAJ	Juvenalis - Apolipoprotéines A1 - sérum
APOBJ	Juvenalis - Apolipoprotéines B - sérum
BASIC	Juvenalis - Panel - BasicCheck
BDEFJ	Juvenalis- Béta-défensine 2 - selles
CALPJ	Juvenalis - calprotectine - selles
CANDJ	Juvenalis - Candida albicans - sérologie dépistage - sérum
CARJ	Juvenalis - CAR - index - Salive
CRPUJ	Juvenalis - CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
CUJ	Juvenalis - Cuivre
DAOJ	Juvenalis - DAO - activité - sérum
DERMA	Juvenalis - Panel - DermaCheck
DIGES	Juvenalis - Panel - DigestCheck
ELASJ	Juvenalis Elastase - selles
F1GJ	Juvenalis - IgG - blanc d'oeuf - sérum
F78GJ	Juvenalis - IgG - caséine - sérum
F79GJ	Juvenalis - IgG - gluten - sérum
FERTF	Juvenalis - Panel - FertiCheck - femme
FERTH	Juvenalis - Panel - FertiCheck - homme
FOLEJ	Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total
FT3J	Juvenalis - T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum
GRAEJ	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
HBA1J	Juvenalis - Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total
HISTJ	Juvenalis - Histamine - plasma
HOCYJ	Juvenalis - Homocystéine - plasma
HOMAJ	Juvenalis - HOMA - index
IGASJ	Juvenalis - IgA - immunoglobulines A - selles
IL1AJ	Juvenalis - Interleukine IL-1 alpha - sérum
IL1BJ	Juvenalis - Interleukine IL-1 bêta - sérum
IL6J	Juvenalis - Interleukine IL-6 - sérum
IODUJ	Juvenalis - Iode - urines
JBLOT	Juvenalis - Microbiote intestinal - Selles
LDLOJ	Juvenalis - LDL oxydés - sérum
LPAJ	Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum
MGJ	Juvenalis - Magnésium - sérum
MINER	Juvenalis - Panel Minéraux
MINI	Juvenalis - Panel - MiniCheck
NUTRI	Juvenalis - Panel - NutriCheck
OXYC	Juvenalis - Panel - OxyCheck
PREAJ	Juvenalis - Préalbumine - sérum
Q10J	Juvenalis - Coenzyme Q10 - CoQ10
SDHAJ	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrosterone - sérum
SEJ	Juvenalis - Sélénium
SOMCJ	Juvenalis - IGF-1 - Somatomedine C - sérum
SPREJ	Juvenalis - Sulfate de prégnénone - sérum
T3REJ	Juvenalis - T3 - Triiodothyronine reverse - sérum
TBJ	Juvenalis - Testostérone biodisponible - sérum
TNFJ	Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum

Biologie préventive

TSHJ	Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
VB1SJ	Juvenalis - Vitamine B1 - Thiamine
VB2J	Juvenalis - Vitamine B2 - Riboflavine
VB6SJ	Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
VCPJ	Juvenalis - Vitamine C - acide ascorbique
VEGAN	Juvenalis - Panel - VeggieCheck
VEJ	Juvenalis - Vitamine E - Tocophérol - Plasma
VITAM	Juvenalis - Panel Vitamines
VPPJ	Juvenalis - Vitamine PP - Niacine
ZNJ	Juvenalis - Zinc
ZONUJ	Juvenalis - Zonuline - selles

Chimie analytique

125D	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
25D	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
3HBPY	3 Hydroxy benzo[a]pyrène - métabolite benzo[a]pyrène - urines
5FUU	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
5PYRO	5 Hydroxy, N-méthylpyrrolidone - urines
AALCR	Acides aminés - chromatographie - LCR
AARGI	Acide arginosuccinique - plasma
AARGU	Acide arginosuccinique - urines
AAS	Acides aminés - chromatographie
AAU	Acides aminés - chromatographie - urine
ABACA	Abacavir - plasma
ACBCH	Acides biliaires - chromatographie - sérum
ACDMB	2,5 - 3,4 - 2,4 Acides diméthylbenzoïques - urines
ACEBS	Acebutolol - sérum
ACEP	Acépromazine - sérum
ACETO	Acétone - sang total
ACETU	Acétone - médecine du travail - urines
ACICL	Aciclovir - plasma
ACTPM	Thiopurine S-Méthyltransférase - activité
ACYLC	Acylcarnitine - profil - plasma
ACYLU	Acylcarnitine - profil - urines
ADEF	Adéfovir - plasma
AH	Acide hippurique - urines
ALAU	Acide delta aminolévulinique - urines
ALCOL	Alcool éthylique - sérum
ALGAL	Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard
ALIM	Alimémazine - Sérum
ALPR	Alprazolam - Sérum
ALPRU	Alprazolam - urines
ALU	Aluminium
ALUO	Aluminium - eau - environnement - hygiène hospitalière - eau - Hygiène
ALUU	Aluminium - urines
AMCIT	Acide méthylcitrique - urines
AMI	Amikacine - sérum
AMIO	Amiodarone - sérum
AMISU	Amisulpride - Sérum
AMIT	Amitriptyline - Sérum
AMOS	Amoxapine - Sérum
AMOX	Amoxicilline - Sérum
AMPHC	Amphétamines - confirmation - urines
AMPHD	Amphétamines - liquide gastrique
AMPHO	Amphotéricine B - Sérum
AMPHS	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
AMPHU	Amphétamines - dépistage - urines
AMPRE	Amprénavir - Sérum
ANTIP	Antimoine - plasma
ANTIU	Antimoine - urines
ANTU	Antidépresseurs - recherche - identification - dosage - urines
APHYT	Acide phytanique - plasma
APRIS	Acide pristanique - Plasma
APYR	Acide pyruvique - Surnageant de défécate ou LCR
ARCH	Arsenic - cheveux
ARGD	Argent - liquide biologique
ARGS	Argent - plasma
ARIPI	Aripiprazole

Chimie analytique

ASD	Arsenic - liquide biologique
ASPL	Arsenic - Plasma
ATAZ	Atazanavir - Sérum
AVK	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
AVLO	Propranolol - Sérum
B12	Vitamine B12 - sérum
BACL	Baclofène - Sérum
BARBU	Barbituriques - urines
BARSG	Baryum - plasma
BARU	Baryum - urines
BCARO	Bêta carotène
BENIU	Benzodiazépines - identification - urines
BENZC	Benzodiazépines - recherche et identification - Sérum
BENZE	Benzène - sang total
BENZS	Benzodiazépines - recherche sans identification - sérum
BENZU	Benzodiazépines - recherche sans identification - urines
BERYS	Béryllium
BERYU	Béryllium - urines
BGLUC	Béta glucosidase - Tâches de sang EDTA sur buvard
BICTE	Bictégravir - sérum
BIPE	Bipéridène - sérum
BISM	Bismuth - sang total
BISMS	Bismuth - sérum
BISMU	Bismuth - urines
BISO	Bisoprolol - sérum
BORES	Bore - plasma
BOREU	Bore - urines
BRIVA	Brivaracétam - Sérum
BROMA	Bromazépam - Sérum
BROMS	Brome - plasma
BROMU	Brome - urines
BTXU	Acide butoxyacétique - urines
BUFLO	Buflomédil - sérum
BUPIV	Bupivacaïne - Sérum
BUPS	Buprénorphine - Sérum
BUPU	Buprénorphine et métabolites - urines
BZU	Benzène - urines
CABOT	CABOTEGRAVIR
CAF	Caféine - Sérum
CAL	Calcul Urinaire - analyse morphologique et infrarouge
CALD	Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge
CALP	Calprotectine fécale - selles
CAN	Cannabis - urines
CANC	Cannabis - confirmation - urines
CANCH	Cannabis - cheveux
CANS	Cannabis confirmation - dosage sanguin
CARB	Carbamazépine - sérum
CARNU	Carnitine libre et totale - urines
CAROT	Caroténoïdes
CARPI	Carpipramine - Sérum
CARTL	Carnitine libre et totale - plasma
CATEN	Catécholamines libres - enfant - urines
CATF	Catécholamines libres
CATU	Catécholamines - libres - Urines
CD	Cadmium - Sang total
CDG	CDG Syndrome - recherche - sérum
CDU	Cadmium - urines
CEFA	Céfazoline - Sérum
CEFEP	Céfépime - sérum
CEFO	Cefotaxime - Sérum
CEFTA	Ceftazidime - Sérum
CEFTL	Ceftriaxone - LCR
CEFTR	Ceftriaxone - Sérum
CELIP	Celiprolol - sérum
CETO	Corps cétoniques - Surnageant de défécats sanguin ou LCR
CHISP	Examen chimique - selles
CHITO	Chitotriosidase - activité - plasma
CHLOQ	Chloroquine - Sérum

Chimie analytique

CHLOR	Trichlorométhane - sang total
CHOST	Cholestanol - plasma
CHYMS	Chymotrypsine
CIBEN	Cibenzoline - Sérum
CICLO	Ciclosporine
CIPRO	Ciprofloxacine - Sérum
CISPL	Cisplatine - sérum
CIT	Acide citrique - sérum
CITA	Citalopram - sérum
CITRP	Citrulline
CITSP	Acide citrique - plasma séminal
CITU	Acide citrique - Urines
CLEAU	Eau libre - clairance
CLIND	Clindamycine - Sérum
CLOB	Clobazam - Sérum
CLOMI	Clomipramine - Sérum
CLON	Clonazépam - Sérum
CLORA	Clorazébate - Sérum
CLOXA	Cloxacilline - Sérum
CLOZA	Clozapine
COBIC	Cobicistat - plasma
COC	Cocaïne - dépistage - urines
COCC	Cocaïne - confirmation - urines
COCS	Cocaïne confirmation - dosage sanguin
COLIS	Colistine - Sérum
COLS	Colchicine - Sérum
COLZP	Clotiazépam - sérum
COST	Cobalt
COTI	Cotinine - urines
COU	Cobalt - urines
CPHEN	Chlorophénol - urines
CRESO	O-Crésol - urines
CRETO	Créatorrhée - dosage de l'azote fécal - selles
CRST	Chrome
CRU	Chrome - urines
CU	Cuivre
CUEC	Cuivre - échangeable/libre
CUU	Cuivre - urines
CYAN	Thiocyanates - ion - urines
CYANP	Thiocyanates - ion - Sérum
CYSER	Cyclosérine - Sérum
CYSTU	Cystine - urine
DARU	Darunavir - Sérum
DCM	Dichlorométhane - sang total
DCMU	Dichlorométhane - urines
DIAZ	Diazépam + Desméthyl Diazépam - Sérum
DIBE	Dibécacine - Sérum
DIGO	Digoxine - sérum
DILTI	Diltiazem - sérum
DIPYR	Dipyridamole - Sérum
DISO	Disopyramide - sérum
DOLUT	Dolutégravir - Sérum
DORAV	Doravirine
DOSUL	Dosulépine - Sérum
DOXEP	Doxépine - Sérum
DOXY	Doxycycline - Sérum
DROGU	Drogues - recherche - urines
DROPE	Dropéridol - sérum
DULO	Duloxétine - sérum
EFAV	Efavirenz - plasma
EGLY	Ethylène glycol - sérum
ELVET	Elvitegravir - Sérum
EMTRI	Emtricitabine - plasma
ENTKV	Entecavir - plasma
ESCIT	Escitalopram - sérum
ESTAZ	Estazolam - Sérum
ETAIN	Etain
ETAIU	Etain - urines

Chimie analytique

ETGLU	Ethylglucuronide - urines
ETHM	Ethambutol - Sérum
ETHO	Ethosuximide - sérum
ETHOU	Acide éthoxyacétique - urines
ETHU	Alcool éthylique
ETRAV	Etravirine - plasma
EVERO	Évérolimus
FECAP	Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles
FELB	Felbamate - Sérum
FK506	Tacrolimus - FK506
FLECA	Flécaïnide - sérum
FLUCO	Fluconazole - Sérum
FLUCY	Flucytosine - Sérum
FLUIN	Anticoagulants oraux : Fluindione - Sérum
FLUNI	Flunitrazépam - sérum
FLUO	Fluor - Sérum
FLUOU	Fluor - urines
FLUOX	Fluoxétine - sérum
FLUP	Fluphénazine - Sérum
FLUPE	Flupentixol - Sérum
FLUVO	Fluvoxamine - sérum
FORM	Acide formique - urines
FOSAM	Fosampnénavir - Sérum
FOSFO	Fosfomycine - Sérum
FUROS	Furosémide - sérum
FUROU	Furosémide - urines
GAB	Gabapentine - sérum
GANCI	Ganciclovir - plasma
GENT	Gentamicine - sérum
GHBS	GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - plasma
GHBU	GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - urines
GLC4	Tétragluucose - urines
GLIBE	Glibenclamide - sérum
GLYCI	Glycine - plasma
GLYCU.	Acide glycolique - urines
GLYOL	Glycérol - sérum
GLYPH	Glyphosate - recherche et dosage - plasma
GLYPS	Glyphosate - recherche et dosage - sang total
GLYPU	Glyphosate - recherche et dosage - urines
GRALC	Acides gras à très longues chaînes - C22 à C26 - plasma
GRASE	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
GUANI	Guanidinoacétate et créatine - plasma
GUANU	Guanidinoacétate et créatine - urines
HALO	Halopéridol
HCHLO	Hydroxychloroquine - sang total
HEXA	2,5 Hexanedione - urines
HEXAU	Cyclohexanol - urines
HGCH	Mercure - cheveux
HGD	Mercure - liquide biologique
HGS	Mercure - salive
HGST	Mercure - sang total
HGU	Mercure - urines
HIA	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines
HOMO	Acide homogentisique - urines
HOPY	1 Hydroxypyrrène - urines
HQUIN	Hydroquinidine - Sérum
HVA	Acide homovanillique - Urine
HXANT	Hypoxanthine - urines
HYALP	Acide hyaluronique - liquide pleural
HYALS	Acide hyaluronique - sérum
HYDAA	Hydrolases acides - activité - sérum
HYDRO	Hydroxyzine - Sérum
IBU	Ibuprofène - Sérum
ILEU	Isoleucine - plasma
IMAT	Imatinib - Plasma
IMIP	Imipramine - Sérum
INDI	Indinavir - Sérum
INH	INH - Isoniazide - Sérum

Chimie analytique

IOD	Iode - sérum
IODU	Iode - urines
ISAV	Isavuconazole - Sérum
ITRA	Itraconazole et métabolite hydroxylé - Sérum
IVAG	Isovaleryl glycine - urines
KEP	Lévétiracetam - sérum
KET	Kétoprofène - Sérum
KETAS	Kétamine - Sérum
KETAU	Kétamine - urines
KETO	Ketoconazole - Sérum
LACLC	Acide lactique - LCR
LACT	Acide lactique
LAMIV	Lamivudine - plasma
LAMO	Lamotrigine - sérum
LARG	Chlorpromazine - Sérum
LCAR	L-carnitine - plasma séminal
LCAT	Lécithine cholestérol acyl transférase - sérum
LEVO	Lévomépromazine - Sérum
LEVOX	Levofloxacin - Sérum
LI	Lithium - sérum
LIBX	Chlordiazépoxide - Sérum
LIDO	Lidocaïne - Sérum
LIE	Lithium érythrocytaire - sang total
LOFLA	Loflazépaté d'Ethyl
LOPI	Lopinavir - Sérum
LOPRA	Loprazolam - Sérum
LORAZ	Lorazépam - Sérum
LORME	Lormetazépam - Sérum
LOXAP	Loxapine - Sérum
LSDC	LSD - Diéthylamide acide lysergique - urines
LSDD	LSD - Diéthylamide acide lysergique - liquide biologique
LSDS	LSD - Diéthylamide acide lysergique
MAH	Acide méthylhippurique - urines
MALON	Acide méthylmalonique
MALOU	Acide méthylmalonique - urines
MAND	Acide mandélique - urines
MAPRH	Maprotiline - Sérum
MARA	Maraviroc - Sérum
MASU	Arsenic - inorganique et métabolites - urines
MDA	Dialdéhyde malonique - plasma
MECET	Méthyléthylcétone - urines
MEPI	Mépivacaïne - sérum
MEPRO	Méthoxy 1 propanol 2 - 2PG1ME - urines
MEPS	Méprobamate - Sérum
MEPU	Méprobamate - urines
METDI	4-4' Méthylènedianiline - urines
METFD	Metformine - liquide biologique
METFE	Metformine érythrocytaire - sang total
METFO	Metformine - Sérum
METH	Alcool méthylique - Sérum
METHI	Méthionine
METHO	Méthotrexate - Sérum
METHU	Alcool méthylique - urines
METS	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
MEVAL	Acide mévalonique - urines
MIAN	Miansérine - Sérum
MIBK	Méthylisobutylcétone - urines
MICRS	Examen microscopique direct - selles
MIDAZ	Midazolam - Sérum
MILNA	Milnacipran - Sérum
MINO	Minocycline - Sérum
MIRTA	Mirtazapine - sérum
MITH	Mitotane - plasma
MN	Manganèse - Sérum
MNST	Manganèse - Sang total
MNU	Manganèse - urines
MOCL	Moclobémide - Sérum
MOLYP	Molybdène - plasma

Chimie analytique

MOLYU	Molybdène - urines
MOXIF	Moxifloxacine - Sérum
MPHEN	Mycophénolate - plasma
MPSU	Mucopolysaccharides - urines
MQUAL	Méthqualone - Sérum
MTAEN	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Méтанéphrines libres - enfant - urines
MTANU	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Méтанéphrines libres - Urines
MTD	Méthadone - dépistage - urines
MTDS	Méthadone et EDDP - Sérum
MTPRO	Métoprolol - Sérum
MUCOU	Acide trans muconique - t,t-MA - urines
NAPHT	Naphtols (alpha et béta) - urines
NARO	Naropeine - sérum
NESDO	Nesdonal - Sérum
NEVI	Névrapine - plasma
NI	Nickel - Sérum
NIAPR	Niaprazine - sérum
NID	Nickel - liquide biologique
NITRA	Nitrazépam - Sérum
NIU	Nickel - urines
NMAC	N -méthylacétamide - urines
NMF	N- Méthylformamide - urines
NORDA	Nordazépam - Sérum
OFLO	Ofloxacine - Sérum
OLAN	Olanzapine
OLIGU	Oligosaccharides - recherche - urines
OPI	Opiacés - dépistage - urines
OPIC	Opiacés - confirmation - urines
OPID	Opiacés - liquide biologique
OPIS	Opiacés confirmation - dosage sanguin
ORGU	Acides organiques - quantitatif - urine
OROU	Acide orotique - urines
OXA	Acide oxalique - sérum
OXAC	Oxacilline - Sérum
OXAU	Acide oxalique - urines
OXAZ	Oxazépam - Sérum
PANOL	Isopropanol - Sérum
PARAQ	Paraquat - Sérum
PAROX	Paroxétine - sérum
PARQU	Paraquat - urines
PBST	Plomb - sang total
PBU	Plomb - urines
PEFLO	Péfloxacin - Sérum
PERAM	Pérampanel - Sérum - PERAMPANEL
PERIZ	Périciazine - Sérum
PESTD	Pesticides - recherche et/ou dosage - liquide biologique
PESTS	Pesticides - recherche et/ou dosage
PESTU	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
PFAS	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
PHEAL	Phénylalanine
PHEAU	Phénylalanine - urine
PHEGU	Acide phénylglyoxylique - urines
PHEN	Phencyclidine - recherche - urines
PHENO	Phénobarbital - sérum
PHENS	Phencyclidine - Sérum
PHENU	Phénol - urines
PHENY	Phénytoïne - sérum
PHIAD	Phénothiazines - liquide de ponction
PHS	pH - selles
PHYSP	Examen physique - selles
PIMO	Pimozide - Sérum
PIPAM	Pipampérone - Sérum
PIPE	Pipéracilline - Sérum
PIPES	Acide pipécolique - plasma
PIPEU	Acide pipécolique - urines
PIPO	Pipothiazine - sérum
PLATU	Platine - urines
PMA	Acide S-Phénylmercapturique - urines

Chimie analytique

POE	Porphyrines érythrocytaires
PONAT	Ponatinib - Plasma
PORFU	Porphobilinogène - urines
POS	Porphyrines - selles
POSA	Posaconazole - Sérum
POU	Porphyrines - Urines
PRAZE	Prazépam - Sérum
PREGA	Prégabaline
PRIPH	Primidone - sérum
PROME	Prométhazine - sérum
PROPF	Propafénone - Sérum
PROPU	Dextropropoxyphène - urines
PTHIA	Phénothiazines - Sérum
PYRA	Pyrazinamide - Sérum
Q10	Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum
QUETA	Quétiapine
QUIN	Quinidine - Sérum
QUINI	Quinine - Sérum
RALTE	Raltégravir - Sérum
RDIU	Diurétiques - recherche et dosage - urines
RIBAV	Ribavirine - plasma
RIFA	Rifampicine - sérum
RIFAB	Rifabutine - Sérum
RILPI	Rilpivirine - plasma
RISPE	Rispéridone
RITAL	Méthylphénidate - Sérum
RITO	Ritonavir - Sérum
RUFIN	Rufinamide - Sérum
SABRI	Vigabatrin - Sérum
SAICA	Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines
SAQUI	Saquinavir - Sérum
SCRIB	Screening toxicologique - Sérum
SCRIU	Screening toxicologique - urines
SE	Sélénium
SERT	Sertraline - sérum
SEU	Sélénium - urines
SIALI	Acide sialique libre - urines
SILIC	Silicium - Plasma
SIRO	Sirolimus
SOTAL	Sotalol - sérum
STAVU	Stavudine - plasma
STEAT	Stéatorrhée - dosage des graisses - selles
STIRI	Stiripentol - Sérum
STRO	Strontium - sang total
STRYC	Strychnine - sang total
STRYU	Strychnine - urines
STYRE	Styrène - sang total
STYRU	Styrène - urines
SUCCI	Succinylacetone-Tyrosinémie de type I - urines
SUCSP	Sucres - recherche - selles
SULFA	Sulfatides - urines
SULPI	Sulpiride - Sérum
SULS	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
SULTI	Sultiame - Sérum
SULTO	Sultopride - Sérum
SULU	Sulfamides hypoglycémiants - urines
TCES	Trichloréthylène - sang total
TCHLS	Tétrachloréthylène - sang total
TCHLU	Tétrachloréthylène - urines
TCM	Tétrachlorométhane - sang total
TEI	Teicoplanine - sérum
TEMAZ	Témazépam - Sérum
TENO	Ténofovir - plasma
TER	Cyamémazine - Sérum
TETRA	Tétrazépam - Sérum
THALS	Thallium - plasma
THALU	Thallium - urines
THEO	Théophylline - sérum

Chimie analytique

THIO	Thioridazine - Sérum
TIAGA	Tiagabine - Sérum
TIAN	Tianeptine - sérum
TIAPR	Tiapride - Sérum
TIPRA	Tipranavir - Sérum
TITAD	Titane - liquide biologique
TITAN	Titane
TITAU	Titane - urines
TOB	Tobramycine - sérum
TOLS	Toluène - sang total
TOLU	Toluène - urines
TOPIR	Topiramate - sérum
TRAMA	Tramadol - Sérum
TRAZO	Trazodone - Sérum
TRIAZ	Triazolam - sérum
TRICU	Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines
TRICY	Antidépresseurs recherche - identification - sans dosage - Sérum
TRIHE	Trihéxyphénydyle - Sérum
TRILE	10 Hydroxy-Oxcarbapézine - sérum
TRIMI	Trimipramine - Sérum
TROPA	Lepticur - sérum
TRYPO	Tryptophane
TTCA	Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines
TYRBU	Succinylacetone-Tyrosinémie de type I - papier buvard
TYROS	Tyrosine
TYROU	Tyrosine - urine
VA	Vitamine A - Rétinol - Plasma
VALP	Acide valproïque - sérum
VANAU	Vanadium - urines
VANC	Vancomycine - sérum
VB1ST	Vitamine B1 - Thiamine
VB2	Vitamine B2 - Riboflavine
VB6ST	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
VB8	Vitamine B8 ou H - Biotine
VCP	Vitamine C - Acide ascorbique
VE	Vitamine E - Tocophérol - Plasma
VENLA	Venlafaxine - sérum
VERAP	Vérapamil - Sérum
VICTR	Bocéprévir - plasma
VILOX	Viloxazine - Sérum
VIMPA	Lacosamide - Vimpat - Sérum
VK	Vitamine K1 - Phylloquinone
VMA	Acide vanylmandélique - Urine
VORI	Voriconazole - Sérum
VORTI	Vortioxétine - Sérum
VPP	Vitamine PP - Niacine
WARFA	Anticoagulants oraux : Warfarine - Sérum
XANTU	Xanthine - urines
XYL	Xylose - sérum
XYLEN	Xylènes - sang total
XYLU	Xylènes - urines
ZIDO	Zidovudine - plasma
ZN	Zinc
ZNSP	Zinc - plasma séminal
ZNU	Zinc - urines
ZOLPI	Zolpidem - Sérum
ZONI	Zonisamide - Sérum
ZUCLO	Zuclopenthixol - Sérum

Cytogénétique

CLA	Caryotype constitutionnel - liquide amniotique - prénatal
CSF	Caryotype constitutionnel - sang foetal - prénatal
CSG	Caryotype constitutionnel - sang total - postnatal
CVCC	Caryotype constitutionnel - trophoblaste - prénatal
MOHC3	Fragilité chromosomique - anémie de FANCONI - recherche de cassures - sang total - postnatal

Dépistage T21 et biochimie foetale

21T	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
-----	---

Dépistage T21 et biochimie foetale

ACOLA	Acétylcholinestérase - liquide amniotique
AFP21	AFP : Marqueur sérique maternel - 2ème trimestre de la grossesse - Sérum
AFPLA	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide amniotique
E21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
P21	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
PECLA	Prééclampsie - Estimation du risque - sérum
TPREE	Pré-éclampsie - sFlt-1 et PIGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PIGF - sérum

Génétique

5FUTO	Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines génotypage de la dihydropyrimidine deshydrogénase et phénotypage de la DPD par le dosage d'uracile
A1BM	Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations p.Glu264Val et p.Glu342Lys)
ABCB1	ABCB1 gène : identification des variants rs2032583 et rs2235015 - sang total
ABLR	Mutation Domaine tyrosine kinase ABL
B27BM	HLA B27 - génotypage - sang total
B5701	HLA de classe I - Allèle B*5701 - sang total
BCR	BCR-ABL - gène - qualitatif
BCRQ	BCR-ABL - gène - quantitatif
BRAF	Gène BRAF - recherche de la mutation V600E de l'exon 15
CKIT	gène cKIT - exons 9, 11, 13, 17
CLONB	Clonalité B
CLONT	Clonalité T réarrangement clonal du TCR gamma
CNX26	Connexine 26 et 30 - Gène GJB2 et GJB6 - sang total
COLO1	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
COLO2	Panel NGS "COLO-RECTAL 2" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN.
CUR10	Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1
CXCR4	Mutation CXCR4 - Moëlle osseuse
DELY	Microdélétions du Chromosome Y - (régions AZFa, AZFb, AZFc) - sang total
DPNI	Ninolia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNc) - prénatal
DUP	Disomie uniparentale - DUP - sang total
DUPLA	Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - liquide amniotique - prénatal
DUPO	Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total - prénatal
DUPRE	Disomie uniparentale - DUP - prénatal
EGFR	EGFR mutation exon 18, 19, 20, 21
EODIG	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, SMAD4, STK11
EOETE	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-endocrine, poumon, peau
EONEN	Panel oncoaénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2, EPAS1, FH, GOT2, LZTR1, MAX, MDH2, MEN1, MERTK, MET, NF1, NF2, RET,
EOPAN	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A, EPCAM, MEN1, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, STK11, TP53, VHL
EOPEA	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R, MITF, NF1, PTCH1, PTCH2, POT1, TERT, TERF2IP, SUFU
EOPOU	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A, CHEK2, EGFR, ERBB2, MET, NBN, PRKN, RTEL1, STN1, TP53, VHL
EOREI	Panel oncoaénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B, MET, MITF, PBRM1, PTEN, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETD2, TMEM127, TSC1,
EOSOP	Panel oncoaénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1, EPCAM, HOXB13, MLH1, MSH2, MSH6, PALB2, PMS2, PTEN, RAD51C, RAD51D,
EPANC	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
EXMCC	Exome Malformations cardiaques congénitales
EXOC	Exome cardiogénétique
EXODI	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental syndromique
EXOI	Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans l'infertilité masculine
EXOME	Exome
EXONC	Exome Oncogénétique
EXONP	Exome Néphrologie
EXOPN	Exome Prénatal
EXSEQ	Exome avec interface d'interprétation
F2M	Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total
F5L	Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total
FISHM	Fish sur métaphases
FISHN	Fish sur noyaux interphasiques
FMF	Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage nouvelle génération - sang total
GILB	Syndrome de Gilbert - recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347)
GIST	Panel NGS "GIST" : KIT, PDGFRA, BRAF
GRHDF	Rhésus D - génotype foetal - prénatal
GRKF	Rhésus Kell - génotype foetal - sang total - prénatal
H63D	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total
HBBM	Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal
HLA1	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
HLA2	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
HMC	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total
HMCNR	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total
IGVH	Statut mutationnel Ig-VH
IL28B	Interleukine 28B (IL28B polymorphisme C/T rs 12979860) - génotypage - sang total

Génétique

JAK2	JAK2 - gène - mutation VAL617PHE (V617F) - sang total
LCT	Intolérance primaire au lactose - caractérisation génétique - sang total
MELA	Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT
MICSA	Instabilité microsatellitaire
MOHC2	Cytogénétique moléculaire hématologique - FISH
MOHC4	Réarrangements géniques, délétion, amplification dans les tumeurs solides - FISH oncologique
MOHC5	HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - statut - tumeurs du sein invasives - FISH
MTHF2	Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.1298A>C - Sang total
MTHFR	Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total
MUC1	MUC1 Néphropathie - sang total
MUCO	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - sang total
MUCOL	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - prénatal
MYD88	Mutation MYD88
MYS53	Gène TP53 - isolé
MYSBR	Gène BRAF - isolé
MYSB2	Panel NGS - NMP (Néoplasie MyéloProliférative) Diagnostic 2 : JAK2/CALR/MPL/CSF3R/SETBP1/SRSF2
MYSBG	Panel NGS - NMP (Néoplasie MyéloProliférative) Diagnostic-(DG) JAK2/CALR/MPL/CSF3R/SETBP1/SRSF2/SF3B1
MYSBP	Panel NGS "NMP - DP(Diagnostic/Pronostic)"
MYSKT	Gène CKIT - isolé
MYSLA	Panel LAM (Leucémie Aiguë Myéloblastique)
MYSMD	Panel NGS-SMD (Syndrome Myélodysplasique)
MYSMO	Panel NGS - LMMC (Leucémie MyéloMonocytaire Chronique)
NCDR	Recherche par QF-PCR des Aneuploïdies des chromosomes 13, 18, 21, X et Y - prénatal
PAM50	Test de signature moléculaire pour le pronostic du cancer du sein - Test PROSIGNA
PAN	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB4, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NOTCH1, NRAS, PDGFR alpha - exons 12, 14, 18
POUM1	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
POUM2	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2, FGFR3, KIT, KRAS, MAP2K1, MET, NRAS, PDGFRA, PIK3CA, PTEN, STK11, TP53
REINT	réinterprétation d'exome
S65C	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total
SNPFC	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
SNPOS	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
SNPRE	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
SNRPL	Angelman / Prader Willi - méthylation au locus SNRPN - prénatal
SNRPS	Angelman / Prader-Willi - méthylation au locus SNRPN - sang total
TPMT	Thiopurine S-méthyltransférase - génotypage - sang total
UGT1A	UGT1A1 : recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347) - impliqué dans le métabolisme de l'irinotécan
URMOL	Test moléculaire non invasif pour le suivi du cancer de la vessie (Test Xpert Bladder Cancer Monitor) - Urines
XFRA	X Fragile - syndrome - sang total
XFRAP	X Fragile - syndrome - prénatal
ZYGO	Zygotie - étude de la gémeauté - prénatal

Génétique moléculaire

SEPOS	Séquençage Ciblé - Postnatal
SEPRE	Séquençage Ciblé - Prénatal

Hématologie

ABAC	Anticorps immuns du système ABO - anti-A anti-B - dépistage et titrage - sérum
ACC	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
ADAM	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
AGF	Agglutinines froides - recherche - sang total
AGREG	Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel
ANT11	Anticorps anti-facteur XI - recherche - plasma
ANT12	Anticorps anti-facteur XII - recherche - plasma
ANT12	Anticorps anti-facteur II - recherche - plasma
ANT15	Anticorps anti-facteur V - recherche - plasma
ANT17	Anticorps anti-facteur VII - recherche - plasma
ANT18	Anticorps anti-facteur VIII - recherche - plasma
ANT19	Anticorps anti-facteur IX - recherche - plasma
APIX	Apixaban(Eliquis®) - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma
APLA	Activateur tissulaire du plasminogène - tPA - antigène - plasma
AT	Antithrombine - activité fonctionnelle - plasma
ATAG	Antithrombine - antigène - plasma
B1	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
BMGR	Groupes sanguins - génotypage - sang total
CD48	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
CD57	Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total
COOMD	Coombs direct érythrocytaire - sang total

Hématologie

CRYFB	Cryofibrinogène - recherche - plasma
CRYOI	Cryoglobulines - identification - Sérum
CRYOR	Cryoglobulines - recherche - Sérum
CSOLU	Complexes solubles
DABI	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
DDI	D-Dimères - plasma
EMA	Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total
EPHB	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
FAC10	Facteur X - Stuart - plasma
FAC11	Facteur XI - Rosenthal - plasma
FAC12	Facteur XII - Hageman - plasma
FAC13	Facteur XIII - plasma
FAC2	Facteur II - Prothrombine - activité - plasma
FAC5	Facteur V - Proaccélérine - plasma
FAC7	Facteur VII - Proconvertine - plasma
FAC8	Facteur VIII - anti-hémophilique A - plasma
FAC9	Facteur IX - anti-hémophilique B - plasma
FENO	Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total
FIBRI	Facteur I - Fibrinogène - activité - plasma
FOL	Acide folique sérique - sérum
FOLE	Acide folique érythrocytaire - sang total
FONDA	Activité anti-Xa : Fondaparinux - Arixtra - plasma
GAM	IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum
GPFOE	Génotypage plaquettaire foetal non invasif - Sang maternel
GPLAQ	Groupage plaquettaire - sang total
GRHC	RHc foetal - génotypage
GRHE	RH3(E) foetal - génotypage
GROUP	Groupage sanguin ABO - RH1(D)
HBA1C	Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total
HEPAR	Activité anti-Xa : héparine standard - HNF - plasma
HLAAC	Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum
HOCY	Homocystéine - plasma
HPN	Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total
IGA	IgA - immunoglobulines A - sérum
IGA12	IgA - immunoglobulines A - sous classes IgA1 et IgA2 - sérum
IGD	IgD - immunoglobulines D - sérum
IGG	IgG - immunoglobulines G - sérum
IGG1	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 1 - sérum
IGG2	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 2 - sérum
IGG3	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 3 - sérum
IGG4	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 4 - sérum
IGGPL	IgG - immunoglobulines G - LCR
IGM	IgM - immunoglobulines M - sérum
IMFIB	Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma
IPLAQ	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
K2	Phénotype érythrocytaire - antigène KEL2(k ou cellano) - sang total
KAPAL	Chaînes légères libres Kappa - sérum
KAPPU	Chaînes légères libres Kappa - urines
KIN	Kininogène de haut poids moléculaire - activité - plasma
KLEI	Hémorragie foeto-maternelle - sang total
LAMBL	Chaînes légères libres Lambda - sérum
LAMBU	Chaînes légères libres Lambda - urines
NK	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
ORG	Activité anti-Xa : Danaparoiide - Orgaran - plasma
PAI1	PAI1 - Inhibiteur de type 1 de l'activateur du plasminogène - plasma
PC	Protéine C - activité
PCAG	Protéine C - antigène - plasma
PDF	PDF - Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine - plasma
PF4	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
PLAS	Plasminogène - plasma
PREK	Prékallitréine - activité - plasma
PROAC	Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum
PS	Protéine S - activité
PSAG	Protéine S totale - antigène - plasma
PSLI	Protéine S libre - antigène - plasma
PT12	Fragment 1+2 - prothrombine - plasma
RAI	Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification
RH	Phénotype RH-KEL1 - Sang total

Hématologie

RIVA	Rivaroxaban - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma
RPC	Résistance à la protéine C activée
TCA	Temps de céphaline activé - TCA - plasma
TCAOP	Anticoagulant circulant - dépistage - plasma
TITD	Anticorps anti-érythrocytaires Anti-RH1 titrage et microtitrage - sang total
TKREA	Thymidine kinase - Sérum
TPA	TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum
TPH	Taux de Prothrombine - plasma
TT	Temps de thrombine
VASP	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
WIL	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
WILAG	Facteur Willebrand - antigène - plasma
XA	Activité anti-Xa : héparine de bas poids moléculaire - HBPM - plasma

Immunologie

AAN	Anticorps anti-nucléaires - sérum
ACERY	Anticorps anti-érythropoïétine - sérum
ACFIN	Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum
ACMYE	Anticorps anti-myéline - sérum
ACPIL	Anticorps anti-Neuropile - LCR
ACTC1	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral
ACTIT	Anticorps anti-actine - typage - sérum
ACTR	Anticorps anti-Tr(DNER) - sérum
ACTRL	Anticorps anti-Tr(DNER) - LCR
ADAL	Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps
ADNAC	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
AMPAR	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1, Caspr2, GABAB, mGluR1, mGluR5, GlycR1) - sérum
ANCA	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
ANIS	Anisakidose - IgE et IgG4 spécifiques - sérum
ANNEX	Anticorps anti-Annexine V - IgG - sérum
AP50	Temps d'hémolyse 50 - Complément voie alterne - sérum
ASCA	Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae - IgG/IgA - sérum
ASIAX	Anticorps anti-récepteur de l'asialoglycoprotéine - sérum
B27CF	HLA B27 - sang total
B2GPI	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum
B2GPM	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum
BEVA	Bevacizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
BP180	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Tvoaae (BPAa2/BP180, BPAa1/BP 230, desmooléine 1, desmooléine 3, Envoalakine et collagène de
C1Q	C1q - fraction du complément - sérum
C1QAC	Anticorps anti-C1q - sérum
C3ACT	Facteur B - fraction du complément - sérum
C3NEF	C3 NeF - Facteur néphritique - sérum
CALAC	Anticorps anti-canaux calciques - sérum
CAPO	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum
CARD	Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum
CARDM	Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum
CC2	C2 - fraction du complément - sérum
CC3	C3 - fraction du complément - sérum
CC4	C4 - fraction du complément - sérum
CC5	C5 - fraction du complément - sérum
CC7	C7 - fraction du complément - sérum
CC9	C9 - fraction du complément - sérum
CELPA	Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum
CERTO	Certolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
CH50	CH50 - Complément Hémolytique total
CIC	Complexes Immuns Circulants - CIC - sérum
CITRA	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
COLB2	Anticorps anti-collagène type II - sérum
CYTO	Anticorps anti-cytosol - LC1 - dépistage - sérum
CYTOC	Anticorps anti-cytosol - LC1 - confirmation - sérum
CYTPA	Panel Cytokine - IL1 bêta, IL2, IL4 et IL6 - sérum
ECT	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et titrage - sérum
EGF	Facteur de croissance épidermique (EGF) - sérum
ENDAE	Anticorps anti-endomysium IgA - enfant - sérum
ENDOA	Anticorps anti-endomysium - IgA - sérum
ENDOG	Anticorps anti-endomysium - IgG - sérum
ENDOT	Anticorps anti-cellules endothéliales - sérum
ETAN	Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

Immunologie

FACH	Facteur H - fraction du complément - sérum
FACI	Facteur I - fraction du complément - sérum
FARR	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
FR	Facteurs rhumatoïdes - sérum
FRA	Facteurs rhumatoïdes - IgA - sérum
GAD	Anticorps anti-GAD - sérum
GADPL	Anticorps anti-GAD - LCR
GLIAA	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
GLIAG	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
GM1	Anticorps anti-glycolipides - sérum
GM1PL	Anticorps anti-glycolipides - LCR
GOLIM	Golimumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
GPAC	Anticorps anti-GP 210 - sérum
GRAAC	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
HISAC	Anticorps anti-histones - sérum
HMGCR	Anticorps anti-HMGCR - sérum
IA2	Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum
IGAAC	Anticorps anti-IgA - sérum
IL10	Interleukine IL -10 - sérum
IL10D	Interleukine IL -10 - liquide
IL1A	Interleukine IL-1 alpha - sérum
IL1B	Interleukine IL-1 bêta - sérum
IL2	Interleukine IL-2 - sérum
IL4	Interleukine IL-4 - sérum
IL5	Interleukine IL-5 - plasma
IL6	Interleukine IL-6 - sérum
IL6D	Interleukine IL-6 - liquide
IL8	Interleukine IL-8 - sérum
ILO	Anticorps anti-Ilôts de Langerhans - ICA - sérum
INAPL	Interféron alpha - LCR
INFA	Interféron alpha - sérum
INFAA	Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum
INFAC	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
INFAD	Interféron alpha - liquide biologique
INFBA	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
INFGS	Interféron gamma - sérum
INGPL	Interféron gamma - LCR
INH1C	C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum
INSAC	Anticorps anti-insuline - sérum
LDLAC	Anticorps anti-LDL oxydées - IgG et/ou IgM - sérum
LDLOX	LDL Oxydés - sérum
LKM	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
LKMC	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
MAG	Anticorps anti-MAG - sérum
MBG	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
MCP1	Protéine chimio attractive des monocytes (MCP-1) - sérum
MITO	Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum
MITOT	Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum
MOG	Anticorps anti- MOG - sérum
MOGPL	Anticorps anti- MOG - LCR
MPO	Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum
MUSCL	Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum
MUSK	Anticorps anti-MuSK - sérum
MUSTR	Anticorps anti-muscle strié - sérum
NMDA	Anticorps anti-récepteur NMDA - sérum
NMDPL	Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR
NMOAC	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
NMOPL	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - LCR
NUCAC	Anticorps anti-nucléosome - sérum
OVAC	Anticorps anti-ovaires - sérum
PA100	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 100 aliments - sérum
PA287	Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum
PA50V	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments VEGAN - sérum
PAG25	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 25 aliments - sérum
PAG50	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments - sérum
PANAC	Anticorps anti-pancréas exocrine - sérum
PANCR	Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum
PEAU	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum

Immunologie

PHAC	Anticorps anti-phospholipides - sérum
PHETG	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgG - sérum
PHETH	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgM - sérum
PIH	Alpha-1 Antitrypsine - phénotype PI - sérum
PINI	Bilan protéique nutritionnel avec indice de PINI - sérum
PLA2R	Anticorps anti-PLA2R - sérum
POPRO	Anticorps anti-pompe à protons - sérum
PPER	Properdine - fraction du complément
PR3	Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum
PTHYR	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
REAC	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
RECOV	Anticorps anti-rétine-recovérine - sérum
RIBO	Anticorps anti-ribosomes - sérum
RIL2	Interleukine IL-2 - récepteur - plasma
RITUX	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
SCLER	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
SLAC	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
SOX1	Anticorps anti-SOX1 - sérum
SOX1L	Anticorps anti-SOX1 - LCR
SP100	Anticorps anti-SP100 - IgG - sérum
SURAC	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
SYNTH	Marqueurs des myosites - sérum
T3AC	Anticorps anti-T3 - triiodothyronine
T4AC	Anticorps anti-T4 - thyroxine
TESTA	Anticorps anti-testicules - sérum
TGLU	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum
TGLUG	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum
THSD7	Anticorps anti-THSD7A - sérum
TITIL	Anticorps anti-Titine - LCR
TITIN	Anticorps anti-Titine - sérum
TNF	TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
TOCI	Tocilizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
TPO	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
TRAKH	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
TRIPL	Anticorps anti-tissu - sérum
TSHAC	Anticorps anti-TSH
TYRAC	Anticorps anti-thyroglobuline - sérum
TYSA	Anticorps anti-Natalizumab - sérum
USTEK	Ustekinumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
VEDO	Vedolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
VEGF	Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) - sérum
VGKPL	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - LCR
YOHU	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
YOPL	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
ZIC4	Anticorps anti-ZIC4 - sérum
ZIC4L	Anticorps anti-ZIC4 - LCR
ZNT8	Anticorps anti-ZNT8 - sérum

Infectiologie

ABMA	Mycobactéries - antibiogramme
ADENO	Adénovirus - sérologie - sérum
ADENS	Adénovirus - recherche - Selles
ADNBQ	Hépatite B - charge virale - PCR
ADNVB	Adénovirus - diagnostic direct - PCR
AGYLU	Angiostrongylus cantonensis - sérologie - sérum
AMIB	Ambiase - sérologie - sérum
AMIBM	Amibes telluriques genre Acanthamoeba - PCR
AMYC	Levures - antifongogramme - prélèvements divers
ANG	Anguillulose - sérologie - sérum
ARNCQ	Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN
ASC	Ascarirose - sérologie - sérum
ASDOR	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
ASIEP	Aspergillose - sérologie confirmation - sérum
ASLO	Anti-streptolysine - ASLO - sérum
ASPAG	Aspergillose - antigène soluble - recherche - sérum
ASPER	Aspergillose sérologie dépistage IgG - sérum
ASPLB	Aspergillose - antigène soluble - recherche - LBA
ATBAN	Bactérie anaérobie - antibiogramme

Infectiologie

ATBSM	Bactérie aérobie - antibiogramme
BACBM	Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR
BADUC	Haemophilus ducreyi - recherche
BAF	Examen bactériologique
BDGLU	Antigène Beta-D-Glucan - recherche
BIL	Bilharziose - sérologie dépistage - sérum
BILBM	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
BILC	Bilharziose - sérologie confirmation - sérum
BKAT	Mycobactéries - identification
BKBM	Mycobactéries - PCR M. tuberculosis complex (BKBM)
BKDEF	Mycobactéries - culture
BKDIR	Mycobactéries - examen direct
BKRES	Mycobactéries - PCR détection de résistances à la Rifampicine (rpoB) et l'Isoniazide (katG, inhA) de M. tuberculosis complex (BKRES)
BKXDR	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide, l'éthionamide, aux fluoroquinolones et aux antibiotiques injectables de deuxième ligne
BMR	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
BOINT	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
BOR	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum
BORBM	Borréliose - diagnostic direct - PCR
BORPL	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR
BOTU	Toxine botulique - Clostridium botulinum - botulisme
BRUC	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
BRUCM	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
BW	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
BWIGM	Syphilis - sérologie IgM - sérum
BWQ	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
BWQPL	Syphilis - titrage - LCR
CAMP	Campylobacter - sérologie - sérum
CANAG	Candida - antigène mannane - sérum
CAND	Candida albicans - sérologie dépistage - sérum
CANDC	Candida albicans - sérologie confirmation - sérum
CHIK	Chikungunya - sérologie IgG/IgM - sérum
CHKBM	Chikungunya - détection ARN viral - PCR
CHPBM	Chlamydia pneumoniae - diagnostic direct - PCR
CHPN	Chlamydia pneumoniae - sérologie IgG/IgM - sérum
CLOBM	Clostridium difficile - toxines - recherche par PCR
CMI	Bactérie aérobie / anaérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
CMIMY	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
CMV	Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG/IgM - sérum
CMVAV	Cytomégalovirus - CMV - Test de mesure d'avidité des IgG - sérum
CMVBM	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR
CMVG	Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG - sérum
CMVLA	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
COQBM	Coqueluche - Bordetella pertussis et parapertussis - diagnostic direct - PCR
COQWB	Coqueluche - sérologie
COVBM	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR
COVGR	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
COVHN	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR - non remboursé
COVS	COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR
COX12	Coxiella burnetii - phase 1 et 2 - sérologie - sérum
COXBM	Entérovirus - diagnostic direct - PCR
COXBU	Coxiella burnetii - sérologie - sérum
COXLA	Entérovirus - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
CRYPD	Cryptococcus neoformans - antigène soluble - recherche
CRYPS	Cryptosporidies - recherche
DELAC	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
DELAG	Hépatite Delta - antigène - sérum
DELAM	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
DELBM	Hépatite Delta - charge virale - PCR
DENAG	Dengue - antigène NS1 - sérum
DENBM	Dengue - diagnostic direct - PCR
DENG	Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum
DENLA	Dengue - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
DIPH	Diphthérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
DISTC	Distomatose - sérologie confirmation - sérum
DISTO	Distomatose - sérologie dépistage - sérum
EAA	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
EAG	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum

Infectiologie

EBVBM	Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR
EBVG	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
EBVLA	Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
EBVM	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum
EBVQ	Epstein Barr Virus - EBV - charge virale - PCR
EHRLI	Ehrlichiose humaine - sérologie - sérum
FIL	Filariose - sérologie - sérum
FJAC	Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum
GABPC	Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
GALER	Gale - Sarcoptes scabiei - recherche
GCOV	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
GDH	Clostridium difficile - Dépistage - recherche de glutamate déshydrogénase (GDH) (+toxines)
GENC	Hépatite C - génotypage
GIP	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
GNATH	Gnathostomose - sérologie - sérum
GRIF	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
GRIFB	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
GRIP	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
HAEBM	Haemophilus ducreyi - diagnostic direct - PCR
HANTA	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
HAVAC	Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum
HAVM	Hépatite A - anticorps IgM - sérum
HBCAC	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
HBCM	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
HBEAC	Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum
HBEAG	Hépatite B - antigène HBe - sérum
HBSAC	Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum
HBSAG	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
HBSGQ	Hépatite B - antigène HBs - quantitatif - sérum
HCVAC	Hépatite C - sérologie dépistage - sérum
HEIN	Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum
HELUCU	Helicobacter pylori - culture
HELI	Helicobacter pylori - sérologie IgG - sérum
HELS	Helicobacter pylori - antigène - Selles
HERBM	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR
HERPG	Herpes simplex virus - HSV1 IgG et HSV2 IgG - sérologie IgG - sérum
HERPM	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - sérologie IgM - sérum
HEVBM	Hépatite E - diagnostic direct - PCR
HEVG	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
HEVM	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
HHV6G	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
HHV6M	Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum
HHV8	Herpès virus type 8 - sérologie IgG - sérum
HIV	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie dépistage - sérum
HIVQ	VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
HIVQ2	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
HIVQL	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR
HKIT	Helicobacter pylori - test respiratoire à l'Urée 13C - air expiré
HPGEN	Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR
HPV	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage primaire du CCU
HPV2	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU (test secondaire ou suivi de traitement)
HPVBM	Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible risque - PCR
HPVPV	Détection des HPV-HR sur (auto) prélèvement vaginal
HSVLA	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HTLBM	HTLV 1/2 PCR qualitative - sang total
HTLV	HTLV 1/2 - sérologie dépistage - sérum
HV6BM	Herpès virus type 6 - diagnostic direct - PCR
HV6Q	Herpès virus type 6 - charge virale - PCR
HV7BM	Herpès virus type 7 - diagnostic direct - PCR
HV8BM	Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR
HV8Q	Herpès virus type 8 - charge virale
HYD	Echinococcose - sérologie dépistage - sérum
HYDWB	Echinococcose - sérologie confirmation - sérum
IBA	Bactérie aérobie - identification
IDANA	Bactérie anaérobie - identification
IDMA	Mycobacterium tuberculosis - identification
ISTBM	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
JCPL	Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR

Infectiologie

KINGK	Kingella kingae - diagnostic direct - PCR
LEGAG	Légionellose antigène LP1 - urines
LEGBM	Légionellose - diagnostic direct - PCR
LEGIO	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum
LEGIS	Légionellose - sérotypage
LEGIT	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie confirmation IgG - sérum
LEIBM	Leishmaniose - diagnostic direct - PCR
LEIS	Leishmaniose - sérologie - sérum
LEIWB	Leishmaniose - sérologie confirmation - sérum
LEPBM	Leptospirose - diagnostic direct - PCR
LEPT	Leptospirose - sérologie IgM - sérum
LEPTA	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
LISBM	Listeria monocytogenes - diagnostic direct - PCR
MCRBM	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
MENVI	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
METBM	Métapneumovirus - HMPV - diagnostic direct - PCR
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - MNI test - sérum
MPOX	Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR
MYCBM	Mycoplasma genitalium - Détection par amplification moléculaire
MYCC	Mycoplasmes urogénitaux - culture
MYCEX	Champignon - Levures - recherche
MYCGE	Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum
MYCID	Champignon - Levures - identification
MYCOM	Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgM - sérum
MYCPN	Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgG - sérum
MYPBM	Mycoplasma pneumoniae - diagnostic direct - PCR
NGOBM	Neisseria gonorrhoeae - Détection par amplification moléculaire
NORBM	Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles
NOROS	Norovirus - recherche - Selles
NTMDR	Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux aminoglycosides (NTMDR)
ORE	Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum
OREBM	Oreillons - diagnostic direct - PCR
OREG	Oreillons - sérologie IgG - sérum
P24AG	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
PALU	Paludisme - sérologie - sérum
PARAG	Paragonimose - sérum
PARBM	Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR
PARLA	Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
PARSP	Parasitologie - microscopie - Selles
PARV	Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum
PARVG	Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum
PARVQ	Parvovirus B19 - charge virale
PCRUN	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
PECBM	Parechovirus - diagnostic direct - PCR
PEV	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
PINF	Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum
PIR	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
PIRO	Babésiose humaine - sérologie - sérum
PJICF	Pneumocystose - Pneumocystis jirovecii - PCR quantitative / Charge fongique
PNAGD	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - urines
PNUAC	Streptococcus pneumoniae - polysaccharide capsulaire - sérologie - sérum
POLIO	Poliovirus - sérologie - sérum
POPCR	Polyomavirus BK - charge virale
PPARA	Helminthes - Protozoaires - diagnostic direct - PCR - selles
PSIT	Chlamydia psittaci - sérologie - sérum
PSITA	Chlamydia psittaci - sérologie IgA - sérum
PUG	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
QANHN	Production d'interféron Gamma - Quantiferon® TB Gold Plus
QANR	Production d'interféron Gamma - Quantiferon® TB Gold Plus
RAGE	Rage - sérologie - sérum
RBA	Bactérie aérobie - recherche
RHB	Hépatite B Genotypage et Profil de résistance aux anti-viraux - sérum
RHC	Hépatite C - profil de résistance aux anti-viraux - sérum
RHIBM	Rhinovirus - diagnostic direct - PCR
RIBHN	Hépatite C - confirmation - sérum
RICCT	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
ROTSE	Rotavirus - recherche rapide - Selles
ROUBM	Rougeole - diagnostic direct - PCR

Infectiologie

ROUG	Rougeole - sérologie IgG/IgM - sérum
ROUGG	Rougeole - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
ROUPL	Rougeole IgG - Index de synthèse intrathécal - LCR + sérum
RPOB	Complexe tuberculosis - Détection par PCR de mutation du gène rpoB codant pour la résistance à la rifampicine
RUBAV	Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum
RUBEM	Rubéole - sérologie IgM - sérum
RUBEO	Rubéole - sérologie IgG - sérum
RUBLA	Rubéole - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
RUBM	Rubéole - diagnostic direct - PCR
RVIH	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase et de la protéase); profil de résistance aux anti-viraux - plasma
RVIH2	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) : profil de résistance aux antiviraux - plasma
RVIH3	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotype de résistance aux anti-rétroviraux (inhibiteur de l'intégrase) - plasma
SALMO	Salmonellose - sérologie - sérum
SCOHN	COVID-19 (SARS-CoV-2) - sérologie (Ig totales)
SCOVI	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
STABM	Détection toxine PVL (Staphylococcus aureus) - PCR sur souche
STREL	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - LCR
STYPB	Escherichia coli entéro-pathogènes - sérotypage/autres sérotypages - prélèvements divers
TAE	Cysticercose - Taenia Solium - sérologie IgG - sérum
TBE	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
TCAR	Toxocarose - sérologie - sérum
TENAC	Cysticercose - sérologie confirmation
TENAD	Cysticercose - sérologie confirmation - LCR
TET	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
TOSBM	Toscana virus - diagnostic direct - PCR
TOXAV	Toxoplasmose - avidité anticorps - IgG - sérum
TOXBM	Toxoplasmose - diagnostic direct - PCR
TOXC	Toxocarose - sérologie confirmation - sérum
TOXLA	Toxoplasmose - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
TOXO	Toxoplasmose - sérologie IgG/IgM - sérum
TOXOM	Toxoplasmose - IgM confirmation - sérum
TOXWB	Toxoplasmose - recherche de néosynthèse d'IgG, d'IgM ou d'IgA
TRABM	Chlamydia trachomatis - Détection par amplification moléculaire
TRACA	Chlamydia trachomatis - sérologie IgA - sérum
TRACG	Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum
TRACM	Chlamydia trachomatis - sérologie IgM - sérum
TREBM	Treponema pallidum - détection par PCR
TRI	Trichinellose - sérologie IgG - sérum
TRIBM	Trichomonas vaginalis - diagnostic direct - PCR
TRIWB	Trichinellose - sérologie confirmation - sérum
TRYL	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
TRYPA	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
TRYPL	Trypanosoma gambiense - recherche - LCR
TRYS	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
TUL	Tularémie - Francisella tularensis - sérologie - sérum
VARZG	Varicelle Zona - sérologie IgG - sérum
VARZM	Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum
VCAA	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum
VIRBM	Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic direct - PCR
VRS	Virus respiratoire syncytial - VRS - sérologie IgG - sérum
VRSBM	Virus respiratoire syncytial - VRS - diagnostic direct - PCR
VZVBM	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR
VZVLA	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
WB12	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique d'immuno-transfert - sérum
WBHTL	HTLV 1/2 - sérologie confirmation - sérum
WBLYG	Borréliose - sérologie confirmation IgG
WBLYM	Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum
WBSG	Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum
WBSM	Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum
WBTRY	Trypanosoma cruzi - confirmation - sérum
WBTXG	Toxoplasmose - test de confirmation IgG - sérum
WHIBM	Tropheryma whipplei - diagnostic direct - PCR
WNV	West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum
WNVBM	West Nile virus - WNV - diagnostic direct - PCR
YOPAC	Anticorps anti-YOP - IgG - sérum
ZIKA	Zika - sérologie - sérum
ZIKBM	Zika - diagnostic direct - PCR
ZIKLA	Zika - détection ARN viral - PCR - liquide amniotique

Infectiologie

Oncohématologie

FS	Formule Leucocytaire Approfondie
IPHEN	Immunophénotypage des hémopathies malignes
MOHC1	Caryotype hématologique
MYELO	Myélogramme
PERLS	Myélogramme - coloration de Perls
SCHIZ	Morphologie des globules rouges
SEZA	Cellules de Sézary - recherche - frottis

INDEX DES EXAMENS CLASSES PAR SYNONYMES

10 Hydroxy-Oxcarbazépine - sérum	
1,25 - Dihydroxycalciférol	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
1,25 - OH 2 Vitamine D3	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
1,25 - OH - 2D	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
11 - DF	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
11 Désoxycorticostérone - sérum	
11 Désoxycortisol - composé S - sérum	
11-OH-THC	Cannabis confirmation - dosage sanguin
11-OH-THC	Cannabis - confirmation - urines
1-3 B D Glucan	Antigène Beta-D-Glucan - recherche
16S rRNA	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
17 bêta estradiol	Estradiol - femme - sérum
17 bêta estradiol	Estradiol - homme/enfant - sérum
17 bêta estradiol	Estradiol - salive
17 Hydroxy Prénégénolone - sérum	
17 Hydroxy Progestérone - sérum	
17 hydroxyprogestérone	17 OH progestérone - salive
17 OH progestérone - salive	
17- alpha-hydroxyprogestérone	17 Hydroxy Progestérone - sérum
17- Hydroxy-delta 5- prénégénolone	17 Hydroxy Prénégénolone - sérum
17- Hydroxyprogestérone	17 Hydroxy Progestérone - sérum
17- OH-P	17 Hydroxy Progestérone - sérum
17- OH-prénégénolone	17 Hydroxy Prénégénolone - sérum
17- OH-progestérone	17 Hydroxy Progestérone - sérum
2019-nCoV	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR
2019-nCoV	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR - non remboursé
2019-nCoV	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
2019-nCoV	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
2,4' -DDE	Pesticides - recherche et/ou dosage
2,4' -DDE	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
2,4' -DDT	Pesticides - recherche et/ou dosage
2,4' -DDT	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
2,5 - 3,4 - 2,4 Acides diméthylbenzoïques - urines	
21 Désoxycortisol - sérum	
21- Désoxy-F	21 Désoxycortisol - sérum
21- DF	21 Désoxycortisol - sérum
21- DOB	21 Désoxycortisol - sérum
21-Hydroxylase - anticorps	Anticorps anti-21 Hydroxylase - sérum
2- butanone	Méthyléthylcétone - urines
[2]pro-PSA - calcul du phi - sérum	
23S	Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR
25 Hydroxy vitamine D3	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
25 Hydroxy vitamine D3	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
25-OH-D	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
25-OH-D	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
25-OH-D3	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
25-OH-D3	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
3,4 méthylène-dioxy-amphétamine	Amphétamines - dépistage - urines
3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum	
3 méthoxytyramine	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
3 méthoxytyramine	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
3 ortho methyl dopamine	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
3 ortho methyl dopamine	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
3- (B-aminoéthyl) -5-hydroxyindole	Sérotonine - sang total
3tc	Lamivudine - plasma
4,4' -DDE	Pesticides - recherche et/ou dosage
4,4' -DDE	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines

4,4' -DDT	Pesticides - recherche et/ou dosage
4,4' -DDT	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
4-4' Méthylènedianiline - urines	
4-Méthyl-2-Pentanone	Méthylisobutylicétone - urines
5 alpha réductase	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
5 Hydroxy, N-méthylpyrrolidone - urines	
5 Hydroxytryptamine	Sérotonine - sang total
5' Nucléotidase - activité - sérum	
5- prégnénolone	Prégnénolone - sérum
5-Alpha, 3-alpha-Androstanediol glucuronide	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
5-Alpha-androstanediol	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
5-Alpha-dihydrotestostérone	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
5-FU	Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines
5-HNMP	5 Hydroxy, N-méthylpyrrolidone - urines
5-HT	Sérotonine - sang total
5-OHT - sang total	Sérotonine - sang total
5alpha DHT	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines	
5HIAA	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines
5'Nu	5' Nucléotidase - activité - sérum
5P	Prégnénolone - sérum
6 mono acétyl morphine	Opiacés confirmation - dosage sanguin
6 mono acétyl morphine	Opiacés - confirmation - urines
6 sulfatoxymélatonine - urine	Mélatonine - 3 temps - urines
6 sulfatoxymélatonine - urines	Mélatonine - urines
6ème maladie éruptive de l'enfant - sérologie	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
7 Déhydrocholestérol	
9 Hydroxy-Rispéridone	Rispéridone
A1 antiplasmine	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
A1 antitrypsine	Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum
A1 antitrypsine - clairance	Alpha-1 Antitrypsine - clairance
A1 microglobuline	Alpha-1 Microglobuline - urines
A2 macroglobuline	Alpha-2 Macroglobuline - sérum
A-foetoprotéine	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide divers
A-foetoprotéine	AFP - Alpha foetoprotéine - sérum
a-foetoprotéine - liquide amniotique	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide amniotique
A2M	Alpha-2 Macroglobuline - sérum
AAN	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Abacavir - plasma	
Abilify®	Aripiprazole
Ac anti AMA	Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum
Ac anti antigène soluble du foie	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
AC ANTI RACH	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Ac anti-alanyl- ARNt synthétase (PL12)	Marqueurs des myosites - sérum
Ac anti-ARN t synthetase	Marqueurs des myosites - sérum
Ac anti-HA	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
Ac anti-Histidyl- ARNt synthétase (JO1)	Marqueurs des myosites - sérum
Ac anti-Isoleucyl- ARNt synthétase (OJ)	Marqueurs des myosites - sérum
ac anti-récepteur de la phospholipase A2	Anticorps anti-PLA2R - sérum
Ac anti-récepteurs N Méthyl D Aspartate	Anticorps anti-récepteur NMDA - sérum
Ac anti-Thréonyl- ARNt synthétase (PL7)	Marqueurs des myosites - sérum
Ac totaux anti-core de VHB	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
acarien	Gale - Sarcoptes scabiei - recherche
ACC	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
ACD	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
ACD	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - liquide de ponction	
ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - sérum	

Acebutolol - sérum	
Acétazolamide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Acétoacétate	Corps cétoniques - Surnageant de défécât sanguin ou LCR
Acétylcholinestérase - liquide amniotique	
AChE - liquide amniotique	Acétylcholinestérase - liquide amniotique
Aciclovir - plasma	
Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines	
Acide acéto-acétique	Corps cétoniques - Surnageant de défécât sanguin ou LCR
Acide ascorbique	Juvenalis - Vitamine C - acide ascorbique
Acide ascorbique	Vitamine C - Acide ascorbique
Acide bêta hydroxybutyrique	Corps cétoniques - Surnageant de défécât sanguin ou LCR
Acide borique urinaire	Bore - urines
Acide butoxyacétique - urines	
Acide chénodésoxycholique	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Acide chénodésoxycholique	Acides biliaires - sérum
Acide cholique	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Acide cholique	Acides biliaires - sérum
Acide citrique - plasma séminal	
Acide citrique - sérum	
Acide citrique - Urines	
Acide delta aminolévulinique - urines	
Acide désoxycholique	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Acide désoxycholique	Acides biliaires - sérum
Acide eicosapentaénoïque	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Acide eicosapentaénoïque	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Acide étacrynique	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Acide folique érythrocytaire - sang total	
Acide folique sérique - sérum	
Acide formique - urines	
Acide gamma linoléique	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Acide Gamma Hydroxy Butyrique	GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - urines
Acide gamma linoléique	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Acide glutamique décarboxylase - anticorps anti	Anticorps anti-GAD - LCR
Acide glutamique décarboxylase - anticorps anti	Anticorps anti-GAD - sérum
Acide hippurique - urines	
Acide homogentisique - urines	
Acide homovanillique - Urine	
Acide hyaluronique - liquide pleural	
Acide hyaluronique - sérum	
Acide lactique	Corps cétoniques - Surnageant de défécât sanguin ou LCR
Acide lactique	
Acide lactique - LCR	
Acide lithocholique	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Acide lithocholique	Acides biliaires - sérum
Acide méthylmalonique - urines	
Acide monomethyl arsenic	Arsenic - inorganique et métabolites - urines
Acide muconique	Acide trans muconique - t,t-MA - urines
Acide mycophénolique	Mycophénolate - plasma
Acide N acetyl neuraminique	Acide sialique libre - urines
Acide nicotinique	Juvenalis - Vitamine PP - Niacine
Acide nicotinique	Vitamine PP - Niacine
Acide oxalique - sérum	
Acide oxalique - urines	
acide ptéroyl-monoglutamique	Acide folique érythrocytaire - sang total
acide ptéroyl-monoglutamique	Acide folique sérique - sérum
acide ptéroyl-monoglutamique	Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total
acide ptéroylglutamique	Acide folique érythrocytaire - sang total
acide ptéroylglutamique	Acide folique sérique - sérum

acide ptéroylglutamique	Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total
Acide pyruvique	Corps cétoniques - Surnageant de défécats sanguin ou LCR
Acide pyruvique - Surnageant de défécats ou LCR	
Acide sialique libre - urines	
Acide trans, trans-muconique	Acide trans muconique - t,t-MA - urines
Acide trans muconique - t,t-MA - urines	
Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines	
Acide urique	
Acide urique - sérum	
Acide ursodésoxycholique	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Acide ursodésoxycholique	Acides biliaires - sérum
Acide valproïque - sérum	
Acide vanylmandélique	Acide vanylmandélique - Urine
Acide vanylmandélique - Urine	
Acides aminés - chromatographie	
Acides aminés - chromatographie - LCR	
Acides aminés - chromatographie - urine	
Acides biliaires - chromatographie - sérum	
Acides biliaires - sérum	
Acides biliaires totaux	Acides biliaires - sérum
Acides diméthylbenzoïques - 2,5 - 3,4 - 2,4	2,5 - 3,4 - 2,4 Acides diméthylbenzoïques - urines
Acides gras à très longues chaînes - C22 à C26 - plasma	
Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA	
Acides gras libres non estérifiés - sérum	
acides gras membranaires	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Acides gras membranaires	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Acides organiques - quantitatif - urine	
ACL	Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum
ACL IgG	Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum
ACPA	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
ACPA	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
ACPA	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
ACPA	Exome
ACPA	Exome avec interface d'interprétation
ACPA	Exome Néphrologie
ACPA - Anti-Citrullinated Protein Antibodies	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
ACPAN	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
ACTH - Corticotrophine	
ACTH - Corticotrophine - matin	
ACTH - Corticotrophine - soir	
Actine - anticorps anti-	Anticorps anti-actine - typage - sérum
Actitest	Fibrotest - Actitest - non remboursé - sérum
ActiTest®	NASH-FibroTest - sérum
ACTITEST	FIBROMAX - non remboursé - sérum
ACTITEST	FIBROMAX - remboursé - sérum
Activateur tissulaire du plasminogène - tPA - antigène - plasma	
Activité anti Xa - héparine de bas poids moléculaire	Activité anti-Xa : héparine de bas poids moléculaire - HBPM - plasma
Activité anti-Xa : Danaparoiide - Orgaran - plasma	
Activité anti-Xa : Fondaparinux - Arixtra - plasma	
Activité anti-Xa : héparine de bas poids moléculaire - HBPM - plasma	
Activité anti-Xa : héparine standard - HNF - plasma	
Activité anti-Xa - Arixtra®	Activité anti-Xa : Fondaparinux - Arixtra - plasma
Activité anti-Xa - Orgaran®	Activité anti-Xa : Danaparoiide - Orgaran - plasma
Activité de la lipase	Lipase - sérum
Activité de la lipase	Lipase - urines
Activité de la protéine C anticoagulante	Protéine C - activité
Activité de la protéine S anticoagulante	Protéine S - activité
Activité du C1 inhibiteur	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral

Activité du plasminogène	Plasminogène - plasma
Activité rénine	Rénine active
Activité rénine angiotensine	Rénine active
ADA	Adénosine Désaminase - ADA
adalimumab	Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps
Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps	
ADAMTS13	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand	
Adéfovir - plasma	
Adénosine Désaminase - ADA	
Adenovirus	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
adénovirus	Adénovirus - sérologie - sérum
Adénovirus - recherche - Selles	
Adénovirus - sérologie - sérum	
Adenovirus F 40/41	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines	
ADH - Hormone antidiurétique	
ADH - Hormone antidiurétique - urine	
ADN bacterien	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
ADNIc	Ninalia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNIc) - prénatal
Adoport	Tacrolimus - FK506
Adrénaline	Catécholamines libres
Adrénaline	Catécholamines libres - enfant - urines
Adrénaline	Catécholamines - libres - Urines
ADV	Adénovirus - sérologie - sérum
Advagraf	Tacrolimus - FK506
Afinitor	Évérolimus
Afipia felis	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
AFP - Alpha foetoprotéine - liquide amniotique	
AFP - Alpha foetoprotéine - liquide divers	
AFP - Alpha foetoprotéine - sérum	
Age Check	Juvenalis - Panel - AgeCheck - femme
Age Check	Juvenalis - Panel - AgeCheck - homme
Agenerase®	Amprénavir - Sérum
Agenerase®	Fosamprénavir - Sérum
Agglutination-lyse de Martin et Pettit - titrage d'anticorps	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification	
AGL	Acides gras libres non estérifiés - sérum
AGNA	Anticorps anti-SOX1 - LCR
AGNA	Anticorps anti-SOX1 - sérum
AGNE	Acides gras libres non estérifiés - sérum
AICAR succinyl	Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines
Akineton®	Bipéridène - sérum
ALA	Acide delta aminolévulinique - urines
ALA U	Acide delta aminolévulinique - urines
Alatop	IgE spécifiques ; dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
Albuminurie	Protéines - dosage - urines
Alcaptonurie	Acide homogentisique - urines
Alcool éthylique	
Alcool éthylique - sérum	
Alcool méthylique - Sérum	
Alcool méthylique - urines	
Alcoolémie	Alcool éthylique - sérum
Aldactone	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Aldéhyde formique	Acide formique - urines
Aldostérone	
Aldostérone - couché	
Aldostérone - debout ou assis	

Aldostérone - urines	
Aldrin	Pesticides - recherche et/ou dosage
Aldrin	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Alepsal®	Phénobarbital - sérum
Algorithme de ROMA	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Alimémazine - Sérum	
Allèles DP, DQ, DR - génotypage	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
Allèles HLA- A, B - génotypage	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Allergènes - latex	IgE spécifiques : latex - allergène unique
Allergènes - médicaments	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Hycor
Allergènes - médicaments	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia
Allergènes - pneumallergènes - mélange	IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes
Allergènes - pneumallergènes - unique	IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor
Allergènes - pneumallergènes - unique	IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia
Allergènes - trophallergènes - mélange	IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum
Allergènes - trophallergènes - unique	IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia
Allergènes - venins d'hyménoptère	IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique
Allergènes IgG	IgG spécifiques - sérum
Allergènes IgG4	IgG4 spécifiques - sérum
allo immunisation plaquettaire	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
allo-hémagglutinines anti-A anti-B	Anticorps immuns du système ABO - anti-A anti-B - dépistage et titrage - sérum
Allo-immunisation anti-RH3	RH3(E) foetal - génotypage
Allo-immunisation anti-RH4	RHc foetal - génotypage
allongement du TCA	Anticoagulant circulant - dépistage - plasma
Alpha 2	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
Alpha 2 anti plasmine	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
Alpha 2 antiplasmine	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
Alpha foetoprotéine	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide divers
Alpha foetoprotéine	AFP - Alpha foetoprotéine - sérum
Alpha foetoprotéine - liquide amniotique	AFP - Alpha foetoprotéine - liquide amniotique
Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard	
Alpha glucosidase acide	Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard
Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard	
Alpha interféron	Interféron alpha - LCR
Alpha interféron	Interféron alpha - liquide biologique
Alpha interféron	Interféron alpha - sérum
Alpha2	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
Alpha-1	Orosomucoïde - sérum
Alpha-1 Antitrypsine - clairance	
Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum	
Alpha-1 Antitrypsine - phénotype PI - sérum	
Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations	
Alpha-1 glycoprotéine acide	Orosomucoïde - sérum
Alpha-1 Microglobuline - urines	
Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma	
Alpha-2 Macroglobuline - sérum	
Alphavirus	Chikungunya - sérologie IgG/IgM - sérum
Alprazolam - Sérum	
Altizide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Aluminium - dialysat	Aluminium - eau - environnement - hygiène hospitalière - eau - Hygiène
Aluminium - eau - environnement - hygiène hospitalière - eau - Hygiène	
Alzheimer	Protéines TAU - Amyloïde - LCR
AM	Amphétamines - dépistage - urines
AMA	Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum
amarile	Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum
Ambisome	Amphotéricine B - Sérum
AMDA	Marqueurs des myosites - sérum
AMH - Hormone anti-Mullérienne - Enfant - sérum	

AMH - Hormone anti-Mullérienne - sérum	
Amibes	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Amibes - recherche de kystes	Parasitologie - microscopie - Selles
Amibes - sérologie	Amibiase - sérologie - sérum
Amibiase - sérologie - sérum	
Amikacine - sérum	
Amiklin®	Amikacine - sérum
Amiloride	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Aminogramme	Acides aminés - chromatographie
Aminogramme	Acides aminés - chromatographie - LCR
Aminogramme	Acides aminés - chromatographie - urine
Aminolévulinate	Acide delta aminolévulinique - urines
Amiodarone - sérum	
Amisulpride - Sérum	
Amitriptyline - Sérum	
Ammoniaque	Ammoniémie - plasma
Ammoniémie - plasma	
Amoebiasis - sérologie	Amibiase - sérologie - sérum
Amoxapine - Sérum	
Amoxicilline - Sérum	
Amphétamines - confirmation - urines	
Amphétamines - dépistage - urines	
Amphétamines confirmation - dosage sanguin	
Amphotéricine B - Sérum	
Amprénavir - Sérum	
Anafranil®	Clomipramine - Sérum
Anaplasma phagocytophylum	Ehrlichiose humaine - sérologie - sérum
Anaplasme	Ehrlichiose humaine - sérologie - sérum
ANCA	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Ancotil®	Flucytosine - Sérum
androgène surrénalien	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
androgène surrénalien	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
androgène surrénalien	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Androstanediol	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
Androstanediol glucuronide	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
Androstanolone	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
Androstènedione - Delta 4	D4A - Delta 4 androstènedione - sérum
Aneurine	Juvenalis - Vitamin B1 - Thiamine
Aneurine	Vitamine B1 - Thiamine
Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - liquide amniotique	
Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total -	
Angelman / Prader Willi - méthylation au locus SNRPN - prénatal	
Angelman / Prader-Willi - méthylation au locus SNRPN - sang total	
Angioconvertase	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine
Angioconvertase	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - LBA
Angioconvertase	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - sérum
Angiokeratose diffuse universelle	Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard
Angiostrongylus cantonensis - sérologie - sérum	
Angiotensine II - plasma	
Angiotrongylose	Angiostrongylus cantonensis - sérologie - sérum
Anguillulose - sérologie - sérum	
Anhydrase carbonique 1 et 2 - anticorps anti-	Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum
anisakiase	Anisakidose - IgE et IgG4 spécifiques - sérum
Anisakidose - IgE et IgG4 spécifiques - sérum	
anisakis	Anisakidose - IgE et IgG4 spécifiques - sérum
Annexine V - IgG - anticorps anti-	Anticorps anti-Annexine V - IgG - sérum
Anomalie de l'hémoglobine	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
Ansatiptine	Rifabutine - Sérum

anti AMPAR LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti anti humira	Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps
Anti D	Anticorps anti-érythrocytaires Anti-RH1 titrage et microtitrage - sang total
anti DPPX LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti GABAR LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti GlyR LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti Iglon5 LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti mGluR1 LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
anti mGluR5 LCR	Anticorps anti-Neuropile - LCR
Anti plasmine	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
anti- AMPAR	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1,
anti- GABAB	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1,
anti- GlycR1	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1,
anti- mGluR1	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1,
anti- mGluR5	Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1,
Anti-ASGPR : asialoglycoprotein receptor	Anticorps anti-récepteur de l'asialoglycoprotéine - sérum
anti-DNER	Anticorps anti-Tr(DNER) - LCR
anti-DNER	Anticorps anti-Tr(DNER) - sérum
Anti-DPG	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
Anti-hémophilique A - facteur	Facteur VIII - anti-hémophilique A - plasma
Anti-hémophilique B - facteur	Facteur IX - anti-hémophilique B - plasma
Anti-iGluR2	Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR
Anti-M2 - dépistage et titrage	Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum
anti-N	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
Anti-NR2 (NMDA receptor)	Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR
anti-nucléocapside	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
anti-PCNA	Anticorps anti-nucléaires - sérum
anti-phospholipase A2	Anticorps anti-PLA2R - sérum
anti-récepteur tyrosine kinase	Anticorps anti-MuSK - sérum
anti-S	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
anti-spike	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
Anti-streptodornase B - ASD B - sérum	
Anti-streptolysine - ASLO - sérum	
Anti-Xa	Activité anti-Xa : héparine standard - HNF - plasma
Anti-Xa - Arixtra®	Activité anti-Xa : Fondaparinux - Arixtra - plasma
Anti-Xa - Danaparoïde	Activité anti-Xa : Danaparoïde - Organan - plasma
Anti-Xa - HBPM	Activité anti-Xa : héparine de bas poids moléculaire - HBPM - plasma
Anti-Xa - Organan®	Activité anti-Xa : Danaparoïde - Organan - plasma
Antibiogramme - CMI	Helicobacter pylori - culture
Antibiogramme bactérie aérobie	Bactérie aérobie - antibiogramme
Antibiogramme bactérie anaérobie	Bactérie anaérobie - antibiogramme
Anticoagulant circulant - dépistage - plasma	
Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche	
Anticoagulant circulant de type lupique	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Anticoagulants oraux : Fluindione - Sérum	
Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum	
Anticoagulants oraux : Warfarine - Sérum	
Anticorps anti cholinesterase	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Anticorps - anti -GD1a	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GD1a	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GD2	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GD2	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GD3	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GD3	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GM2	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GM2	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GM3	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GM3	Anticorps anti-glycolipides - sérum

Anticorps - anti -GM4	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GM4	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GT1a	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GT1a	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti -GT1b	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti -GT1b	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps - anti-GD1b	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps - anti-NXP2 (p140/MJ)	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps - anti-SAE1	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps - anti-SAE2	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps - anti-sulfatides	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps -anti -sulfatides	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anit-ADN natif	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
Anticorps anti - aquaporine 4	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
anticorps anti 2 glycoprotéine 1 IgG	Anticorps anti-phospholipides - sérum
anticorps anti 2 glycoprotéine 1 IgM	Anticorps anti-phospholipides - sérum
Anticorps anti - interféron alpha	Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum
Anticorps anti - interféron bêta	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
Anticorps anti - périnucléaires	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti - PM1	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti Adenyl cyclase	Coqueluche - sérologie
Anticorps anti adn bicatenaire	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
Anticorps anti antigènes nucléaires solubles	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti cardiolipides syphillis	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Anticorps anti cervelet/Anticorps anti PCA2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti cervelet/Anticorps anti PCA2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti heterophylle mononucleose	Epstein Barr Virus - EBV - MNI test - sérum
Anticorps anti membrane basale rein	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
Anticorps anti membrane basale tubulaire	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
Anticorps anti récepteur ganglionnaire	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Anticorps anti récepteur nicotinique	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Anticorps anti ribonucleoproteine	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti Rickettsia conorii, typhi - IgG	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Anticorps anti striataux	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Anticorps anti virus morbilleux IgG	Rougeole IgG - Index de synthèse intrathécal - LCR + sérum
Anticorps anti virus morbilleux IgG/IgM	Rougeole - sérologie IgG/IgM - sérum
Anticorps anti zone pellucide	Anticorps anti-ovaires - sérum
Anticorps anti- thyroestimuline	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
Anticorps anti-21 Hydroxylase - sérum	
Anticorps anti-3-hydroxy-3-methylglutaryl-coenzyme A réductase	Anticorps anti-HMGCR - sérum
Anticorps anti-actine -	Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum
Anticorps anti-actine - dépistage	Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum
Anticorps anti-actine - typage - sérum	
Anticorps anti-ADN double brin	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum	
Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum	
Anticorps anti-Amphiphysine	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-Amphiphysine	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-Annexine V - IgG - sérum	
Anticorps anti-ANS	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-Anti-Peptide déamidé de la gliadine	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
Anticorps anti-Anti-Peptide déamidé de la gliadine	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
anticorps anti-AQP4	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
Anticorps anti-ARN polymérase III (sous unités RP 11 et 155)	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-ARNt synthétases	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-B2GP1 - IgG	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum
Anticorps anti-B2GP1 - IgM	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum
Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum	

Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum	
Anticorps anti-BPAG1	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Anticorps anti-BPAG2	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Anticorps anti-C1q - sérum	
Anticorps anti-Calcium Sensing Receptor	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Anticorps anti-Calcium Sensor	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Anticorps anti-canaux calciques - sérum	
Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - LCR	
Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum	
Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum	
Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum	
anticorps anti-cardiolipine IgG	Anticorps anti-phospholipides - sérum
anticorps anti-cardiolipine IgM	Anticorps anti-phospholipides - sérum
Anticorps anti-cartilage	Anticorps anti-collagène type II - sérum
Anticorps anti-Caspr2	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - LCR
Anticorps anti-Caspr2	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum
Anticorps anti-CaSR	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Anticorps anti-CCP	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-cellules de Leydig	Anticorps anti-testicules - sérum
Anticorps anti-cellules endothéliales - sérum	
Anticorps anti-cellules gastriques	Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum
Anticorps anti-cellules pariétales	Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum
Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum	
Anticorps anti-centromères	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Anticorps anti-centromères (sous unités A et B)	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-citrulline	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-collagène type II - sérum	
Anticorps anti-connectine	Anticorps anti-Titine - sérum
anticorps anti-CRMP5/CV2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-CV2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-CV2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-cytochrome P450 II D6 - dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
Anticorps anti-cytochrome P450 II D6 - typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum	
Anticorps anti-cytosol - LC1	Anticorps anti-tissus - sérum
Anticorps anti-cytosol - LC1 - confirmation - sérum	
Anticorps anti-cytosol - LC1 - dépistage - sérum	
Anticorps anti-desmogléine 1	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Anticorps anti-desmogléine 3	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Anticorps anti-DPG	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
Anticorps anti-ds-DNA	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
Anticorps anti-EJ	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et titrage -	
Anticorps anti-endomysium - IgA - sérum	
Anticorps anti-endomysium - IgG - sérum	
Anticorps anti-endomysium IgA - enfant - sérum	
Anticorps anti-enzyme streptococcique - ASLO	Anti-streptolysine - ASLO - sérum
Anticorps anti-EPO	Anticorps anti-érythropoïétine - sérum
Anticorps anti-érythrocytaires - recherche/identification	Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification
Anticorps anti-érythrocytaires Anti-RH1 titrage et microtitrage - sang total	
Anticorps anti-érythropoïétine - sérum	
Anticorps anti-facteur 4 plaquettaire	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Anticorps anti-facteur II - IgG	Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum
Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum	
Anticorps anti-facteur IX - recherche - plasma	
Anticorps anti-facteur V - recherche - plasma	
Anticorps anti-facteur VII - recherche - plasma	
Anticorps anti-facteur VIII - recherche - plasma	

Anticorps anti-facteur XI - recherche - plasma	
Anticorps anti-facteur XII - recherche - plasma	
Anticorps anti-FI	Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum
Anticorps anti-fibrillarine	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-filagrine	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-Francisella tularensis	Tularémie - Francisella tularensis - sérologie - sérum
Anticorps anti-GAD - LCR	
Anticorps anti-GAD - sérum	
Anticorps anti-GAD 65	Anticorps anti-GAD - sérum
Anticorps anti-GAD 67	Anticorps anti-GAD - LCR
Anticorps anti-gangliosides	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps anti-gangliosides	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anti-GD1b	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anti-glandes surrénales - sérum	
Anticorps anti-gliadine déamidée	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
anticorps anti-gliadine déaminée	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
Anticorps anti-gliadine déamidée	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum	
Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum	
Anticorps anti-gliadine déaminée	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
Anticorps anti-gliadine déaminée	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
Anticorps anti-gluten - IgA	Anticorps anti-endomysium IgA - enfant - sérum
Anticorps anti-gluten - IgA	Anticorps anti-endomysium - IgA - sérum
Anticorps anti-gluten - IgA	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum
Anticorps anti-gluten - IgG	Anticorps anti-endomysium - IgG - sérum
Anticorps anti-gluten - IgG	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum
Anticorps anti-glycolipides - LCR	
Anticorps anti-glycolipides - sérum	
Anticorps anti-GM1	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps anti-GM1	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anti-GP 210 - sérum	
anticorps anti-GPIIa	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
anticorps anti-GPIbIX	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
anticorps anti-GPIIbIIIa	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
Anticorps anti-GQ1b	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Anticorps anti-GQ1b	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anti-granuleux	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Anticorps anti-granulocytes	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Anticorps anti-H+ K+ ATPase	Anticorps anti-pompe à protons - sérum
Anticorps anti-hématies - recherche/identification	Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification
Anticorps anti-héparine	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Anticorps anti-hépatite C - sérologie dépistage	Hépatite C - sérologie dépistage - sérum
Anticorps anti-Hib	Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum
Anticorps anti-histones - sérum	
Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum	
Anticorps anti-HMG-coenzyme A réductase	Anticorps anti-HMGCR - sérum
Anticorps anti-HMGCR - sérum	
Anticorps anti-Hu	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-Hu	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-IA2	Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum
Anticorps anti-IgA - sérum	
Anticorps anti-Îlots de Langerhans - ICA - sérum	
Anticorps anti-Immunoglobulines A	Anticorps anti-IgA - sérum
Anticorps anti-Infliximab	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
Anticorps anti-insuline - sérum	
Anticorps anti-Jo1	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-kératine	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-Ku	Marqueurs des myosites - sérum

Anticorps anti-Ku	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum	
Anticorps anti-LDL oxydées - IgG et/ou IgM - sérum	
Anticorps anti-leucoplaquettaires	Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum
Anticorps anti-Lgi1	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum
Anticorps anti-LKM1 - dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
Anticorps anti-LKM1 - typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique	Anticorps anti-tissus - sérum
Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum	
Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum	
Anticorps anti-LP/ SLA	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
Anticorps anti-M2	Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum
Anticorps anti-M2 - typage	Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum
Anticorps anti-Ma2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-Ma2	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-MAG - sérum	
Anticorps anti-MBG	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
Anticorps anti-MDA-5/CADM 140	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum	
Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage (BPAg2/	
Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum	
Anticorps anti-MGT30	Anticorps anti-Titine - sérum
Anticorps anti-Mi2	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-microsome du foie et du rein - LKM1 - dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
Anticorps anti-microsome du foie et du rein - LKM1 - typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
Anticorps anti-microsome thyroïdien	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
Anticorps anti-mitochondries	Anticorps anti-tissus - sérum
Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum	
Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum	
Anticorps anti-MPO	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum	
Anticorps anti-muscle lisse	Anticorps anti-tissus - sérum
Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum	
Anticorps anti-muscle strié - sérum	
Anticorps anti-MuSK - sérum	
Anticorps anti-Myelin Associated Glycoprotein	Anticorps anti-MAG - sérum
Anticorps anti-myéline - sérum	
Anticorps anti-myéloperoxydase	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Anticorps anti-myéloperoxydase	Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum
Anticorps anti-myosine	Anticorps anti-muscle strié - sérum
Anticorps anti-NA1	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Anticorps anti-Natalizumab - sérum	
Anticorps anti-NC16A	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - LCR	
Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum	
Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR	
Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum	
Anticorps anti-Neuropile - LCR	
Anticorps anti-NMO	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
Anticorps anti-NOR 90	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-noyau des cellules gliales	Anticorps anti-SOX1 - LCR
Anticorps anti-noyau des cellules gliales	Anticorps anti-SOX1 - sérum
Anticorps anti-noyaux	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Anticorps anti-NR2 glutamate receptors	Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR
Anticorps anti-nucléaires - sérum	
Anticorps anti-nucléosome - sérum	
Anticorps anti-OJ	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-ovaires - sérum	

Anticorps anti-pancréas endocrine	Anticorps anti-Îlots de Langerhans - ICA - sérum
Anticorps anti-pancréas exocrine - sérum	
Anticorps anti-PDGFR	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-PDH	Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum
Anticorps anti-PE - IgG	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgG - sérum
Anticorps anti-PE - IgM	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgM - sérum
Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum	
Anticorps anti-peptides cycliques citrullinés	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma	
Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgG - sérum	
Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgM - sérum	
Anticorps anti-phospholipides	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum
Anticorps anti-phospholipides	Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum
Anticorps anti-phospholipides	Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum
Anticorps anti-phospholipides - sérum	
Anticorps anti-phospholipides	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum
Anticorps anti-PL12	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-PL7	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-PLA2R - sérum	
Anticorps anti-plaque motrice	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification	
Anticorps anti-PM100	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-PM /Scl (sous unités 75 et 100)	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-PM75	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-PMScl	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-polynucléaires	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles	
Anticorps anti-pompe à protons - sérum	
Anticorps anti-PR3	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum	
Anticorps anti-profilagrine	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Anticorps anti-protéinase 3	Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum
Anticorps anti-Protéinase 3	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Anticorps anti-protéine 7A de la thrombospondine	Anticorps anti-THSD7A - sérum
Anticorps anti-protéine transporteuse du zinc	Anticorps anti-ZNT8 - sérum
Anticorps anti-prothrombinase	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum	
Anticorps anti-pyruvate deshydrogénase	Anticorps anti-mitochondries - typage - sérum
Anticorps anti-rabiques	Rage - sérologie - sérum
Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum	
Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum	
Anticorps anti-récepteur de l'asialoglycoprotéine - sérum	
Anticorps anti-récepteur NMDA - LCR	
Anticorps anti-récepteur NMDA - sérum	
Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum	
Anticorps anti-récovérine	Anticorps anti-rétine-recovérine - sérum
Anticorps anti-Remicade®	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
Anticorps anti-réticulum endoplasmique - dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
Anticorps anti-réticulum endoplasmique - typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
Anticorps anti-rétine-recovérine - sérum	
Anticorps anti-Ri	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-Ri	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-ribosomes - sérum	
Anticorps anti-Rnp	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-Ro	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae - IgG/IgA - sérum	
Anticorps anti-Scl-70	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-Scl70	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et

Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum	
Anticorps anti-SLA/LP	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
Anticorps anti-Sm	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-SOX1 - LCR	
Anticorps anti-SOX1 - sérum	
Anticorps anti-spermatozoïdes - recherche indirecte	
Anticorps anti-sphingolipides	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Anticorps anti-SRP	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-SSA, anti-SSB	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-surrénales	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
Anticorps anti-synapses neurologiques (anti- NMDAR, AMPAR1, AMPAR 2, Lgi1, Caspr2,	
Anticorps anti-T3 - triiodothyronine	
Anticorps anti-T4 - thyroxine	
Anticorps anti-testicules - sérum	
Anticorps anti-tétaniques	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Anticorps anti-tétanos - contrôle vaccination	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Anticorps anti-TG	Anticorps anti-thyroglobuline - sérum
Anticorps anti-THSD7A - sérum	
Anticorps anti-Th/To	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum
Anticorps anti-thyroglobuline - sérum	
Anticorps anti-thyroïdiens	Anticorps anti-thyroglobuline - sérum
Anticorps anti-thyroïdiens	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum	
Anticorps anti-thyroxine	Anticorps anti-T4 - thyroxine
Anticorps anti-TIF p155/140	Marqueurs des myosites - sérum
Anticorps anti-tissus - sérum	
Anticorps anti-Titine - LCR	
Anticorps anti-Titine - sérum	
Anticorps anti-topoisomérase - dépistage	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-toxine diphtérique	Diphtérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Anticorps anti-Toxoplasma gondii - IgG/IgM	Toxoplasmose - sérologie IgG/IgM - sérum
Anticorps anti-TPO	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum	
Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum	
Anticorps anti-Tr(DNER) - LCR	
Anticorps anti-Tr(DNER) - sérum	
Anticorps anti-Trichinella spiralis - sérologie confirmation	Trichinellose - sérologie confirmation - sérum
Anticorps anti-Trichinella spiralis - sérologie IgG	Trichinellose - sérologie IgG - sérum
Anticorps anti-triiodothyronine	Anticorps anti-T3 - triiodothyronine
Anticorps anti-Trypanosoma brucei gambiense	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
Anticorps anti-Trypanosoma brucei gambiense	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
Anticorps anti-Trypanosoma cruzi	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum	
Anticorps anti-U1RNP	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Anticorps anti-VGCC	Anticorps anti-canaux calciques - sérum
Anticorps anti-VGKC	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - LCR
Anticorps anti-VGKC	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum
Anticorps anti-VZV IgM	Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum
Anticorps anti-Yersinia Outer Protein	Anticorps anti-YOP - IgG - sérum
Anticorps anti-Yo	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps anti-Yo	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps anti-YOP - IgG - sérum	
Anticorps anti-ZIC4 - LCR	
Anticorps anti-ZIC4 - sérum	
Anticorps anti-ZNT8 - sérum	
Anticorps antistreptodornase	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
Anticorps antistreptolysine O	Anti-streptolysine - ASLO - sérum
Anticorps cytotoxiques	Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum

Anticorps IgG anti-VHE	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
Anticorps IgM - VHA	Hépatite A - anticorps IgM - sérum
Anticorps IgM anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
Anticorps IgM anti-VHD	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
Anticorps IgM anti-VHE	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
Anticorps immuns du système ABO - anti-A anti-B - dépistage et titrage - sérum	
Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum	
Anticorps onco-neuronaux	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - LCR
Anticorps onco-neuronaux	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Anticorps totaux - VHA	Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum
Anticorps totaux anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
Anticorps totaux anti-HBe	Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum
Anticorps totaux anti-HBs - titrage	Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum
Anticorps totaux anti-VHD	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
Anticorps totaux IgG + IgM	Anguillulose - sérologie - sérum
Antidépresseurs - recherche - identification - dosage - urines	
Antidépresseurs recherche - identification - sans dosage - Sérum	
Antidépresseurs tricycliques	Antidépresseurs - recherche - identification - dosage - urines
Antidépresseurs tricycliques	Antidépresseurs recherche - identification - sans dosage - Sérum
Antidiurétique hormone	ADH - Hormone antidiurétique
Antidiurétique hormone	ADH - Hormone antidiurétique - urine
Antigène - Helicobacter pylori	Helicobacter pylori - antigène - Selles
Antigène Australia	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
Antigène Beta-D-Glucan - recherche	
Antigène CA 125 - liquide de ponction	
Antigène CA 125 - sérum	
Antigène CA 15-3 - liquide de ponction	
Antigène CA 15-3 - sérum	
Antigène CA 19-9 - liquide de ponction	
Antigène CA 19-9 - sérum	
Antigène CA 50 - sérum	
Antigène CA 72-4 - liquide de ponction	
Antigène CA 72-4 - sérum	
Antigène Carcino Embryonnaire	ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - liquide de ponction
Antigène Carcino Embryonnaire	ACE - Antigène Carcino Embryonnaire - sérum
Antigène Cyfra 21-1 - liquide de ponction	
Antigène Cyfra 21-1 - sérum	
Antigène de la protéine C	Protéine C - antigène - plasma
Antigène de la protéine S libre	Protéine S libre - antigène - plasma
Antigène de la protéine S totale	Protéine S totale - antigène - plasma
Antigène Delta	Hépatite Delta - antigène - sérum
Antigène HBe	Hépatite B - antigène HBe - sérum
Antigène HBs	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
Antigène HBs quantification	Hépatite B - antigène HBs - quantitatif - sérum
Antigène HBs titrage	Hépatite B - antigène HBs - quantitatif - sérum
Antigène HIV 1	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
Antigène HLA B27	HLA B27 - génotypage - sang total
Antigène Legionella pneumophila	Légionellose antigène LP1 - urines
Antigène P25	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction	
Antigène SCC - TA4 - sérum	
antigène soluble	Candida - antigène mannane - sérum
Antigène soluble - Aspergillus fumigatus	Aspergillose - antigène soluble - recherche - LBA
Antigène soluble - Aspergillus fumigatus	Aspergillose - antigène soluble - recherche - sérum
Antigène soluble de cryptocoque	Cryptococcus neoformans - antigène soluble - recherche
Antigène soluble de Legionella pneumophila	Légionellose antigène LP1 - urines
Antigène spécifique prostatique libre	PSA - Antigène spécifique prostatique libre - sérum
Antigène spécifique prostatique total	PSA - Antigène spécifique prostatique total - liquide de ponction

Antigène spécifique prostatique total	PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum
Antigène TA4	Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction
Antigène TA4	Antigène SCC - TA4 - sérum
Antigène TAG 72	Antigène CA 72-4 - liquide de ponction
Antigène TAG 72	Antigène CA 72-4 - sérum
Antigène tissulaire polypeptidique	TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum
Antigène VIH 1	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - LCR	
Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - urines	
Antigènes érythrocytaires hors rhésus Kell	Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total
Antigènes leucoplaquettaires HLA B27	HLA B27 - génotypage - sang total
Antigènes leucoplaquettaires HLA de classe I	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Antigènes leucoplaquettaires HLA de classe II	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
Antigènes Rhésus/Kell	Phénotype RH-KEL1 - Sang total
Anticorps anti-LgJ1	Anticorps anti-canaux potassiques / LgJ1 Caspr2 - LCR
Antiplasmine alpha-2	Alpha-2 Antiplasmine - activité - plasma
Antithrombine - activité	Antithrombine - activité fonctionnelle - plasma
Antithrombine - activité fonctionnelle - plasma	
Antithrombine - antigène - plasma	
Antithrombine - antigène ou pondéral	Antithrombine - antigène - plasma
Antitrypsine alpha -1	Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum
Antitrypsine alpha -1 - clairance	Alpha-1 Antitrypsine - clairance
AP50	Temps d'hémolyse 50 - Complément voie alterne - sérum
Aparoxal	Phénobarbital - sérum
APC	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
APC	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
APC virus	Adénovirus - recherche - Selles
APC virus	Adénovirus - sérologie - sérum
APCAM	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Apixaban(Eliquis ®) - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma	
Apo A1	Apolipoprotéine A1 - sérum
Apo A1	Juvenalis - Apolipoprotéines A1 - sérum
Apo B	Apolipoprotéine B - sérum
Apo B	Juvenalis - Apolipoprotéines B - sérum
Apo C3	Apolipoprotéine C3 - sérum
Apo E - génotypage	Apolipoprotéine E - génotypage
Apolipoprotéine A1 - sérum	
Apolipoprotéine B - sérum	
Apolipoprotéine C3 - sérum	
Apolipoprotéine E - génotypage	
APTT	Temps de céphaline activé - TCA - plasma
APTT, activated partial thromboplastin time	Temps de céphaline activé - TCA - plasma
Arbovirose	Chikungunya - sérologie IgG/IgM - sérum
Arbovirose	Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum
Arbovirose	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Arboviroses	Zika - sérologie - sérum
Arginine - Vasopressine	ADH - Hormone antidiurétique
Arginine - Vasopressine	ADH - Hormone antidiurétique - urine
Aripiprazole	
Arixtra® - anti-Xa	Activité anti-Xa : Fondaparinux - Arixtra - plasma
ARN - VHD	Hépatite Delta - charge virale - PCR
ARN ribosomal 16S	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
ARNt synthétases - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
ARP	Rénine active
Arsenic - inorganique et métabolites - urines	
Artane®	Trihétéroxyphényl - Sérum
Arythmie cardiaque	Exome cardiogénétique
ASCA	Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae - IgG/IgA - sérum

Ascaridiose - sérologie - sérum	
Ascaris	Ascaridiose - sérologie - sérum
ASD	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
ASDB	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
ASDOR	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
AshTest®	NASH-FibroTest - sérum
ASHTEST	FIBROMAX - non remboursé - sérum
ASHTEST	FIBROMAX - remboursé - sérum
Asialotransferrine	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Asialotransferrine	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
ASLO	Anti-streptolysine - ASLO - sérum
ASMA	Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum
Aspergilliose	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Aspergilliose	Champignon - Levures - recherche
Aspergilliose - antigène soluble - recherche - LBA	
Aspergilliose - antigène soluble - recherche - sérum	
Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum	
Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum	
Aspergillus	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Aspergillus	Champignon - Levures - recherche
Aspergillus flavus	Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum
Aspergillus flavus	Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum
Aspergillus fumigatus	Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum
Aspergillus fumigatus	Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum
Aspergillus nidulans	Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum
Aspergillus nidulans	Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum
Aspergillus niger	Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum
Aspergillus niger	Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum
Aspergillus versicolor	Aspergilliose - sérologie confirmation - sérum
Aspergillus versicolor	Aspergilliose sérologie dépistage IgG - sérum
Astrocytome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Astrovirus	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Astrovirus/Sapovirus	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
AT - antigène ou pondéral	Anti-thrombine - antigène - plasma
Atarax®	Hydroxyzine - Sérum
Atazanavir - Sérum	
Athymil®	Miansérine - Sérum
ATM	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
ATM	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
ATM	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
ATM	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Avidité des anticorps - rubéole	Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum
Avidité des anticorps IgG - CMV	Cytomégalovirus - CMV - Test de mesure d'avidité des IgG - sérum
Avidité des IgG anti-Toxoplasma gondii	Toxoplasmose - avidité anticorps - IgG - sérum
Avlocardyl®	Propranolol - Sérum
AVM	Acide vanylmandélique - Urine
Avonex	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
Axepim®	Cefépime - sérum
Axérophtol	Vitamine A - Rétinol - Plasma
B19 - diagnostic direct - PCR	Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR
B19 - sérologie IgG	Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum
B19 - sérologie IgG/IgM	Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum
B2M	Bêta 2 Microglobuline - LCR
B2M	Bêta 2 Microglobuline - sérum
B2M	Bêta 2 Microglobuline - Urines
Babesia	Babésiose humaine - sérologie - sérum
Babésiose humaine - sérologie - sérum	
Bacille de Bordet-Gengou	Coqueluche - Bordetella pertussis et parapertussis - diagnostic direct - PCR

Bacille d'Eberth	Salmonellose - sérologie - sérum
Baclofène - Sérum	
Bactérie aérobie / anérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice	Bactérie aérobie / anérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Bactérie aérobie / anérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice	
Bactérie aérobie - antibiogramme	
Bactérie aérobie - recherche	
Bactérie anaérobie - antibiogramme	
Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR	
Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche	
BAP1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
BAP1	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
BAP1	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
BAP1	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Baraclude	Entecavir - plasma
Barbitémie	Phénobarbital - sérum
Barbiturique	Phénobarbital - sérum
Barnetil®	Sultopride - Sérum
Bartonella	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
Bartonella	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
Bartonelle	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum	
Bartonellose - diagnostic direct - PCR	
Basic Check	Juvenalis - Panel - BasicCheck
Béagyne®	Fluconazole - Sérum
Bence Jones - recherche	
Bence Jones Kappa	Chaînes légères libres Kappa - sérum
Bence Jones Kappa	Chaînes légères libres Kappa - urines
Bence Jones Lambda	Chaînes légères libres Lambda - sérum
Bence Jones Lambda	Chaînes légères libres Lambda - urines
Bendrofluméthiazide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Benepali ®	Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Benzo	Benzodiazépines - recherche sans identification - sérum
Benzodiazépines - identification - urines	
Benzodiazépines - recherche et identification - Sérum	
Benzodiazépines - recherche sans identification - sérum	
Benzodiazépines - recherche sans identification - urines	
Benzoylécgonine	Cocaïne confirmation - dosage sanguin
Benzoylécgonine	Cocaïne - confirmation - urines
Benzoylécgonine	Cocaïne - dépistage - urines
Bêta 2 GP1 - anticorps anti-	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgG - sérum
Bêta 2 GP1 - anticorps anti-	Anticorps anti-bêta 2 glycoprotéine 1 - B2GP1 - IgM - sérum
Bêta 2 Microglobuline - LCR	
Bêta 2 Microglobuline - sérum	
Bêta 2 Microglobuline - Urines	
Bêta carotène	
Beta Cross-Laps	Cross-laps
bêta glucosidase	Bêta glucosidase - Tâches de sang EDTA sur buvard
Bêta glucosidase - Tâches de sang EDTA sur buvard	
Bêta HCG - chaîne libre	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
Bêta HCG - holo-HCG	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
Bêta interféron - neutralizing antibody	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
Beta-cryptoxanthine	Caroténoïdes
Bétahydroxybutyrate	Corps cétoniques - Surnageant de défécats sanguin ou LCR
Bevacizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
BGP	Ostéocalcine - sérum
Bictégravir - sérum	
Big Big prolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Big prolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum

Biktarvy	Bictégravir - sérum
Bilharzie	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Bilharziose	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Bilharziose - diagnostic direct - PCR	
Bilharziose - sérologie confirmation - sérum	
Bilharziose - sérologie dépistage - sérum	
Bilirubine - totale - libre - conjuguée - sérum	
Biomarqueur	Test moléculaire non invasif pour le suivi du cancer de la vessie (Test Xpert Bladder)
Biotine	Vitamine B8 ou H - Biotine
Bipéridène - sérum	
BK	Mycobactéries - PCR M. tuberculosis complex (BKBM)
BK - antibiogramme	Mycobactéries - antibiogramme
BK - culture	Mycobactéries - culture
BK - examen direct	Mycobactéries - examen direct
BK - identification	Mycobactéries - identification
BK - identification	Mycobacterium tuberculosis - identification
BK - PCR	Mycobactéries - PCR M. tuberculosis complex (BKBM)
Blastes	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Blitzima®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
BLSE	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
BMPR1A	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
BMPR1A	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
BNP - Brain Natriuretic Peptide - plasma	
BOC (bandes oligoclonales)	Focalisation isoélectrique - LCR + sérum
Bocavirus	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Bocéprévir - plasma	
Bone Gla Protéin	Ostéocalcine - sérum
Bone specific alkaline phosphatase	Phosphatases alcalines osseuses
Bordet-Gengou	Coqueluche - sérologie
Bordetella pertussis	Coqueluche - Bordetella pertussis et parapertussis - diagnostic direct - PCR
Bordetella pertussis	Coqueluche - sérologie
Bordetella pertussis	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Bore - urines	
Borrelia	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
Borrelia	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum
Borrelia	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR
Borrelia	Borréliose - diagnostic direct - PCR
Borrelia	Borréliose - sérologie confirmation IgG
Borrelia	Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum
Borréliose - diagnostic direct - PCR	
Borréliose - sérologie confirmation IgG	
Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum	
Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum	
Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR	
Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum	
Botulisme	Toxine botulique - Clostridium botulinum - botulisme
BP 180 - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BP 230 - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
bp180	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BP180	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BP230	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BPAG1	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BPAG1 - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
BPAG2 - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Brain Natriuretic Peptide	BNP - Brain Natriuretic Peptide - plasma
BRB	Bilirubine - totale - libre - conjuguée - sérum
BRCA1	Exome Oncogénétique
BRCA1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-

BRCA1	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
BRCA1	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
BRCA1	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
BRCA2	Exome Oncogénétique
BRCA2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
BRCA2	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
BRCA2	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
BRCA2	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Breath test	Helicobacter pylori - test respiratoire à l'Urée 13C - air expiré
Brintellix®	Vortioxétine - Sérum
Bristopen®	Oxacilline - Sérum
BRK1	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Bromadiolone	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Bromazépam - Sérum	
Brucella melitensis	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
Brucellacapt	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
Brucellose	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
Brucellose - recherche	Bactérie aérobie - recherche
Brucellose - sérologie confirmation - sérum	
Brucellose - sérologie dépistage - sérum	
brucellose confirmation	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
Buflomédil - sérum	
Bumétamide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Bupivacaïne - Sérum	
Buprénorphine - Sérum	
Buprénorphine et métabolites - urines	
burgdorferi	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum
burgdorferi	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR
burgdorferi	Borréliose - diagnostic direct - PCR
burgdorferi	Borréliose - sérologie confirmation IgG
burgdorferi	Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum
Burgdorferi	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
Burkitt	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
Burkitt	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
Butylcellulose	Acide butoxyacétique - urines
Butyrylcholinestérase	Cholinestérase - activité enzymatique - sérum
BW	Syphilis - titrage - LCR
BW - dépistage	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
BWQ	Syphilis - titrage - LCR
BZD	Benzodiazépines - identification - urines
BZD	Benzodiazépines - recherche et identification - Sérum
BZD	Benzodiazépines - recherche sans identification - sérum
BZD	Benzodiazépines - recherche sans identification - urines
C1 - Inh	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral
C1 - Inh	C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum
C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral	
C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum	
C1 inhibiteur fonctionnel	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral
C Peptide	Peptide C - sérum
C Peptide	Peptide C - Urines
C1q - anticorps anti-	Anticorps anti-C1q - sérum
C1q - fraction du complément - sérum	
C2 - fraction du complément - sérum	
c-erbB-2	HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - Protéine c-erbB-2 - sérum
C-Reactive Protein	CRP - Protéine C Réactive - sérum
C-Reactive Protein - ultrasensible	CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
C-Reactive Protein - ultrasensible	Juvenalis - CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
C3 - fraction du complément - sérum	

C3 NeF - Facteur néphritique - sérum	
C3PA	Facteur B - fraction du complément - sérum
C4 - fraction du complément - sérum	
C5 - fraction du complément - sérum	
C9 - fraction du complément - sérum	
CA 125	Antigène CA 125 - liquide de ponction
CA 125	Antigène CA 125 - sérum
CA 15-3	Antigène CA 15-3 - liquide de ponction
CA 15-3	Antigène CA 15-3 - sérum
CA 19-9	Antigène CA 19-9 - liquide de ponction
CA 19-9	Antigène CA 19-9 - sérum
CA 50	Antigène CA 50 - sérum
CA 72-4	Antigène CA 72-4 - liquide de ponction
CA 72-4	Antigène CA 72-4 - sérum
CAA	Acides aminés - chromatographie
CAA	Acides aminés - chromatographie - urine
Cachectine	Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
Cachectine	TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
Calcidiol	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Calcidiol	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Calcitonine - liquide de ponction	
Calcitonine - sérum	
Calcitriol	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
Calcium ionisé	
Calcium libre	Calcium ionisé
Calcium Sensing Receptor - anticorps anti-	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Calcul artériel	Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge
Calcul biliaire	Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge
Calcul de risque de prééclampsie	Prééclampsie - Estimation du risque - sérum
Calcul salivaire	Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge
Calcul urinaire	Calcul Urinaire - analyse morphologique et infrarouge
Calcul Urinaire - analyse morphologique et infrarouge	
Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge	
Calicivirus	Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles
Calicivirus	Norovirus - recherche - Selles
Campylobacter - recherche	Bactérie aérobie - recherche
Campylobacter (C. jejuni/coli/upsaliensis)	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Canalopathie	Exome cardiogénétique
Canaux calciques - anticorps anti-	Anticorps anti-canaux calciques - sérum
Canaux potassiques - anticorps anti-	Anticorps anti-canaux potassiques / Lgi1 Caspr2 - sérum
Cancer	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Cancer	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Cancer	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Cancer	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Cancer	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Cancer	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Cancer	Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1
Cancer	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Cancer	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
CANCER	Exome Oncogénétique
CANCER COLORECTAL	Exome Oncogénétique
CANCER DIGESTIF	Exome Oncogénétique
Candida	Candida - antigène mannane - sérum
Candida	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Candida	Champignon - Levures - recherche
Candida	Levures - antifongogramme - prélèvements divers
Candida - antigène mannane - sérum	
Candida albicans - sérologie confirmation - sérum	

Candida albicans - sérologie dépistage - sérum	
Candidose	Candida albicans - sérologie confirmation - sérum
Candidose	Candida albicans - sérologie dépistage - sérum
Candidose	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Candidose	Champignon - Levures - recherche
Candidose	Levures - antifongogramme - prélèvements divers
Cannabidiol	Cannabis - confirmation - urines
Cannabinoides	Cannabis confirmation - dosage sanguin
Cannabinoides	Cannabis - confirmation - urines
Cannabis - cheveux	
Cannabis - confirmation - urines	
Cannabis - urines	
Cannabis confirmation - dosage sanguin	
Canrénone	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Canthaxanthine	Caroténoïdes
CAO	Acides organiques - quantitatif - urine
CAP RAST IgE spécifiques - mélange de pneumallergènes	IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes
CAP RAST IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique	IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor
CAP RAST IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique	IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia
CAP RAST IgE spécifiques - trophallergènes - allergène unique	IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia
CAP RAST IgE spécifiques - trophallergènes mélange	IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum
CAP RAST IgE spécifiques - venins d'hyménoptère	IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique
Capacité totale de fixation de la transferrine	Fer - capacité totale de fixation - sérum
CAR - index - Salive	
CAR Antigène	Anticorps anti-rétine-recovérine - sérum
Carbamazépine - sérum	
Carbapenemase	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Carbocaïne®	Mépivacaïne - sérum
Carbohydate Déficient Transferrin	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Carbohydate Déficient Transferrin	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Carboxyhémoglobine	Oxyde de carbone - sang total
Carbutamide	Sulfamides hypoglycémisants - sérum
Carbutamide	Sulfamides hypoglycémisants - urines
Cardiolipine - anticorps anti-	Anticorps anti-cardiolipine - IgG - sérum
Cardiolipine - anticorps anti-	Anticorps anti-cardiolipine - IgM - sérum
Cardiopathie dilatée	Exome cardiogénétique
Cardiopathie hypertrophique	Exome cardiogénétique
Carotène	Bêta carotène
Carotènes alpha	Caroténoïdes
Carotènes beta	Caroténoïdes
Caroténoïdes	
Caryotype acquis	Caryotype hématologique
Caryotype hématologique	
Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal	
Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche	
Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total	
CaSR - anticorps anti-	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Catécholamines - dérivés méthoxylés	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Catécholamines - dérivés méthoxylés	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Catécholamines - dérivés méthoxylés	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Catécholamines - libres - Urines	
Catécholamines libres	
Catécholamines libres - enfant - urines	
CBD	Cannabis - confirmation - urines
CBG	CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum
CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum	
CCP - anticorps anti-	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
CD19	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total

CD Tect	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
CD Tect	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
CD20	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
CD3+	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
CD3/CD4/CD8	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
CD55	Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total
CD56	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
CD59	Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total
CDDP	Cisplatine - sérum
CDH1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CDH1	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
CDH1	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
CDH1	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
CDK4	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CDK4	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
CDKN2A	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CDKN2A	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
CDKN2A	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
CDKN2B	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CDKN2B	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
CDT	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
CDT	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
CDT- IFCC	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
CDT-IFC	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Cefépime - sérum	
Cefotaxime - Sérum	
Ceftazidime - Sérum	
Ceftriaxone - Sérum	
Célectol®	Celiprolol - sérum
Celiprolol - sérum	
Cellcept®	Mycophénolate - plasma
Cellules de Hargrave	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Cellules de Leydig - anticorps anti-	Anticorps anti-testicules - sérum
Cellules de Sézary - recherche - frottis	
Cellules endothéliales - anticorps anti-	Anticorps anti-cellules endothéliales - sérum
Cellules NK	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
Celsentri	Maraviroc - Sérum
Centromères	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Céphalosporinase	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Certican®	Évérolimus
Certoizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
CgA	Chromogranine A
CGH	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
CGH	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
CGH	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
CGH -array	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
CGH-array	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
CGH-array	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
CH50 - Complément Hémolytique total	
Chaîne libre bêta-HCG	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
Chaînes légères libres Kappa - sérum	
Chaînes légères libres Kappa - urines	
Chaînes légères libres Lambda - sérum	
Chaînes légères libres Lambda - urines	
Champignon	Levures - antifongogramme - prélèvements divers
Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice	
Champignon - Levures - identification	
Champignon - Levures - recherche	

Champignon dysmorphiques	Champignon - Levures - recherche
Champignon filamenteux	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Champignon filamenteux	Champignon - Levures - recherche
Chancre	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
Chancre mou	Haemophilus ducreyi - recherche
Chanvre indien	Cannabis - urines
Charge virale ARN VIH1	VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
CHEK2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CHEK2	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Chikungunya - sérologie IgG/IgM - sérum	
Chimie des selles	Examen chimique - selles
Chitotriosidase - activité - plasma	
Chlamydia	Chlamydia pneumoniae - diagnostic direct - PCR
Chlamydia pneumoniae	Chlamydia pneumoniae - sérologie IgG/IgM - sérum
chlamydia psittaci	Chlamydia psittaci - sérologie - sérum
Chlamydia trachomatis	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Chlamydia trachomatis - sérologie IgA - sérum	
Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum	
Chlamydia trachomatis - sérologie IgM - sérum	
Chlamydia trachomatis seul	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Chlamydia pneumoniae - diagnostic direct - PCR	
Chlamydia pneumoniae - sérologie IgG/IgM - sérum	
Chlamydia psittaci - sérologie - sérum	
Chlamydia psittaci - sérologie IgA - sérum	
Chlordecone	Pesticides - recherche et/ou dosage
Chlordecone	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Chlordiazépoxide - Sérum	
Chloroforme	Trichlorométhane - sang total
Chlorophacinone	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Chloroquine - Sérum	
Chlorpromazine - Sérum	
Chlorpropamide	Sulfamides hypoglycémisants - sérum
Chlorpropamide	Sulfamides hypoglycémisants - urines
Chlortalidone	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Chlorure de méthylène	Dichlorométhane - urines
Cholalémie	Acides biliaires - sérum
Cholécalciférol - vitamine D3	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Cholécalciférol - vitamine D3	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Choléra - recherche	Bactérie aérobie - recherche
Cholestérol HDL - sérum	
Cholestérol LDL direct - sérum	
Cholestérol oxydé	Juvenalis - LDL oxydés - sérum
Cholestérol oxydé	LDL Oxydés - sérum
Cholinestérase - activité enzymatique - sérum	
Choriogonadotropine - molécule entière	hCG molécule dimère (Alpha + Béta) - sérum
Choriorétinite birdshot - rétinopathies - maladie de Behçet	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Chromatine	Anticorps anti-nucléosome - sérum
Chromatographie de la prolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Chromatographie des acides gras érythrocytaires	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Chromatographie des acides gras érythrocytaires	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Chromogranine A	
Chymotrypsine	
CIA	Exome Malformations cardiaques congénitales
Cibenzoline - Sérum	
Ciclosporine	
Ciclosporine A	Ciclosporine
Ciflox®	Ciprofloxacine - Sérum
Cimzia®	Certolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

Cinquième maladie - diagnostic direct - PCR	Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR
Cinquième maladie - sérologie IgG	Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum
Cinquième maladie - sérologie IgG/IgM	Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum
Cipralan®	Cibenzoline - Sérum
Ciprofloxacine - Sérum	
Cis-Chlordane	Pesticides - recherche et/ou dosage
Cis-Chlordane	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
cis-diaminedichloroplatine	Cisplatine - sérum
Cisplatine - sérum	
Citrate	Acide citrique - plasma sérial
Citrate	Acide citrique - sérum
Citrate	Acide citrique - Urines
CIV	Exome Malformations cardiaques congénitales
CK MB	CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum
CK totale	CPK - Créatine phosphokinase totale - sérum
CKBB- isoenzymes	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
CKMM - isoenzymes	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
CLA30 - allergènes mixtes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes -
CLA30 - pneumallergènes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum
CLA30 - trophallergènes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum
Claforan®	Cefotaxime - Sérum
Clairance de l'eau libre	Eau libre - clairance
Clamoxil®	Amoxicilline - Sérum
Clarithromycine	Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR
Cleaving protease - Willebrand factor	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Clindamycine - Sérum	
Clobazam - Sérum	
Clomipramine - Sérum	
Clonazépam - Sérum	
Clopamide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Clopidogrel - test de résistance au	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Clopixol®	Zuclopenthixol - Sérum
Clorazépate - Sérum	
Clostridium botulinum	Toxine botulique - Clostridium botulinum - botulisme
Clostridium difficile : toxines A/B	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Clostridium difficile - Dépistage - recherche de glutamate déshydrogénase (GDH) (+toxines)	
Clostridium difficile - toxines - recherche par PCR	
Clostridium tetani - contrôle d'immunité - anticorps IgG	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Clotiazépam - sérum	
Cloxacilline - Sérum	
Clozapine	
CMI	Bactérie aérobie / anérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
CMV	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR
CMV	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
CMV	Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG/IgM - sérum
CMV	Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG - sérum
CMV	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
CMV - avidité des anticorps	Cytomégalovirus - CMV - Test de mesure d'avidité des IgG - sérum
CNV	Exome
CNV	Exome avec interface d'interprétation
CNV	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
CNV	Exome Malformations cardiaques congénitales
CNV	Exome Néphrologie
CNV	Exome Oncogénétique
CNV	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
CNV	Exome Prénatal
CNV	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
CNV	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,

CNV	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés : APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
CNV	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
CNV	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
CNV	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés : BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
CNV	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés : ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
CNV	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Cobalamine	Vitamine B12 - sérum
Cobalt	
Cobalt - urines	
Cobaltémie	Cobalt
Cobalturie	Cobalt - urines
Cobicistat - plasma	
Cocaïne - confirmation - urines	
Cocaïne - dépistage - urines	
Cocaïne confirmation - dosage sanguin	
Code OMIM : #105830 / #176270	Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - sang total -
code OMIM : #105830/ #176270	Angelman / Prader Willi - disomie uniparentale - identification mécanisme - liquide
code OMIM : #105830/ #176270	Angelman / Prader Willi - méthylation au locus SNRPN - prénatal
Code OMIM : #105830 / #176270	Angelman / Prader-Willi - méthylation au locus SNRPN - sang total
code OMIM : *142800/+142830	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Code OMIM : *142857 / *604305	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
Code OMIM : *176930	Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total
Code OMIM : *191740	UGT1A1 : recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347) - impliqué dans le
Code OMIM : *191740/ #143500	Syndrome de Gilbert - recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347)
Code OMIM : #274270 / *612779	Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines génotypage de la dihydropyrimidine
code OMIM : #300624 / *309550	X Fragile - syndrome - prénatal
code OMIM : #300624 / *309550	X Fragile - syndrome - sang total
code OMIM : *602421 / #219700	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - prénatal
Code OMIM : *602421/#219700	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - sang total
Code OMIM : *603202/ #223000	Intolérance primaire au lactose - caractérisation génétique - sang total
Code OMIM : *607093 / #236250	Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total
Code OMIM : *608107 / #249100	Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage
Code OMIM : *612309	Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total
Code OMIM : #613490 / *107400	Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations
Code OMIM : *613609 / #235200	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total
Code OMIM : *613609 / #235200	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total
Code OMIM : *613609 / #235200	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total
Codéine	Opiacés confirmation - dosage sanguin
Codéine - confirmation	Opiacés - confirmation - urines
Codéine - dépistage	Opiacés - dépistage - urines
Codéthylène	Opiacés confirmation - dosage sanguin
Codéthylène - confirmation	Opiacés - confirmation - urines
Codéthylène - dépistage	Opiacés - dépistage - urines
Codon 129 protéine prion - génotypage	Protéine 14.3.3 - LCR
Coefficient de saturation de la transferrine	Fer - coefficient de saturation - sérum
Coenzyme Q10	Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum
Coenzyme Q10	Juvenalis - Coenzyme Q10 - CoQ10
Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum	
Cofacteur de la Ristocétine	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
CoHb	Oxyde de carbone - sang total
Colchicine - Sérum	
Colchimax®	Colchicine - Sérum
Colimycine	Colistine - Sérum
Colistine - Sérum	
Collagène de type 7	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Collagène type II - anticorps anti-	Anticorps anti-collagène type II - sérum
Collagène type II bovin - anticorps anti-	Anticorps anti-collagène type II - sérum
Colon	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,

Colorectal	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Complément : fraction C5	C5 - fraction du complément - sérum
Complément : fraction C9	C9 - fraction du complément - sérum
Complément - C3 proactivateur	Facteur B - fraction du complément - sérum
Complément - Facteur B	Facteur B - fraction du complément - sérum
Complément - fraction C1q	C1q - fraction du complément - sérum
Complément - fraction C2	C2 - fraction du complément - sérum
Complément - fraction C3	C3 - fraction du complément - sérum
Complément - Fraction C4	C4 - fraction du complément - sérum
Complément C1 inhibiteur	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral
Complément C1 inhibiteur	C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum
Complément Hémolytique total	CH50 - Complément Hémolytique total
Complexes Immuns Circulants	Complexes Immuns Circulants - CIC - sérum
Complexes Immuns Circulants - CIC - sérum	
Complexes solubles	
Composé B	Corticostérol - Composé B - sérum
Composé E	Cortisone - Composé E - plasma
Composé E	Cortisone - Composé E - urines
Composé F	Cortisol - Composé F - salive
Composé F	Cortisol - Composé F - sérum
Composé F	Cortisol libre - Composé F - urines
Composé S	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
Concentrations minimales inhibitrices - bactérie aérobie et anaérobie	Bactérie aérobie / anaérobie - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Condylomes	Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible
Connectine - anticorps anti-	Anticorps anti-Titine - sérum
Coombs direct érythrocytaire - sang total	
Coombs indirect	Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification
Coombs plaquettaire	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
Coprologie fonctionnelle	Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles
Coproporphyrines	Porphyries érythrocytaires
Coproporphyrines	Porphyries - selles
Coproporphyrines	Porphyries - Urines
coqueluche	Coqueluche - sérologie
Coqueluche	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Coqueluche - Bordetella pertussis et parapertussis - diagnostic direct - PCR	
Coqueluche - sérologie	
Cordarone®	Amiodarone - sérum
Coronavirus	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
CoronaVirus Disease	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
CoronaVirus Disease	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
Coronavirus HKU1, NL63, 229E, OC43	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Coronavirus SARS-CoV-2	COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR
Coronavirus SARS-CoV-2	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR
Coronavirus SARS-CoV-2	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR - non remboursé
Coronavirus SARS-CoV-2	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
Coronavirus SARS-CoV-2	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
Corps cétoniques - Surnageant de défécate sanguin ou LCR	
Cortexolone	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
Corticostérol - 11-désoxy-	11 Désoxycorticostérol - sérum
Corticostérol - Composé B - sérum	
Corticotroline	ACTH - Corticotrophine
Corticosurrénales - anticorps anti-	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
Corticotrophine	ACTH - Corticotrophine
Corticotropine	ACTH - Corticotrophine
Cortisol - 21-désoxy	21 Désoxycortisol - sérum
Cortisol - Composé F - matin - salive	
Cortisol - Composé F - salive	
Cortisol - Composé F - sérum	

Cortisol - Composé F - soir - salive	
Cortisol - Composé F - soir - sérum	
Cortisol Awakening Response	CAR - index - Salive
Cortisol Awakening Response	Juvenalis - CAR - index - Salive
Cortisol binding globulin	CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum
Cortisol libre - Composé F - urines	
Cortisone - Composé E - plasma	
Cortisone - Composé E - urines	
Corynebacterium diphtheriae	Diphthérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Cotinine - urines	
Coumachlore	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Coumadine	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Coumadine®	Anticoagulants oraux : Warfarine - Sérum
Coumatétralyl	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
COVID	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
Covid-19	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
COVID-19	COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR
COVID-19	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR
COVID-19	COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR - non remboursé
COVID-19	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
COVID-19	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N
COVID-19	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR	
COVID-19 (SARS-CoV-2) - diagnostic direct - PCR - non remboursé	
COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie (Ig totales) anti-N	
COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S	
COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR	
Coxiella burnetii - phase 1 et 2 - sérologie - sérum	
Coxiella burnetii - sérologie - sérum	
CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum	
CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum	
CPK - Créatine phosphokinase totale - sérum	
CPK MB	CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum
Créatine phosphokinase - isoenzymes	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
Créatine phosphokinase MB	CPK - Créatine phosphokinase MB - sérum
Créatine phosphokinase totale	CPK - Créatine phosphokinase totale - sérum
Creutzfeldt-Jakob	Protéine 14.3.3 - LCR
Criblage	COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR
Crimidine	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Crixivan®	Indinavir - Sérum
Cross link	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
Cross-laps	
Cross-laps - urines	
CRP - Protéine C Réactive - sérum	
CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum	
CRP full range	CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
Cryoglobulines - identification - Sérum	
Cryptococcose	Champignon - Levures - recherche
Cryptococcus neoformans - antigène soluble - recherche	
Cryptocoque	Champignon - Levures - recherche
Cryptocoque - antigène soluble	Cryptococcus neoformans - antigène soluble - recherche
Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR	
Cryptosporidiose	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Cryptosporidium spp.	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Cryptosporidium spp.	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Cryptoxanthine beta	Caroténoïdes
CS2	Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines
CST	Fer - coefficient de saturation - sérum

CTF	Fer - capacité totale de fixation - sérum
CTX	Cross-laps
CTX	Cross-laps - urines
Cuivre	
Cuivre - urines	
Cuprémie	Cuivre
Cuprémie	Juvenalis - Cuivre
Cuprurie	Cuivre - urines
Cutanée	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Cyamémazine - Sérum	
Cyclospora cayetanensis	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Cyfra 21-1	Antigène Cyfra 21-1 - liquide de ponction
Cyfra 21-1	Antigène Cyfra 21-1 - sérum
Cymbalta	Duloxétine - sérum
Cymevean®	Ganciclovir - plasma
Cysticercose - sérologie confirmation	
Cysticercose - Taenia Solium - sérologie IgG - sérum	
Cytogénétique conventionnelle acquise	Caryotype hématologique
cytogénétique moléculaire acquise	Cytogénétique moléculaire hématologique - FISH
Cytogénétique moléculaire hématologique - FISH	
Cytokine	Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) - sérum
Cytokine	Interféron gamma - sérum
Cytokine	Interleukine IL -10 - liquide
Cytokine	Interleukine IL -10 - sérum
Cytokine	Interleukine IL-1 alpha - sérum
Cytokine	Interleukine IL-1 bêta - sérum
Cytokine	Interleukine IL-2 - récepteur - plasma
Cytokine	Interleukine IL-2 - sérum
Cytokine	Interleukine IL-4 - sérum
Cytokine	Interleukine IL-5 - plasma
Cytokine	Interleukine IL-6 - liquide
Cytokine	Interleukine IL-6 - sérum
Cytokine	Interleukine IL-8 - sérum
Cytokine	Juvenalis - Interleukine IL-1 alpha - sérum
Cytokine	Juvenalis - Interleukine IL-1 bêta - sérum
Cytokine	Juvenalis - Interleukine IL-6 - sérum
Cytokine	Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
Cytokine	Panel Cytokine - IL1 bêta, IL2, IL4 et IL6 - sérum
Cytokine	Protéine chimio attractive des monocytes (MCP-1) - sérum
Cytokine	TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
Cytomégalovirus	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR
Cytomégalovirus	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR	
Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique	
Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG - sérum	
Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG/IgM - sérum	
Cytomégalovirus - CMV - Test de mesure d'avidité des IgG - sérum	
Cytométrie	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Cytométrie	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Cytométrie	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
Cytométrie	Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total
Cytométrie en flux (CMF) des lymphocytes circulants	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - anticorps anti-	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Cytosol - LC1 - anticorps anti-	Anticorps anti-cytosol - LC1 - confirmation - sérum
Cytosol - LC1 - anticorps anti-	Anticorps anti-cytosol - LC1 - dépistage - sérum
D-Di	D-Dimères - plasma
D-Dimères - plasma	
D4A - Delta 4 androstènedione - sérum	

Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma	
Dacryocytes	Morphologie des globules rouges
DAHS	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Dalacine®	Clindamycine - Sérum
Danaparoïde - anti-Xa	Activité anti-Xa : Danaparoïde - Orgaran - plasma
Daonil	Glibenclamide - sérum
Darunavir - Sérum	
Datamcine	Gentamicine - sérum
DDM	4-4' Méthylènedianiline - urines
Débit fécal des graisses	Stéatorrhée - dosage des graisses - selles
Décarboxytransferrine	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Décarboxytransferrine	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Défanyl®	Amoxapine - Sérum
DEFICIENCE INTELLECTUELLE	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
Déficit en créatine	Guanidinoacétate et créatine - plasma
Déficit en créatine	Guanidinoacétate et créatine - urines
Déficit en DPD	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
Déhydro-épiandrostérone	DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum
Déhydroépiandrostérone sulfate	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Déhydroépiandrostérone sulfate	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Déhydroépiandrostérone sulfate	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Delta 4 Androstènedione	D4A - Delta 4 androstènedione - sérum
Delta 5 prégnénone	17 Hydroxy Prégénolone - sérum
Delta 5- prégnénone	Prégénolone - sérum
Delta virus - antigène	Hépatite Delta - antigène - sérum
Dematomyosite	Marqueurs des myosites - sérum
dengue	Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum
Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum	
Dépakine®	Acide valproïque - sérum
Depakote	Acide valproïque - sérum
Dépamide®	Acide valproïque - sérum
Dépistage du cancer du col de l'utérus	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU
Dépistage du cancer du col de l'utérus	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage primaire
Dépistage sérique du risque de Trisomie 21	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
Dépistage sérique du risque de Trisomie 21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
Dépistage sérique du risque de Trisomie 21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres	
Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines	
Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines	
Derma Check	Juvenalis - Panel - DermaCheck
Dermatophyte	Champignon - Levures - identification
Dermatophytes	Champignon - Levures - recherche
Déroxat®	Paroxétine - sérum
Déshydrogénase lactique	LDH - Lactate-déshydrogénase
Déshydrogénase lactique	LDH - Lactate-déshydrogénase - sérum
Déshydrogénase lactique - Isoenzymes	LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes
Desipramine	Imipramine - Sérum
Desméthylclomipramine	Clomipramine - Sérum
Desméthylclozapine	Clozapine
Desmethylimipramine	Imipramine - Sérum
desmogléine 1	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
desmogléine 3	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Desmosomes - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Désoxycorticostérone - 11	11 Désoxycorticostérone - sérum
Désoxycortisol - 11	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
Détection des HPV-HR sur (auto) prélèvement vaginal	
Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU (test	
Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage primaire du	

Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS	
Détection toxine PVL (Staphylococcus aureus) - PCR sur souche	
Détermination du groupe sanguin	Groupage sanguin ABO - RH1(D)
Détermination du tropisme viral du VIH-1 (CCR5 - boucle V3, gp120)	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) :
Dexambutol®	Ethambutol - Sérum
Dextropropoxyphène - urines	
Dextroref®	Dextropropoxyphène - urines
DFI	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
DHA	DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum
DHAS	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
DHAS	Sulfate de DHEA salivaire - salive
DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum	
DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum	
DHT - Dihydrotestostérone - sérum	
Di Dolko®	Dextropropoxyphène - urines
Di-antalvic®	Dextropropoxyphène - urines
Di-Hydan®	Phénytoïne - sérum
Diacomit®	Stiripentol - Sérum
Diagnostic moléculaire , diagnostic génotypique, analyse des gènes de globine	Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal
Diagnostic présomptif des types O27 de Clostridium difficile	Clostridium difficile - toxines - recherche par PCR
Dialdéhyde malonique - plasma	
Dialgirex®	Dextropropoxyphène - urines
Dialgo®	Dextropropoxyphène - urines
Diamine oxydase	Diamine Oxydase (DAO) - activité - sérum
Diamine oxydase	Juvenalis - DAO - activité - sérum
Diamine Oxydase (DAO) - activité - sérum	
Diaminodiphénylméthane	4-4' Méthylènedianiline - urines
Diazépam + Desméthyldiazépam - Sérum	
Dibenzoazépine	Phénothiazines - liquide de ponction
Dibenzoazépine	Phénothiazines - Sérum
Dichlorométhane - urines	
Dicofol	Pesticides - recherche et/ou dosage
Dicofol	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Dicynone	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Dieldrin	Pesticides - recherche et/ou dosage
Dieldrin	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Diéthylamide acide lysergique	LSD - Diéthylamide acide lysergique - urines
Diéthylamide Acide Lysergique - sérum	LSD - Diéthylamide acide lysergique
Diéthylamide Acide Lysergique - urine	LSD - Diéthylamide acide lysergique - liquide biologique
Digest Check	Juvenalis - Panel - DigestCheck
Digestif	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Digestif	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Digestion	Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles
Digoxine - sérum	
Dihydrocodéine	Opiacés - dépistage - urines
Dihydrotestostérone	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
Dihydroxy - vitamine D3 - 1,25	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
Dilantin	Phénytoïne - sérum
Dilatrane®	Théophylline - sérum
Diltiazem - sérum	
Diphacinone	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
Diphantoïne	Phénytoïne - sérum
Diphényl-hydantoïne	Phénytoïne - sérum
Diphétialone	Anticoagulants oraux : Rodenticides - Sérum
diphthérie	Diphthérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Diphthérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum	
Diphthérie - recherche	Bactérie aérobie - recherche
Dipipéron®	Pipampérone - Sérum

Dipropylacétamide	Acide valproïque - sérum
Dipyridamole - Sérum	
Direct thrombin inhibitor	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
Disopyramide - sérum	
Distomatose - sérologie confirmation - sérum	
Distomatose - sérologie dépistage - sérum	
Disulfure de carbone	Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines
Diurétiques - recherche et dosage - urines	
Divalproate de sodium	Acide valproïque - sérum
DLST	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
DLST	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
DNA Fragmentation Index	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
DNA natif - anticorps anti-	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
DNA natif - anticorps anti-	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
DNMT3A	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
DNMT3A	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
DOC	11 Désoxycorticostérone - sérum
Dogmatil®	Sulpiride - Sérum
Dolutégravir - Sérum	
Dopamine	Catécholamines libres
Dopamine	Catécholamines libres - enfant - urines
Dopamine	Catécholamines - libres - Urines
Dosage des lipides	Stéatorrhée - dosage des graisses - selles
Dosulépine - Sérum	
Dot myosite	Marqueurs des myosites - sérum
Douve	Distomatose - sérologie confirmation - sérum
Douve	Distomatose - sérologie dépistage - sérum
Doxépine - Sérum	
Doxy®	Doxycycline - Sérum
Doxycycline - Sérum	
Doxylin®	Doxycycline - Sérum
Doxypalu®	Doxycycline - Sérum
DPD déficit	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
DPIG (Dosage Pondéral des ImmunoGlobulines)	IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum
DPNI	Ninolia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNIc) - prénatal
Drépanocytes	Morphologie des globules rouges
Drépanocytose	Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal
Drépanocytose	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
Droleptan®	Dropéridol - sérum
Dropéridol - sérum	
dRVVT	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
ds DNA - anticorps anti-	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
ds DNA - anticorps anti-	Anticorps anti-ADN double brin-ADN db - sérum
ds DNA - anticorps anti-	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
Duloxétine - sérum	
Dysglobulinémie	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Dysglobulinémie	Immunofixation - sérum
E1	Estrone - sérum
E. coli O157:H7	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
E. granulosus - E. multilocularis	Echinococcose - sérologie confirmation - sérum
E. granulosus - E. multilocularis	Echinococcose - sérologie dépistage - sérum
E2	Estradiol - femme - sérum
E2	Estradiol - homme/enfant - sérum
EA - sérologie IgA	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
EA - sérologie IgG	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
early antigen	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
Early antigen	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
Eau libre - clairance	

EBNA - sérologie IgG	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum
EBV	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum
EBV	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine	
ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - LBA	
ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - sérum	
Echinococcose - sérologie confirmation - sérum	
Echinococcose - sérologie dépistage - sérum	
Echinocytes	Morphologie des globules rouges
ECP - Eosinophil Cationic Protein	
Ecstasy	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
Ecstasy	Amphétamines - confirmation - urines
Ecstasy	Amphétamines - dépistage - urines
ECT - anticorps anti-	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
EDDP	Méthadone et EDDP - Sérum
Edurant	Rilpivirine - plasma
Efavirenz - plasma	
Effexor®	Venlafaxine - sérum
Effient	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Efient	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
EGBE	Acide butoxyacétique - urines
EGFR	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
EGFR	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
EGLN1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
EGLN2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
EGLN2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Ehrlichiose humaine - sérologie - sérum	
EJ - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Elavil®	Amitriptyline - Sérum
Electrophorèse de l'hémoglobine	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
électrophorèse des phosphatases alcalines	Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum
Electrophorèse des protéines - sérum	
Electrophorèse des protéines - urines	
Electrophorèse du LCR	Focalisation isoélectrique - LCR + sérum
Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum	
Eliquis	Apixaban(Eliquis ®) - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma
Elliptocytes	Morphologie des globules rouges
Elvitegravir - Sérum	
Emtricitabine - plasma	
Emtriva®	Emtricitabine - plasma
ENA - anticorps anti-	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Enbrel®	Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Encéphalite à tiques - TBE - s	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum	
Encéphalite verno-estivale	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Encephalitozoon intestinalis	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Endocrinologie	11 Désoxycorticostérone - sérum
Endocrinologie	11 Désoxycortisol - composé S - sérum
Endocrinologie	17 Hydroxy Progestérone - sérum
Endocrinologie	21 Désoxycortisol - sérum
Endocrinologie	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
Endocrinologie	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines

Endocrinologie	Acide homovanillique - Urine
Endocrinologie	Acide vanylmandélique - Urine
Endocrinologie	ACTH - Corticotrophine
Endocrinologie	ACTH - Corticotrophine - matin
Endocrinologie	ACTH - Corticotrophine - soir
Endocrinologie	ADH - Hormone antidiurétique - urine
Endocrinologie	Aldostérone
Endocrinologie	Aldostérone - couché
Endocrinologie	Aldostérone - debout ou assis
Endocrinologie	Aldostérone - urines
Endocrinologie	AMH - Hormone anti-Mullérienne - Enfant - sérum
Endocrinologie	AMH - Hormone anti-Mullérienne - sérum
Endocrinologie	Angiotensine II - plasma
Endocrinologie	Antigène CA 50 - sérum
Endocrinologie	CAR - index - Salive
Endocrinologie	Catécholamines libres
Endocrinologie	Catécholamines libres - enfant - urines
Endocrinologie	Catécholamines - libres - Urines
Endocrinologie	Corticostérone - Composé B - sérum
Endocrinologie	Cortisol - Composé F - matin - salive
Endocrinologie	Cortisol - Composé F - salive
Endocrinologie	Cortisol - Composé F - sérum
Endocrinologie	Cortisol - Composé F - soir - salive
Endocrinologie	Cortisol - Composé F - soir - sérum
Endocrinologie	Cortisol libre - Composé F - urines
Endocrinologie	Cortisone - Composé E - plasma
Endocrinologie	Cortisone - Composé E - urines
Endocrinologie	D4A - Delta 4 androstènedione - sérum
Endocrinologie	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Endocrinologie	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Endocrinologie	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Endocrinologie	DHEA - Déhydroépiandrostérone - sérum
Endocrinologie	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Endocrinologie	DHT - Dihydrotestostérone - sérum
Endocrinologie	Estradiol - femme - sérum
Endocrinologie	Estradiol - homme/enfant - sérum
Endocrinologie	Estrone - sérum
Endocrinologie	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
Endocrinologie	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
Endocrinologie	Gastrine - sérum
Endocrinologie	GH - Hormone de croissance - sérum
Endocrinologie	Ghréline - acylée et non acylée - plasma
Endocrinologie	GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma
Endocrinologie	Glucagon - plasma
Endocrinologie	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
Endocrinologie	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum
Endocrinologie	HOMA - index - sérum
Endocrinologie	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
Endocrinologie	IGF-2 - sérum
Endocrinologie	IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum
Endocrinologie	Inhibine A - ultra sensible - sérum
Endocrinologie	Inhibine B
Endocrinologie	Inhibine B - Enfant - sérum
Endocrinologie	Leptine - sérum
Endocrinologie	LH - Hormone Lutéostimulante - sérum
Endocrinologie	LH - Hormone Lutéostimulante - urines
Endocrinologie	Panel stéroïdes - Exploration de la fonction gonadique - sérum
Endocrinologie	Panel stéroïdes - Exploration d'un hirsutisme

Endocrinologie	Panel stéroïdes - Recherche d'un trouble de la biosynthèse des stéroïdes - sérum
Endocrinologie	Peptide C - sérum
Endocrinologie	Peptide C - Urines
Endocrinologie	Prégnénolone - sérum
Endocrinologie	Procollagène type III - sérum
Endocrinologie	Proinsuline - sérum
Endocrinologie	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Endocrinologie	Prolactine - sérum
Endocrinologie	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma
Endocrinologie	Rénine active
Endocrinologie	Rénine active - couché
Endocrinologie	Rénine active - debout
Endocrinologie	Sérotonine - sang total
Endocrinologie	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Endocrinologie	Somatostatine - plasma
Endocrinologie	Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH - sérum
Endocrinologie	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Endocrinologie	Sulfate de prégnénolone - sérum
Endocrinologie	T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum
Endocrinologie	T3 totale - Triiodothyronine totale - sérum
Endocrinologie	T3 - Triiodothyronine reverse
Endocrinologie	T3 - Triiodothyronine - urines
Endocrinologie	T4 libre - Thyroxine libre - sérum
Endocrinologie	T4 - Thyroxine - urines
Endocrinologie	T4 totale - Thyroxine totale - sérum
Endocrinologie	Testostérone biodisponible - femme/enfant - sérum
Endocrinologie	Testostérone biodisponible - sérum
Endocrinologie	Testostérone - femme/enfant - sérum
Endocrinologie	Testostérone - homme - sérum
Endocrinologie	Testostérone libre - Sérum
Endocrinologie	Thyroxine Binding globuline - TBG - sérum
Endocrinologie	TSH - Hormone Thyroïde Stimulante - 3ème génération - sérum
Endocrinologie	VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma
Endomysium - anticorps anti- IgA	Anticorps anti-endomysium IgA - enfant - sérum
Endomysium - anticorps anti- IgA	Anticorps anti-endomysium - IgA - sérum
Endomysium - anticorps anti- IgG	Anticorps anti-endomysium - IgG - sérum
Endosulfan alpha, bêta, ether, lactone, sulfate	Pesticides - recherche et/ou dosage
Endosulfan alpha, bêta, ether, lactone, sulfate	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Endrin	Pesticides - recherche et/ou dosage
Endrin	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Enolase spécifique du neurone	NSE - Neuron Specific Enolase - liquide biologique
Enolase spécifique du neurone	NSE - Neuron Specific Enolase - sérum
Enolemie	Alcool éthylique - sérum
Entamoeba histolytica	Amibiase - sérologie - sérum
Entamoeba histolytica	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Entecavir - plasma	
Entéramine	Sérotonine - sang total
Enterogregative E. coli (EAEC)	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Entérobactéries productrices de carbapénémases	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Entérobactéries résistantes aux C3G	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Entérocoques résistants aux glycopeptides	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Enterocytozoon bienewisi	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Enteropathogenic E. coli (EPEC)	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Entérovirus	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
Entérovirus - diagnostic direct - PCR	
Enterovirus humain/rhinovirus	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Entyvio ®	Vedolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum

Envarsus	Tacrolimus - FK506
Envoplaquine	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Enzyme de conversion de l'angiotensine	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine - sérum
Enzyme de Conversion de l'Angiotensine	ECA - Enzyme de Conversion de l'Angiotensine
Eosinophil Cationic Protein	ECP - Eosinophil Cationic Protein
Epanutin	Phénytoïne - sérum
EPAS1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
EPAS1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
EPC	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
EPCAM	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
EPCAM	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
EPCAM	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Epiderme - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Epididymal protein 4	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Epinéphrine	Catécholamines libres
Epinéphrine	Catécholamines libres - enfant - urines
Epinéphrine	Catécholamines - libres - Urines
Epitomax®	Topiramate - sérum
Epivir®	Lamivudine - plasma
EPO	Erythropoïétine - sérum
Epstein Barr Virus - EBV - diagnostic direct - PCR	
Epstein Barr Virus - EBV - MNI test - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum	
Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum	
Epstein-Barr virus	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
Equanil®	Méprobamate - Sérum
Equanil®	Méprobamate - urines
ERBB2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
ERBB2	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Erelzi ®	Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
ERG	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
Ergocalciférol - vitamine D2	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Ergocalciférol - vitamine D2	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
erm	Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux
ERV	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
ERVE sérologie	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Erythropoïétine - anticorps anti-	Anticorps anti-érythropoïétine - sérum
Erythropoïétine - sérum	
Erythrovirus B19 - diagnostic direct - PCR	Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR
Erythrovirus B19 - sérologie IgG	Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum
Erythrovirus B19 - sérologie IgG/IgM	Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum
Escitalopram - sérum	
Eslicarbazépine	10 Hydroxy-Oxcarbazépine - sérum
Esmeron	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Estalozolam - Sérum	
Estomac	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Estomac - anticorps anti-	Anticorps anti-cellules pariétales - estomac - sérum
Estradiol - femme - sérum	
Estradiol - homme/enfant - sérum	
Estradiol - salive	
Estrone - sérum	
Etanercept - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
Ethambutol - Sérum	
Ethanol	Alcool éthylique

Ethanol	Alcool éthylique - sérum
Ethosuximide - sérum	
Etravirine - plasma	
Euphylline	Théophylline - sérum
EUROIMMUN EUROLINE Dot	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes -
EUROIMMUN EUROLINE Dot	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum
EUROIMMUN EUROLINE Dot	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum
Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines génotypage de la dihydropyrimidine	
Évérolimus	
Eviplera	Emtricitabine - plasma
Eviplera	Rilpivirine - plasma
Eviplera	Ténofovir - plasma
Exacor®	Cibenzoline - Sérum
Examen chimique - selles	
Examen Parasitologique des selles	Parasitologie - microscopie - Selles
Exanthème subit du nourrisson - sérologie	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
Exome	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
Exome	Exome Prénatal
Exome	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Exome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Exome	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Exome	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Exome	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Exome	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Exome	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Exome	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Exome	réinterprétation d'exome
Exome	
EXOME	Exome
EXOME	Exome avec interface d'interprétation
EXOME	Exome Malformations cardiaques congénitales
EXOME	Exome Néphrologie
EXOME	Exome Oncogénétique
EXOME	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
Exome avec interface d'interprétation	
Exome cardiogénétique	
Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental	
Exome infertilité	Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans
Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans	
Exome Malformations cardiaques congénitales	
Exome Néphrologie	
Exome Oncogénétique	
Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires	
Exome Prénatal	
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Malformations cardiaques congénitales
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Néphrologie
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Oncogénétique
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
Exons et régions introniques flanquantes	Exome Prénatal
Exons et régions introniques flanquantes	Exome
Exons et régions introniques flanquantes	Exome avec interface d'interprétation
Exons et régions introniques flanquantes	Exome cardiogénétique
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,

Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Exons et régions introniques flanquantes	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Exploration fonctionnelle	Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles
F 1+2	Fragment 1+2 - prothrombine - plasma
Fabry - maladie de	Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard
Facteur 13	Facteur XIII - plasma
Facteur anti-hémorragique	Vitamine K1 - Phylloquinone
Facteur antihémophilique A	Facteur VIII - anti-hémophilique A - plasma
Facteur antihémophilique B	Facteur IX - anti-hémophilique B - plasma
Facteur B	Facteur B - fraction du complément - sérum
Facteur B - fraction du complément - sérum	
Facteur de Castle	Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum
Facteur de croissance de l'endothélium vasculaire (VEGF) - sérum	
Facteur de Dahlback	Résistance à la protéine C activée
Facteur Fletcher	Prékallicréine - activité - plasma
Facteur Hageman	Facteur XII - Hageman - plasma
Facteur I	Facteur I - fraction du complément - sérum
Facteur I - Fibrinogène - activité - plasma	
Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma	
Facteur I - fraction du complément - sérum	
Facteur II - anticorps IgG anti-	Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum
Facteur II - Prothrombine - activité - plasma	
Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total	
Facteur intrinsèque - anticorps anti-	Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum
Facteur IX - anti-hémophilique B - plasma	
Facteur néphritique	C3 NeF - Facteur néphritique - sérum
Facteur Rosenthal	Facteur XI - Rosenthal - plasma
Facteur stabilisant de la fibrine	Facteur XIII - plasma
Facteur Stuart	Facteur X - Stuart - plasma
Facteur V - Proaccélérine - plasma	
Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total	
Facteur VII - anticorps anti-	Anticorps anti-facteur VII - recherche - plasma
Facteur VII - Proconvertine - plasma	
Facteur VIII - anti-hémophilique A - plasma	
Facteur VIII related antigen	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma	
Facteur Willebrand - antigène - plasma	
facteur Willebrand antigène	Facteur Willebrand - antigène - plasma
Facteur X - Stuart - plasma	
Facteur XI - Rosenthal - plasma	
Facteur XII - Hageman - plasma	
Facteur XIII - plasma	
Facteurs rhumatoïdes - IgA - sérum	
Facteurs rhumatoïdes - IgM	Facteurs rhumatoïdes - sérum
Facteurs rhumatoïdes - sérum	
Fasciola Hepatica - sérologie	Distomatose - sérologie dépistage - sérum
FDP	PDF - Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine - plasma
Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles	
Felbamate - Sérum	
Fer - capacité totale de fixation - sérum	
Fer - coefficient de saturation - sérum	
Fer - sérum	
Fer - urines	
Fer médullaire	Myélogramme - coloration de Perls
Ferti Check	Juvenalis - Panel - FertiCheck - femme
Ferti Check	Juvenalis - Panel - FertiCheck - homme
FH	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-

FH	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
FH	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
FHSR	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
FHSR = fièvre hémorragique avec syndrome rénal	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
Fibrine	Facteur I - Fibrinogène - activité - plasma
Fibrinogène - antigène	Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma
Fibrinogène - fonctionnel	Facteur I - Fibrinogène - activité - plasma
Fibrinogène - pondéral	Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma
Fibrinogène immunologique	Facteur I - Fibrinogène - antigène - plasma
FIBROMAX - non remboursé - sérum	
FIBROMAX - remboursé - sérum	
Fibrome	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Fibromètre - Hors nomenclature - score de fibrose, cirrhomètre et inflamètre	
Fibromètre - remboursé - score de fibrose, cirrhomètre et inflamètre	
Fibromètre virus	Fibromètre - Hors nomenclature - score de fibrose, cirrhomètre et inflamètre
Fibromètre virus	Fibromètre - remboursé - score de fibrose, cirrhomètre et inflamètre
Fibrose kystique	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - sang total
FibroTest®	NASH-FibroTest - sérum
FIBROTEST	FIBROMAX - non remboursé - sérum
FIBROTEST	FIBROMAX - remboursé - sérum
Fibrotest - Actitest - non remboursé - sérum	
Fièvre boutonneuse méditerranéenne - sérologie	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Fièvre de Malte	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
Fièvre de Malte	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
fièvre des tranchées	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum	
Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage	
Fièvre montagne rocheuse	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Fièvre noire	Leishmaniose - diagnostic direct - PCR
Fièvre Q	Coxiella burnetii - phase 1 et 2 - sérologie - sérum
Fièvre Q	Coxiella burnetii - sérologie - sérum
fièvre sudorale	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
Filaire	Filariose - sérologie - sérum
Filariose - sérologie - sérum	
FIN - anticorps anti-	Anticorps anti-facteur intrinsèque - sérum
FISH acquise	Cytogénétique moléculaire hématologique - FISH
Fit-test	Hémoglobine - recherche - selles
flavivirus	Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum
Flavivirus	Zika - sérologie - sérum
Flavivirus - dengue	Dengue - sérologie IgG/IgM - sérum
FLCN	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
FLCN	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Flécaïne®	Flécaïnide - sérum
Flécaïnide - sérum	
FLNC	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Floxyfral®	Fluvoxamine - sérum
FLU	Cortisol libre - Composé F - urines
Fluanxol®	Flupentixol - Sérum
Fluconazole - Sérum	
Flucytosine - Sérum	
Fluisédal®	Prométhazine - sérum
Flunitrazépam - sérum	
Fluor - Sérum	
Fluor - urines	
Fluorémie	Fluor - Sérum
Fluorocytosine 5-	Flucytosine - Sérum
Fluorurie	Fluor - urines
Fluoxétine - sérum	

Flupentixol - Sérum	
Fluphénazine - Sérum	
Fluvoxamine - sérum	
FMF	Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage
FMR1	X Fragile - syndrome - sang total
Focalisation isoélectrique - LCR + sérum	
Folates	Acide folique sérique - sérum
Folates érythrocytaires	Acide folique érythrocytaire - sang total
Folates érythrocytaires	Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total
Folliculine	Estradiol - femme - sérum
Folliculine	Estradiol - homme/enfant - sérum
Folliculostimuline	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
Folliculostimuline	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
Folliculotrophine	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
Folliculotrophine	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
Fonzylane®	Buflomédil - sérum
Formaldéhyde	Acide formique - urines
Formes circulantes de la prolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Formes moléculaires de la prolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Formol	Acide formique - urines
Formule Leucocytaire Approfondie	
Formule sanguine	Formule Leucocytaire Approfondie
Fortum®	Ceftazidime - Sérum
Fosampnénavir - Sérum	
Fosfocine®	Fosfomycine - Sérum
Fosfomycine - Sérum	
Fosphénitoïne	Phénytoïne - sérum
FR	Facteurs rhumatoïdes - IgA - sérum
FR	Facteurs rhumatoïdes - sérum
Fraction C1q - complément	C1q - fraction du complément - sérum
Fraction C2 - complément	C2 - fraction du complément - sérum
Fraction C3 - complément	C3 - fraction du complément - sérum
Fraction C4 - complément	C4 - fraction du complément - sérum
Fraction C5 - complément	C5 - fraction du complément - sérum
Fraction C9 - complément	C9 - fraction du complément - sérum
Fraction HbA1c de l'hémoglobine	Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total
Fragilité globulaire	Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total
Fragment 1+2 - prothrombine - plasma	
Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme	
Francisella tularensis - sérologie	Tularémie - Francisella tularensis - sérologie - sérum
Free lite	Chaînes légères libres Kappa - sérum
Free lite	Chaînes légères libres Lambda - sérum
Fructosamine - sérum	
FSF	Facteur XIII - plasma
FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum	
FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines	
FT3	T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum
FT4	T4 libre - Thyroxine libre - sérum
FTA	Syphilis - sérologie IgM - sérum
Fungizone®	Amphotéricine B - Sérum
Furosémide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Furosémide - sérum	
Furosémide - urines	
Fycompa®	Pérampanel - Sérum - PERAMPANEL
G6PD	G6PD - Glucose-6 phosphate déshydrogénase
G6PD - Glucose-6 phosphate déshydrogénase	
GAA	Guanidinoacétate et créatine - plasma
GAA	Guanidinoacétate et créatine - urines

Gabapentine - sérum	
Gabitril®	Tiagabine - Sérum
GAD 65 - anticorps anti	Anticorps anti-GAD - sérum
GAG	Mucopolysaccharides - urines
Galactomannane	Aspergillose - antigène soluble - recherche - LBA
Galactomannane	Aspergillose - antigène soluble - recherche - sérum
Gale - Sarcoptes scabei - recherche	
GAM	IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum
Gamma interféron	Interféron gamma - LCR
Gamma interféron	Interféron gamma - sérum
Ganciclovir - plasma	
Gangliome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Gangliosides - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Gangliosides - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Gardénalémie	Phénobarbital - sérum
Gastrine - sérum	
Gastrique	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Gastro-entérite	Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles
Gastro-entérite	Norovirus - recherche - Selles
Gastro-entérite	Rotavirus - recherche rapide - Selles
Gaucher - maladie de	Chitotriosidase - activité - plasma
Gène DAZ - deleted in azoospermia	Microdélétions du Chromosome Y - (régions AZFa, AZFb, AZFc) - sang total
Génétique infertilité	Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans
Génotypage - VHC	Hépatite C - génotypage
Génotypage alpha -1 anti-trypsine, variants S et Z	Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations
Génotypage du VHB	Hépatite B Genotypage et Profil de résistance aux anti-viraux - sérum
Génotypage HLA B27	HLA B27 - génotypage - sang total
génotypage IL28B	Interleukine 28B (IL28B polymorphisme C/T rs 12979860) - génotypage - sang total
génotypage plaquettaire	Groupage plaquettaire - sang total
Génotypage RH3	RH3(E) foetal - génotypage
Génotypage RH4	RHc foetal - génotypage
Gentalline	Gentamicine - sérum
Gentalline®	Gentamicine - sérum
Gentamicine - sérum	
GH - Hormone de croissance - sérum	
GH-RH	GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma
GHB - Acide Gamma Hydroxy Butyrique - urines	
Ghréline - acylée et non acylée - plasma	
GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma	
Giardia intestinalis	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Giardia intestinalis	Parasitologie - microscopie - Selles
Gilbert - anomalie de la glucuronocjugaison	Syndrome de Gilbert - recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347)
GIST	PDGFR alpha - exons 12, 14, 18
GLA Protéine osseuse	Ostéocalcine - sérum
Glandes surrénales - anticorps anti-	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
Gliadine - anticorps IgA anti-	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgA - sérum
Gliadine - anticorps IgG anti-	Anticorps anti-gliadine déamidée - IgG - sérum
Glibenclamide	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
Glibenclamide	Sulfamides hypoglycémiants - urines
Glibenclamide - sérum	
Glibornuride	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
Glibornuride	Sulfamides hypoglycémiants - urines
Glicazide	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
Glicazide	Sulfamides hypoglycémiants - urines
Glimépiride	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
Glimépiride	Sulfamides hypoglycémiants - urines
Glipizide	Sulfamides hypoglycémiants - sérum
Glipizide	Sulfamides hypoglycémiants - urines

Glivec	Imatinib - Plasma
Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal	
Glucagon - plasma	
Glucocorticoïde	Cortisol - Composé F - salive
Glucocorticoïde	Cortisol - Composé F - sérum
Glucophage®	Metformine - Sérum
Glucose-6 phosphate deshydrogénase	G6PD - Glucose-6 phosphate déshydrogénase
Glucuronide d'androstanediol	3 Alpha Androstanediol glucuronide - sérum
Glutamate décarboxylase - anticorps anti	Anticorps anti-GAD - LCR
Glutamate décarboxylase - anticorps anti	Anticorps anti-GAD - sérum
Glutathion peroxydase - plasma	
Glycogénose de type II	Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard
Glycolipides - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - LCR
Glycolipides - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Glycosaminoglycanes	Mucopolysaccharides - urines
GM1 - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - LCR
GM1 - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Goiffon	Fécalogramme - coprologie fonctionnelle - selles
Golimumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
Gonocoque	Neisseria gonorrhoeae - Détection par amplification moléculaire
GOT2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
GOT2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
GP210	Anticorps anti-GP 210 - sérum
GPX	Glutathion peroxydase - plasma
GQ1b - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - LCR
GQ1b - anticorps anti-	Anticorps anti-glycolipides - sérum
Granudoxy®	Doxycycline - Sérum
Granulocytes - anticorps anti-	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Griffes du chat (maladie)	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
Griffes du chat (maladie)	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
Grippe A et B	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
Grippe A et B - sérologie IgG - sérum	
Groupage plaquettaire - sang total	
Groupage sanguin ABO - RH1(D)	
Groupes sanguins - génotypage - sang total	
Growth Hormone	GH - Hormone de croissance - sérum
Growth Hormone Releasing Hormone - GH-RH	GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma
GSD II	Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard
Guanidinoacétate et créatine - plasma	
Guanidinoacétate et créatine - urines	
HA test	Acide hyaluronique - liquide pleural
HA test	Acide hyaluronique - sérum
HAD	ADH - Hormone antidiurétique
HAD	ADH - Hormone antidiurétique - urine
Haemophilus ducreyi	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
Haemophilus ducreyi - recherche	
Haemophilus influenzae	Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum
Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum	
Hageman - facteur	Facteur XII - Hageman - plasma
Halcion®	Triazolam - sérum
Haldol®	Halopéridol
Halopéridol	
HAM - Hormone anti Müllérienne	AMH - Hormone anti-Müllérienne - Enfant - sérum
HAM - Hormone anti Müllérienne	AMH - Hormone anti-Müllérienne - sérum
Hantan	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum	
Hash	Cannabis - urines
HAV - anticorps IgM	Hépatite A - anticorps IgM - sérum

HAV - anticorps totaux	Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum
Havlane®	Loprazolam - Sérum
HbA1c	Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total
HBc - anticorps IgM	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
HBc - anticorps totaux	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
HBe - anticorps totaux	Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum
HBe - antigène	Hépatite B - antigène HBe - sérum
HBOC	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
HBs - anticorps totaux - titrage	Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum
HBs - antigènes	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
HBV - anticorps IgM anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
HBV - anticorps totaux anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
HBV - anticorps totaux anti-HBe	Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum
HBV - anticorps totaux anti-HBs - titrage	Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum
HBV - antigène HBe	Hépatite B - antigène HBe - sérum
HBV - antigène HBs	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
HBV - détermination quantitative - charge virale	Hépatite B - charge virale - PCR
HCB	Pesticides - recherche et/ou dosage
HCB	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum	
HCG - sous-unité b libre	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
HCG dimères	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum
hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - liquide biologique	
hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum	
hCT	Calcitonine - liquide de ponction
hCT	Calcitonine - sérum
HCV - détermination quantitative - charge virale	Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN
HCV - génotypage	Hépatite C - génotypage
HCV - sérologie dépistage	Hépatite C - sérologie dépistage - sérum
Hcy	Homocystéine - plasma
Hcy	Juvenalis - Homocystéine - plasma
HDL cholestérol	Cholestérol HDL - sérum
HDS	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
HDV - anticorps IgM	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
HDV - anticorps totaux	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
HDV - antigène	Hépatite Delta - antigène - sérum
HDV ARN	Hépatite Delta - charge virale - PCR
HE4 - Calcul ROMA - sérum	
Health Index	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Helicobacter pylori - antigène - Selles	
Helicobacter pylori - culture	
Helicobacter pylori - sérologie IgG - sérum	
Helicobacter pylori - test respiratoire à l'Urée 13C - air expiré	
Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR	
Helminthes	Helminthes - Protozoaires - diagnostic direct - PCR - selles
Helminthes - Protozoaires - diagnostic direct - PCR - selles	
Hématies fœtales dans le sang maternel	Hémorragie foeto-maternelle - sang total
Hémigoxine®	Digoxine - sérum
Hémipteron® LP	Propranolol - Sérum
Hémochromatose	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total
Hémochromatose	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total
Hémochromatose	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total
Hémochromatose	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total
Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total	
Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total	
Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total	
Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total	
Hémoglobine	Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal

Hémoglobine - électrophorèse - sang total	
Hémoglobine - recherche - selles	
Hémoglobine glyquée	Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total
Hémoglobine glyquée - Hb A1c - sang total	
Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total	
Hémolysines anti-A et anti-B	Anticorps immuns du système ABO - anti-A anti-B - dépistage et titrage - sérum
Hémophilus	Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum
Hémorragie foeto-maternelle - sang total	
Héparine - PF4 - anticorps anti-	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Héparinémie	Activité anti-Xa : héparine standard - HNF - plasma
Hépatite A - anticorps IgM - sérum	
Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum	
Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum	
Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum	
Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum	
Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum	
Hépatite B - antigène HBe - sérum	
Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum	
Hépatite B - antigène HBs - quantitatif - sérum	
Hépatite B - charge virale - PCR	
Hépatite B Genotypage et Profil de résistance aux anti-viraux - sérum	
Hépatite C - confirmation	Hépatite C - confirmation - sérum
Hépatite C - confirmation - sérum	
Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN	
Hépatite C - génotypage	
Hépatite C - profil de résistance aux anti-viraux - sérum	
Hépatite C - sérologie dépistage - sérum	
hépatite D	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
hépatite D	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
hépatite D	Hépatite Delta - antigène - sérum
hépatite delta	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
hépatite delta	Hépatite Delta - antigène - sérum
hépatite Delta	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum	
Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum	
Hépatite Delta - antigène - sérum	
Hépatite Delta - charge virale - PCR	
Hépatite E	Hépatite E - diagnostic direct - PCR
Hépatite E	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
Hépatite E	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
Hépatite E - anticorps IgG - sérum	
Hépatite E - anticorps IgM - sérum	
Hépatite E - diagnostic direct - PCR	
Hépatite E virus	Hépatite E - diagnostic direct - PCR
Hepsera®	Adéfovir - plasma
Heptachlore	Pesticides - recherche et/ou dosage
Heptachlore	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - Protéine c-erbB-2 - sérum	
HER2 ECD - extracellular domain	HER2 - Human Epidermal growth factor Receptor 2 - Protéine c-erbB-2 - sérum
Héroïne	Opiacés confirmation - dosage sanguin
Héroïne - confirmation	Opiacés - confirmation - urines
Héroïne - dépistage	Opiacés - dépistage - urines
herpes gestationis factor	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Herpès simplex 1/2	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
Herpes simplex virus 1/2	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR	
Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique	
Herpes simplex virus 1/2 - HSV - sérologie IgM - sérum	

Herpes simplex virus - HSV1 IgG et HSV2 IgG - sérologie IgG - sérum	
Herpès type 1 et 2	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
Herpes Viridae	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - sérologie IgM - sérum
Herpes Viridae	Herpes simplex virus - HSV1 IgG et HSV2 IgG - sérologie IgG - sérum
Herpès virus type 6 - charge virale - PCR	
Herpès virus type 6 - diagnostic direct - PCR	
Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum	
Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum	
Herpès virus type 7 - diagnostic direct - PCR	
Herpès virus type 8 - charge virale	
Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR	
Herpès virus type 8 - sérologie IgG - sérum	
Herpes ZOSTER	Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum
HEV	Hépatite E - diagnostic direct - PCR
HEV - anticorps IgG	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
HEV - anticorps IgM	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
Hexone	Méthylisobutylcétone - urines
Hg	Mercure - cheveux
Hg	Mercure - liquide biologique
Hg	Mercure - salive
Hg	Mercure - sang total
Hg	Mercure - urines
hGH	GH - Hormone de croissance - sérum
HHV	Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum
HHV-3 (human herpesvirus 3)	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HHV-5	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR
HHV-5	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HHV6	Herpès virus type 6 - charge virale - PCR
HHV6	Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum
HHV6	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
HHV6 - diagnostic moléculaire	Herpès virus type 6 - diagnostic direct - PCR
HHV6 - PCR	Herpès virus type 6 - diagnostic direct - PCR
HHV6 - sérologie	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
HHV7 - Herpès virus	Herpès virus type 7 - diagnostic direct - PCR
HHV8 - diagnostic moléculaire	Herpès virus type 8 - charge virale
HHV8 - diagnostic moléculaire	Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR
HHV8 - PCR	Herpès virus type 8 - charge virale
HHV8 - PCR	Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR
HHV8 - sérologie	Herpès virus type 8 - sérologie IgG - sérum
HIA 5	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines
High DNA Stainability	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
Hippurate	Acide hippurique - urines
Histones - anticorps anti-	Anticorps anti-histones - sérum
Histoplasma	Champignon - Levures - recherche
HIV	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
HIV	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR
HIV 1	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR
HIV 1/2 - sérologie de dépistage	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie dépistage - sérum
HIV ζ immunoblot	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique
HIV 2	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
HIV1/2 - sérologie de confirmation	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique
HIV1/2 - Western blot	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique
HIV - Ag P24	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
HIV - charge virale	VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
HIV - Identification génotypique des résistances aux anti-viraux	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase)
H+K+ ATPase - anticorps anti-	Anticorps anti-pompe à protons - sérum
HLA B27 - génotypage - sang total	
HLA classe I et II - anticorps anti-	Anticorps anti-HLA - classes I et II - sérum

HLA de classe I - génotypage HLA-A et HLA-B	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total	
HLA de classe II - génotypage HLA-DQ et HLA-DR	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total	
HMPV	Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic
HNF1B	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
HNF1B	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
HOMA	Insuline - sérum
HOMA - index - sérum	
Homocystéine - plasma	
Homocystéinémie	Homocystéine - plasma
Homocystéinémie	Juvenalis - Homocystéine - plasma
Homovanilate	Acide homovanillique - Urine
Hormone anti Müllérienne	AMH - Hormone anti-Müllérienne - Enfant - sérum
Hormone anti Müllérienne	AMH - Hormone anti-Müllérienne - sérum
Hormone antidiurétique	ADH - Hormone antidiurétique
Hormone antidiurétique	ADH - Hormone antidiurétique - urine
Hormone Chorionique Gonadotrope totale - fractions libres et liées	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - sérum
Hormone Chorionique Gonadotrope totale - fractions libres et liées - liquide	hCG molécule dimère (Alpha + Bêta) - liquide biologique
Hormone corticotrope	ACTH - Corticotrophine
Hormone de croissance	GH - Hormone de croissance - sérum
Hormone Folliculo Stimulante	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
Hormone Folliculo Stimulante	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
Hormone lutéale	Progestérone - sérum
Hormone Lutéinisante	LH - Hormone Lutéostimulante - sérum
Hormone Lutéinisante	LH - Hormone Lutéostimulante - urines
Hormone parathyroïdienne	PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction
Hormone parathyroïdienne	PTH - Parathormone intacte - sérum
Hormone progestative	Progestérone - sérum
Hormone Somatotrope	GH - Hormone de croissance - sérum
Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération	Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération	TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Hormone thyroéotrope - ultra-sensible 3ème génération	Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Hormone thyroéotrope - ultra-sensible 3ème génération	TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Hormones hypophysaires - sous-unités alpha-	Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH - sérum
HOXB13	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
HOXB13	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
HOXB13	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Hp - antigènes	Helicobacter pylori - antigène - Selles
Hp - culture	Helicobacter pylori - culture
Hp - sérologie IgG	Helicobacter pylori - sérologie IgG - sérum
Hp - tests respiratoires à l'Urée 13C	Helicobacter pylori - test respiratoire à l'Urée 13C - air expiré
HPN	Hémoglobine paroxystique nocturne - HPN - sang total
HPV	Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible
HPV oncogènes	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU
HPV oncogènes	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage primaire
H.pylori	Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR
HSV1	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
HSV1	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
HSV1	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
HSV 1 et 2 - diagnostic moléculaire	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR
HSV 1 et 2 - diagnostic moléculaire	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HSV 1 et 2 - PCR	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR
HSV 1 et 2 - PCR	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HSV 1 et 2 - sérologie IgG	Herpes simplex virus - HSV1 IgG et HSV2 IgG - sérologie IgG - sérum
HSV 1 et 2 - sérologie IgM	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - sérologie IgM - sérum
HSV1 et HSV2	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
HSV - ADN	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR

HSV - ADN	Herpes simplex virus 1/2 - HSV - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
HSV 4	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum
HSV 5	Cytomégalovirus - CMV - - sérologie IgG/IgM - sérum
HSV2	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
HSV2	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
HSV2	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
HSV6	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
HT	Sérotonine - sang total
HT21	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
HT21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
HT21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
hTg	Thyroglobuline - sérum
HTLV 1 et 2 - anticorps anti-	HTLV 1/2 - sérologie confirmation - sérum
HTLV 1 et 2 - anticorps anti-	HTLV 1/2 - sérologie dépistage - sérum
HTLV 1/2 - sérologie confirmation - sérum	
HTLV 1/2 - sérologie dépistage - sérum	
HTLV 1/2 PCR qualitative - sang total	
Hu - anticorps anti-	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Human Growth Hormone	GH - Hormone de croissance - sérum
Human Herpes Virus-5	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR
Human Herpes Virus-5	Cytomégalovirus - CMV - - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
Human Metapneumovirus	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Human Parainfluenza Virus 1, 2, 3 - sérologie	Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum
Humira	Adalimumab - taux résiduel et dosage des anticorps
HVA	Acide homovanillique - Urine
Hyaluronate	Acide hyaluronique - liquide pleural
Hyaluronate	Acide hyaluronique - sérum
Hydatidose	Echinococcose - sérologie confirmation - sérum
Hydatidose	Echinococcose - sérologie dépistage - sérum
Hydrochlorothiazide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Hydrocortisone	Cortisol - Composé F - salive
Hydrocortisone	Cortisol - Composé F - sérum
Hydrofluméthiazide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Hydroquinidine - Sérum	
Hydroxy indol acétique - 5	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines
Hydroxy-Rispéridone	Rispéridone
Hydroxychloroquine - sang total	
Hydroxytryptamine - sang total	Sérotonine - sang total
Hydroxyzine - Sérum	
Hypnovel®	Midazolam - Sérum
IA2 - anticorps anti-	Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum
IAA	Anticorps anti-insuline - sérum
ICA	Anticorps anti-Îlots de Langerhans - ICA - sérum
Iclusig	Ponatinib - Plasma
IFCC	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
IFCC	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
IFN a	Interféron alpha - LCR
IFN a	Interféron alpha - liquide biologique
IFN a	Interféron alpha - sérum
IFN a- anticorps neutralisant	Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum
IFN b- anticorps neutralisant	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
IFS	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
IFS	Immunofixation - sérum
Ig totaux syphillis	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
IgA - anticorps anti-	Anticorps anti-IgA - sérum
IgA - immunoglobulines A - sérum	
IgA - immunoglobulines A - sous classes IgA1 et IgA2 - sérum	
IgA - immunoglobulines A sécrétoires - selles	

IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum	
IgAS	IgA - immunoglobulines A sécrétoires - selles
IgD - immunoglobulines D - sérum	
IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum	
IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®	
IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® adulte - fx5/fx24/fx25	
IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® enfant - fx26/fx27/fx28	
IgE spécifiques : latex - allergène unique	
IgE spécifiques : mélanges respiratoires	IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia	
IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes	
IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia	
IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum	
IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique	
IgE spécifiques - alimentaire - allergène unique	IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia
IgE spécifiques - CLA30 - allergènes mixtes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes -
IgE spécifiques - CLA30 - pneumallergènes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum
IgE spécifiques - CLA30 - trophallergènes	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum
IgE spécifiques - dépistage allergènes respiratoires et alimentaires -Phadiatop® nourrisson	
IgE spécifiques - mélanges alimentaires	IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum
IgE spécifiques - mélanges respiratoires	IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes
IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor	
IgE spécifiques - respiratoire - allergène unique	IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor
IgE spécifiques - respiratoire - allergène unique	IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia
IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Hycor	
IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia	
IgE totales - sérum	
IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum	
IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes et trophallergènes - sérum	
IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - trophallergènes - sérum	
IGF-1 - Somatomédine C - sérum	
IGF-2 - sérum	
IGF-BP3	IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum
IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum	
IgG - immunoglobulines G - LCR	
IgG - immunoglobulines G - sérum	
IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 1 - sérum	
IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 2 - sérum	
IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 3 - sérum	
IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 4 - sérum	
IgG spécifiques - sérum	
IgG4	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 4 - sérum
IgG4 spécifiques - sérum	
IgM - immunoglobulines M - sérum	
IgM anti-core de VHB	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
IGRA	Production d'interféron Gamma - Quantiferon® TB Gold Plus
IL-1 Beta	Juvenalis - Interleukine IL-1 bêta - sérum
IL-1 bêta	Interleukine IL-1 bêta - sérum
IL-1Beta	Interleukine IL-1 bêta - sérum
IL-2	Interleukine IL-2 - sérum
IL-4	Interleukine IL-4 - sérum
IL-5	Interleukine IL-5 - plasma
IL-6	Interleukine IL-6 - sérum
IL-6	Juvenalis - Interleukine IL-6 - sérum
IL-8	Interleukine IL-8 - sérum
Imatinib - Plasma	
Imipramine - Sérum	
Immunocomplexes circulants	Complexes Immuns Circulants - CIC - sérum

Immuno-électrophorèse des protéines urinaires	Bence Jones - recherche
Immunoblot - VHC	Hépatite C - confirmation - sérum
immunocapture	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
Immunoélectrophorèse	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Immunoélectrophorèse	Immunofixation - sérum
Immunoempreinte	Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum
Immunoempreinte	Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum
Immunofixation - sérum	
Immunoglobuline A - anticorps anti-	Anticorps anti-IgA - sérum
Immunoglobulines A	IgA - immunoglobulines A - sérum
Immunoglobulines A - sous classes IgA1/2	IgA - immunoglobulines A - sous classes IgA1 et IgA2 - sérum
Immunoglobulines D	IgD - immunoglobulines D - sérum
Immunoglobulines G	IgG - immunoglobulines G - LCR
Immunoglobulines G	IgG - immunoglobulines G - sérum
Immunoglobulines G/A/M pondéral	IgA/G/M - immunoglobulines A/G/M - sérum
Immunoglobulines M	IgM - immunoglobulines M - sérum
Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total	
Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total	
Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total	
Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total	
Immunophénotypage des hémopathies malignes	
Immunophénotypage des Monocytes	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Immunophénotypage des plasmocytes	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Immunophénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Immunophénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Immunophénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Immunophénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
Immunophénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total
Imupro	Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum
Indapamide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Index de ROMA	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Index HOMA	Insuline - sérum
Index phi	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Indice d'avidité des IgG - Rubéole	Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum
Indice d'avidité des IgG anti-Toxoplasma gondii	Toxoplasmose - avidité anticorps - IgG - sérum
Indice de Rosner	Anticoagulant circulant - dépistage - plasma
Indice de Rosner	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Indice de sélectivité	Electrophorèse des protéines - urines
Indinavir - Sérum	
INF alpha	Interféron alpha - LCR
INF alpha	Interféron alpha - liquide biologique
INF alpha	Interféron alpha - sérum
INF alpha - anticorps neutralisant	Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum
INF bêta - anticorps neutralisant	Anticorps neutralisant l'interféron bêta - Sérum
INF gamma	Interféron gamma - LCR
INF gamma	Interféron gamma - sérum
INF-alpha - neutralizing antibody	Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum
Inflectra	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
Infliximab	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps	
Influenza	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
Influenza A	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Influenza A - H1	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Influenza A - H1-09	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Influenza A - H3	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Influenza A et B	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
Influenza A et B - sérologie	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
Influenza B	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR

INH	INH - Isoniazide - Sérum
INH - Isoniazide - Sérum	
INH B	Inhibine B
Inhibine A - ultra sensible - sérum	
Inhibine B	
Inhibine B - Enfant - sérum	
Inhibiteur de la C1 estérase	C1 inhibiteur - fraction du complément - fonctionnel + pondéral
Inhibiteur de la C1 estérase	C1 inhibiteur - fraction du complément - pondéral - sérum
Inhibiteur de type 1 de l'activateur du plasminogène	PAI1 - Inhibiteur de type 1 de l'activateur du plasminogène - plasma
inhibiteur du facteur IX	Anticorps anti-facteur IX - recherche - plasma
inhibiteur du facteur V	Anticorps anti-facteur V - recherche - plasma
inhibiteur du facteur VII	Anticorps anti-facteur VII - recherche - plasma
inhibiteur du facteur VIII	Anticorps anti-facteur VIII - recherche - plasma
inhibiteur du facteur XI	Anticorps anti-facteur XI - recherche - plasma
Inhibiteur du facteur XII	Anticorps anti-facteur XII - recherche - plasma
Inhibition en gel d'ammonium IV	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
INOVELON®	Rufinamide - Sérum
INR	Taux de Prothrombine - plasma
Insulin Growth Factor	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
Insulin like Growth Factor	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
Insulin-like Growth Factor Binding Protein 3	IGFBP-3 - Insulin-like Growth Factor Binding protein-3 - sérum
Insuline - anticorps anti-	Anticorps anti-insuline - sérum
Insuline - sérum	
Insulinémie	Insuline - sérum
Interféron alpha - anticorps neutralisant - sérum	
Interféron alpha - LCR	
Interféron alpha - liquide biologique	
Interféron alpha - sérum	
Interféron gamma - LCR	
Interféron gamma - sérum	
Interferon Gamma Release Assays	Production d'interféron Gamma - Quantiféron® TB Gold Plus
Interleukine	Panel Cytokine - IL1 bêta, IL2, IL4 et IL6 - sérum
Interleukine 28B (IL28B polymorphisme C/T rs 12979860) - génotypage - sang total	
Interleukine IL -10 - liquide	
Interleukine IL -10 - sérum	
Interleukine IL-1 alpha - sérum	
Interleukine IL-1 bêta - sérum	
Interleukine IL-2 - récepteur - plasma	
Interleukine IL-2 - sérum	
Interleukine IL-4 - sérum	
Interleukine IL-5 - plasma	
Interleukine IL-6 - liquide	
Interleukine IL-6 - sérum	
Interleukine IL-8 - sérum	
Intestin	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
intolérance à l'histamine	Juvenalis - DAO - activité - sérum
Intolérance alimentaire	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 100 aliments - sérum
Intolérance alimentaire	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 25 aliments - sérum
Intolérance alimentaire	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments - sérum
Intolérance alimentaire	Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments VEGAN - sérum
Intolérance alimentaire	Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum
Intolérance primaire au lactose - caractérisation génétique - sang total	
Iode - sérum	
Iode - urines	
Iode protéique	Iode - sérum
Iodémie	Iode - sérum
Iodurie	Iode - urines
Iodurie	Juvenalis - Iode - urines

Ionogramme fécal - selles	
Ions cyanures	Thiocyanates - ion - Sérum
Ions cyanures	Thiocyanates - ion - urines
Iron stain	Myélogramme - coloration de Perts
Isentress®	Raltégravir - Sérum
Isocoproporphyrines	Porphyrines - selles
Isocoproporphyrines	Porphyrines - Urines
Isoenzymes - phosphatase alcaline	Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum
Isoenzymes de la CPK	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
Isoenzymes de la LDH	LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes
Isofocalisation avec index IgG	Focalisation isoélectrique - LCR + sérum
Isoniazide	INH - Isoniazide - Sérum
Isoporphyrines	Porphyrines - Urines
Isopropanol - Sérum	
Isoprotoporphyries	Porphyrines - selles
Isoptine®	Vérapamil - Sérum
Isospora	Parasitologie - microscopie - Selles
Isosporose	Parasitologie - microscopie - Selles
Itraconazole et métabolite hydroxylé - Sérum	
Ixel®	Milnacipran - Sérum
Izilox	Moxifloxacine - Sérum
Jaeken syndrome	Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines
JAK2 - gène - mutation VAL617PHE (V617F) - sang total	
Janus kinase 2 - mutation V617F - mutation c.1849G>T	JAK2 - gène - mutation VAL617PHE (V617F) - sang total
JCV - PCR	Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR
Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total	
Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total	
Juvenalis - Apolipoprotéines A1 - sérum	
Juvenalis - Apolipoprotéines B - sérum	
Juvenalis - CAR - index - Salive	
Juvenalis - Coenzyme Q10 - CoQ10	
Juvenalis - CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum	
Juvenalis - Cuivre	
Juvenalis - DAO - activité - sérum	
Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum	
Juvenalis - HOMA - index	
Juvenalis - Homocystéine - plasma	
Juvenalis - IgG - caséine - sérum	
Juvenalis - Interleukine IL-1 alpha - sérum	
Juvenalis - Interleukine IL-1 bêta - sérum	
Juvenalis - Interleukine IL-6 - sérum	
Juvenalis - Iode - urines	
Juvenalis - LDL oxydés - sérum	
Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum	
Juvenalis - Magnésium - sérum	
Juvenalis - Panel - AgeCheck - femme	
Juvenalis - Panel - AgeCheck - homme	
Juvenalis - Panel - BasicCheck	
Juvenalis - Panel - DermaCheck	
Juvenalis - Panel - DigestCheck	
Juvenalis - Panel - FertiCheck - femme	
Juvenalis - Panel - FertiCheck - homme	
Juvenalis - Panel - NutriCheck	
Juvenalis - Panel - OxyCheck	
Juvenalis - Panel - VeggioCheck	
Juvenalis - Sélénium	
Juvenalis - Sulfate de prégnénone - sérum	
Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum	

Juvenalis - TSH - Hormone Thyroïde Stimulante - 3ème génération - sérum	
Juvenalis - Vitamine B1 - Thiamine	
Juvenalis - Vitamine B2 - Riboflavine	
Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal	
Juvenalis - Vitamine C - acide ascorbique	
Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum	
Juvenalis - Vitamine E - Tocophérol - Plasma	
Juvenalis - Vitamine PP - Niacine	
Kala-azar	Leishmaniose - diagnostic direct - PCR
Kaletra®	Lopinavir - Sérum
Kappa - Bence Jones	Chaînes légères libres Kappa - sérum
Kappa - Bence Jones	Chaînes légères libres Kappa - urines
KCNH2	Exome cardiogénétique
KCNQ1	Exome cardiogénétique
Kell foetal	Rhésus Kell - génotype foetal - sang total - prénatal
Kell sang maternel	Rhésus Kell - génotype foetal - sang total - prénatal
Keppra®	Lévétiracetam - sérum
Ketoconazole - Sérum	
Kivexa®	Abacavir - plasma
Kleihauer - test	Hémorragie foeto-maternelle - sang total
KSHV - PCR	Herpès virus type 8 - charge virale
KSHV - PCR	Herpès virus type 8 - diagnostic direct - PCR
KSHV - sérologie IgG	Herpès virus type 8 - sérologie IgG - sérum
Ku - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Kyste hydatique - échinococcose alvéolaire	Echinococcose - sérologie confirmation - sérum
Kyste hydatique - échinococcose alvéolaire	Echinococcose - sérologie dépistage - sérum
Kystes	Parasitologie - microscopie - Selles
LA	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Lactate	Acide lactique
Lactate	Acide lactique - LCR
Lactate	Corps cétoniques - Surnageant de défécats sanguin ou LCR
LAL	Immunophénotypage des hémopathies malignes
LAM	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Lambda - Bence Jones	Chaînes légères libres Lambda - sérum
Lambda - Bence Jones	Chaînes légères libres Lambda - urines
Lamictal®	Lamotrigine - sérum
Lamivudine - plasma	
Lamotrigine - sérum	
Largactil®	Chlorpromazine - Sérum
Laroxyl®	Amitriptyline - Sérum
larva migrans viscéral - sérologie	Toxocarose - sérologie confirmation - sérum
larva migrans viscéral - sérologie	Toxocarose - sérologie - sérum
Lasilix®	Furosémide - sérum
Lasilix®	Furosémide - urines
Latex -Waalser Rose en ELISA	Facteurs rhumatoïdes - sérum
LATS	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
LAV	VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie dépistage - sérum
LBI	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
LC1 - anticorps anti-cytosol	Anticorps anti-cytosol - LC1 - confirmation - sérum
LC1 - anticorps anti-cytosol	Anticorps anti-cytosol - LC1 - dépistage - sérum
LCAT	Lécithine cholestérol acyl transférase - sérum
LDH	LDH - Lactate-déshydrogénase
LDH	LDH - Lactate-déshydrogénase - sérum
LDH - isoenzymes	LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes
LDH - Lactate-déshydrogénase	
LDH - Lactate-déshydrogénase - isoenzymes	
LDH - Lactate-déshydrogénase - sérum	
LDL cholestérol	Cholestérol LDL direct - sérum

LDL oxydées - anticorps anti-	Anticorps anti-LDL oxydées - IgG et/ou IgM - sérum
LDL Oxydés - sérum	
Lécithine cholestérol acyl transférase - sérum	
Legionella pneumophila	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Legionella pneumophila - PCR	Légionellose - diagnostic direct - PCR
Legionella pneumophila - sérologie confirmation	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie confirmation IgG - sérum
Legionella pneumophila - sérologie dépistage	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum
legionelle	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum
legionellose	Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum
Légionellose - diagnostic direct - PCR	
Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie confirmation IgG - sérum	
Légionellose - sérogroupes 1 à 6 - sérologie dépistage IgG - sérum	
Légionellose antigène LP1 - urines	
Leishmaniose	Leishmaniose - diagnostic direct - PCR
Leishmaniose - diagnostic direct - PCR	
Leishmania	Leishmaniose - diagnostic direct - PCR
Léponex®	Clozapine
Lepticur - sérum	
Leptine - sérum	
Leptospirose	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
Leptospirose	Leptospirose - sérologie IgM - sérum
Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum	
Leptospirose - sérologie IgM - sérum	
Leptospirose confirmation	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
Leucémie myélomonocytaire chronique	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Leucémies aiguës	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Leucocidine	Détection toxine PVL (Staphylococcus aureus) - PCR sur souche
Lévétiracetam - sérum	
Levofloxacin - Sérum	
Lévomépromazine - Sérum	
Levures - antifongogramme - prélèvements divers	
Lexomil®	Bromazépam - Sérum
LH - Hormone Lutéostimulante - sérum	
LH - Hormone Lutéostimulante - urines	
Li	Lithium - sérum
Li - érythrocytes	Lithium érythrocytaire - sang total
Librax®	Chlordiazépoxide - Sérum
Lidocaïne - Sérum	
Likozam	Clobazam - Sérum
Lindane	Pesticides - recherche et/ou dosage
Lindane	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Lioresal	Baclofène - Sérum
Lipase - sérum	
Lipase - urines	
Lipasémie	Lipase - sérum
lipoprotéine a	Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum
lipoprotéine a	Lipoprotéine Lp-a - sérum
Lipoprotéine A1	Apolipoprotéine A1 - sérum
Lipoprotéine A1	Juvenalis - Apolipoprotéines A1 - sérum
Lipoprotéine B	Apolipoprotéine B - sérum
Lipoprotéine B	Juvenalis - Apolipoprotéines B - sérum
Lipoprotéine C3	Apolipoprotéine C3 - sérum
Lipoprotéine Lp-a - sérum	
Litatop	IgE spécifiques - dépistage allergènes respiratoires et alimentaires -Phadiatop®
Litatop	IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
Litatop	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® adulte - fx5/fx24/fx25
Litatop	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® enfant - fx26/fx27/fx28
Lithiase	Calculs Biliaires/Salivaires/Articulaires - analyse morphologique et infrarouge

Lithiase	Calcul Urinaire - analyse morphologique et infrarouge
Lithiémie	Lithium - sérum
Lithium - sérum	
Lithium érythrocytaire	Lithium érythrocytaire - sang total
Lithium érythrocytaire - sang total	
Lithium globulaire	Lithium érythrocytaire - sang total
LKM - anticorps anti- dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
LKM - anticorps anti- typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
LLC	Immunophénotypage des hémopathies malignes
LMMC	Immunophénotypage des hémopathies malignes
LMV - sérologie	Toxocarose - sérologie confirmation - sérum
LMV - sérologie	Toxocarose - sérologie - sérum
Loase	Filariose - sérologie - sérum
Locus A et B - HLA de classe I	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Locus D - HLA de classe II	HLA de classe II - Génotypage HLA-DRB1 et HLA-DQB1 - sang total
Loflazépatate d'Éthyl	
Logryx®	Minocycline - Sérum
Lopinavir - Sérum	
Loprazolam - Sérum	
Lopressor®	Métoprolol - Sérum
Lormetazépatam - Sérum	
Loxapac®	Loxapine - Sérum
Loxapine - Sérum	
Lp(a)	Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum
Lp(a)	Lipoprotéine Lp-a - sérum
LPA	Juvenalis - Lipoprotéine Lp-a - sérum
LPA	Lipoprotéine Lp-a - sérum
LRBI	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
LRBI	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
LSD - Diéthylamide acide lysergique	
LSD - Diéthylamide acide lysergique - liquide biologique	
LSD - Diéthylamide acide lysergique - urines	
LSTA	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
LTH	Prolactine - sérum
Ludiomil®	Maprotiline - Sérum
Lupus anticoagulant	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Lutéine	Caroténoïdes
Luteinizing Hormone	LH - Hormone Lutéostimulante - sérum
Luteinizing Hormone	LH - Hormone Lutéostimulante - urines
Lutéotropine	LH - Hormone Lutéostimulante - sérum
Lutéotropine	LH - Hormone Lutéostimulante - urines
Lycopène	Caroténoïdes
Lyme	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
Lyme	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum
Lyme	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR
Lyme	Borréliose - diagnostic direct - PCR
Lyme	Borréliose - sérologie confirmation IgG
Lyme	Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum
Lymphocytes B matures	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Lymphocytes B totaux	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Lymphocytes CD3	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Lymphocytes T	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Lymphogranulomatose vénérienne (LGV)	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Lymphogranulomatose vénérienne	Chlamydia trachomatis - sérologie IgA - sérum
Lymphogranulomatose vénérienne	Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum
Lymphogranulomatose vénérienne	Chlamydia trachomatis - sérologie IgM - sérum
Lymphoréticulose Bénigne d'Inoculation	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
Lymphoréticulose Bénigne d'Inoculation	Bartonellose - diagnostic direct - PCR

Lyrica	Prégabaline
Lysanxia®	Prazépam - Sérum
Lysergic acid diéthylamide	LSD - Diéthylamide acide lysergique - urines
Lyso- globotriaosylcéramide	Lyso-Gb3
Lyso-Gb3	
Lysodren	Mitotane - plasma
Lysozyme - sérum	
LZTR1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
LZTR1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Mabthera ®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Macro-CK	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
MacroCK	CPK - Créatine phosphokinase - isoenzymes - sérum
Macroglobuline alpha-2	Alpha-2 Macroglobuline - sérum
Macrolides	Helicobacter pylori et gène de résistance à la clarithromycine - diagnostic direct - PCR
Macroprolactine	Prolactine - formes moléculaires - sérum
MAG - anticorps anti-	Anticorps anti-MAG - sérum
Magnésémie	Juvenalis - Magnésium - sérum
Magnésémie	Magnésium - sérum
Magnésium - sérum	
Magnésium - urines	
Magnésium érythrocytaire - Sang total	
magnésium globulaire	Magnésium érythrocytaire - Sang total
Magnésurie	Magnésium - urines
MAIPA	Anticorps anti-plaquettes fixés ou libres - dépistage et identification
Maladie de basedow	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
maladie de Behçet B51(B5) rétinite birdshot A29	HLA de classe I - Génotypage HLA-A et HLA-B - sang total
Maladie de Chagas - confirmation	Trypanosoma cruzi - confirmation - sérum
Maladie de Chagas - recherche du parasite	Trypanosoma gambiense - recherche - LCR
Maladie de Chagas - sérologie	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
Maladie de Fabry	Alpha galactosidase A - Tâches de sang EDTA sur buvard
Maladie de Fabry	Lyso-Gb3
maladie de Gaucher	Béta glucosidase - Tâches de sang EDTA sur buvard
Maladie de Gaucher	Chitotriosidase - activité - plasma
Maladie de Lyme	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
Maladie de Lyme	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage IgG/IgM - sérum
Maladie de Lyme	Borréliose de Lyme - sérologie dépistage - LCR
Maladie de Lyme	Borréliose - diagnostic direct - PCR
Maladie de Lyme	Borréliose - sérologie confirmation IgG
Maladie de Lyme	Borréliose - sérologie confirmation IgM - sérum
Maladie de Minkowski - Chauffard	Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total
Maladie de Pompe	Alpha Glucosidase (Maltase acide) - activité - Tâches de sang EDTA sur buvard
Maladie de WEGENER	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Maladie de WEGENER	Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum
Maladie de Whipple	Tropheryma whipplei - diagnostic direct - PCR
Maladie des égoutiers	Leptospirose - sérologie IgM - sérum
Maladie des griffes du chat	Bartonellose - B. henselae - B. quintana - sérologie IgG - sérum
Maladie des griffes du chat	Bartonellose - diagnostic direct - PCR
Maladie du sommeil - recherche du parasite	Trypanosoma gambiense - recherche - LCR
Maladie du sommeil - sérologie	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
Maladie du sommeil - sérologie	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
Maladie périodique - FMF	Fièvre Méditerranéenne Familiale - gène MEFV - Etude moléculaire par séquençage
MALADIES RARES	Exome
MALADIES RARES	Exome avec interface d'interprétation
MALADIES RARES	Exome Néphrologie
Malaria - sérologie	Paludisme - sérologie - sérum
MALFORMATIONS	Exome Malformations cardiaques congénitales
Malone dialdéhyde	Dialdéhyde malonique - plasma
Mandrax®	Méthqualone - Sérum

Manganèse - Sang total	
Manganèse - Sérum	
Manganèse - urines	
Mansonella perstans	Filariose - sérologie - sérum
Maprotiline - Sérum	
Maraviroc - Sérum	
Marcaïne®	Bupivacaïne - Sérum
Marijuana	Cannabis - urines
Marqueurs des myosites	Marqueurs des myosites - sérum
Marqueurs des myosites - sérum	
Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodermies) - sérum	
Marqueurs sériques de la Trisomie 21	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
Marqueurs sériques de la Trisomie 21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
Marqueurs sériques de la Trisomie 21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
MAT - titrage d'anticorps	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
Matrix	IgE vis à vis d'allergènes multiples séparés - pneumallergènes - sérum
MAX	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MAX	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
MBDB	Amphétamines - dépistage - urines
MBG - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
MC1R	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MC1R	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
MD5	Marqueurs des myosites - sérum
MDA	4-4' Méthylènedianiline - urines
MDA	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
MDA	Amphétamines - dépistage - urines
MDA	Dialdéhyde malonique - plasma
MDH2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MDH2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
MDMA	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
MDMA	Amphétamines - confirmation - urines
MDMA	Amphétamines - dépistage - urines
MEC	Méthyléthylcétone - urines
Médullogramme	Myélogramme
Mégalérythème épidémique	Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum
Mélanone	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Mélatonine - 3 temps - urines	
Mélatonine - urines	
Mélitococcie	Brucellose - sérologie confirmation - sérum
Mélitococcie	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
Melleril®	Thioridazine - Sérum
Membrane basale + substance intercellulaires - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Membrane basale - anticorps anti	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Membrane basale glomérulaire - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
MEN1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MEN1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Méningocoque	Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR
Mépipivacaïne - sérum	
Méprobamate - Sérum	
Méprobamate - urines	
Mépronizine®	Méprobamate - Sérum
Mépronizine®	Méprobamate - urines
Mercure - cheveux	
Mercure - liquide biologique	
Mercure - salive	
Mercure - sang total	
Mercure - urines	
MERTK	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-

MERTK	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Mésotéliome	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Mestacine®	Minocycline - Sérum
Mesure de l'activité anti-IIa - Dabigatran etéxilate	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
Mesure de l'activité anti-Xa - héparine de bas poids moléculaire	Activité anti-Xa : héparine de bas poids moléculaire - HBPM - plasma
Mesure du delta cryoscopique	Osmolarité - sérum
Mesure du delta cryoscopique	Osmolarité - urines
MET	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MET	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
MET	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
MET	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Métabolite de la sérotonine	5HIA - Acide 5 hydroxy indol acétique - Urines
Métabolites du tétrahydrocannabinol	Cannabis - confirmation - urines
Métadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Métadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Métadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
métamphétamines	Amphétamines - dépistage - urines
Métanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Métanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Métanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Métapneumovirus	Viroes respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic
Metformine - Sérum	
Méthadone et EDDP - Sérum	
Méthanol	Alcool méthylique - urines
Méthanol	Alcool méthylique - Sérum
Méthaqualone - Sérum	
Méthotrexate - Sérum	
Méthotrexate Bellon®	Méthotrexate - Sérum
Méthoxyamines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Méthoxyamines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Méthoxyamines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Méthoxyamines libres	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Methoxychlor	Pesticides - recherche et/ou dosage
Methoxychlor	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Méthylbenzène	Toluène - sang total
Méthylbenzène	Toluène - urines
Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total	
Methylenedioxyamphetamine	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
Methylenedioxymetamphetamine	Amphétamines confirmation - dosage sanguin
Méthyléthylcétone - urines	
Méthylisobutylcétone - urines	
Méthylphénidate - Sérum	
Métoject®	Méthotrexate - Sérum
Métoprolol - Sérum	
MEVE	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Mg	Juvenalis - Magnésium - sérum
Mg	Magnésium érythrocytaire - Sang total
Mg	Magnésium - sérum
Mg	Magnésium - urines
MGT30 - anticorps anti-	Anticorps anti-Titine - sérum
Mi2 - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Miansérine - Sérum	
MIBK	Méthylisobutylcétone - urines
Microalbumine - urines	
Microdélétions du Chromosome Y - (régions AZFa, AZFb, AZFc) - sang total	
Microdélétions région Yq11, azospermia factor (AZF)	Microdélétions du Chromosome Y - (régions AZFa, AZFb, AZFc) - sang total
Microglobuline - Bêta 2	Bêta 2 Microglobuline - LCR
Microglobuline - Bêta 2	Bêta 2 Microglobuline - sérum

Microglobuline - Bêta 2	Bêta 2 Microglobuline - Urines
Microglobuline alpha-1	Alpha-1 Microglobuline - urines
Micropakine	Acide valproïque - sérum
Microsphérocytose héréditaire	Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total
Microsome thyroïdien - anticorps anti-	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
Microsporidies	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Microsporidiose	Cryptosporidies et Microsporidies - diagnostic direct - PCR
Midazolam - Sérum	
Milnacipran - Sérum	
Minéralocorticoïde	Aldostérone
Minéralocorticoïde	Aldostérone - urines
Minocycline - Sérum	
Mirtazapine - sérum	
MIS - Müllerian Inhibiting Substance	AMH - Hormone anti-Mullérienne - Enfant - sérum
MIS - Müllerian Inhibiting Substance	AMH - Hormone anti-Mullérienne - sérum
MITF	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MITF	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
MITF	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Mitochondries - Anticorps anti-	Anticorps anti-mitochondries - dépistage et titrage - sérum
Mitotane - plasma	
Mivacron	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
MKP	Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR
MLH1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MLH1	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
MLH1	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
MLH1	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
MMA	Acide méthylmalonique - urines
MMF	Mycophénolate - plasma
MMR	Exome Oncogénétique
Mn	Manganèse - Sang total
Mn	Manganèse - Sérum
Mn	Manganèse - urines
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum
MNI	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum
Moclamine®	Moclobémide - Sérum
Moclobémide - Sérum	
Modécate®	Fluphénazine - Sérum
Modigraf	Tacrolimus - FK506
Moditen®	Fluphénazine - Sérum
Mogadon®	Nitrazépam - Sérum
Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR	
Monohydroxybenzène	Phénol - urines
Monomères de fibrine	Complexes solubles
Mononucléose	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
Mononucléose	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgA - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie EA IgG - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum
Mononucléose infectieuse	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum
Monoxyde de carbone	Oxyde de carbone - sang total
Morphine	Opiacés confirmation - dosage sanguin
Morphine - confirmation	Opiacés - confirmation - urines

Morphine - dépistage	Opiacés - dépistage - urines
Morphologie des globules rouges	
Mort subite	Exome cardiogénétique
Motival®	Amitriptyline - Sérum
Moxifloxacine - Sérum	
MPA	Mycophénolate - plasma
MPO - anticorps anti-	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
MPO - anticorps anti-	Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum
MRSA	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
MSH2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MSH2	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
MSH2	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
MSH2	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
MSH6	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MSH6	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
MSH6	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
MSH6	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
MSM T21	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
MSM T21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
MSM T21	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
MST	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
MTX	Méthotrexate - Sérum
Mucopeptide N-acétylmuramohydrolase	Lysozyme - sérum
Mucopolysaccharides - urines	
Mucorales	Champignon - Levures - recherche
Mucormycose	Champignon - Levures - recherche
Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - prénatal	
Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - sang total	
Muramidase	Lysozyme - sérum
Muscle squelettique	Anticorps anti-muscle strié - sérum
Muscles lisses - anticorps anti-	Anticorps anti-muscle lisse - dépistage et titrage - sérum
Muscles striés - anticorps anti-	Anticorps anti-muscle strié - sérum
Mutation 1691G>A	Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total
mutation BCR ABL	Mutation Domaine tyrosine kinase ABL
Mutation c.187C>G	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total
Mutation c.193A>T	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total
Mutation C282Y	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total
Mutation C282Y	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total
Mutation c.845G>A	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - Non remboursé - sang total
Mutation c.845G>A	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Cys282Tyr - sang total
Mutation de la prothrombine	Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total
mutation de résistance aux ITK	Mutation Domaine tyrosine kinase ABL
Mutation Delta F508	Mucoviscidose - gène CFTR - recherche de 51 mutations les plus fréquentes - sang total
Mutation Domaine tyrosine kinase ABL	
Mutation du gène de la Méthylène TétraHydroFolate Réductase	Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total
Mutation G20210A	Facteur II - Prothrombine - mutation g.20210G>A - sang total
Mutation H63D	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.His63Asp - sang total
Mutation MYD88	
Mutation p.Ala222Val	Méthylène tétrahydrofolate réductase - gène MTHFR - mutation c.677C>T - sang total
Mutation p.Glu264Val et mutation p.Glu342Lys	Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations
Mutation R506Q	Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total
Mutation S65C	Hémochromatose - gène HFE - mutation p.Ser65Cys - Sang total
Mutation V Leiden	Facteur V Leiden - mutation p.Arg506Gln - sang total
MUTYH	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
MUTYH	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Mvasi®	Bevacizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Myagawanellose	Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum
Myambutol®	Ethambutol - Sérum

Myasthénie	Anticorps anti-MuSK - sérum
Myasthénie	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
MYBPC3	Exome cardiogénétique
Mycobactéries - antibiogramme	
Mycobactéries - complexe tuberculosis	Mycobactéries - PCR détection de résistances à la Rifampicine (rpoB) et l'Isoniazide
Mycobactéries - complexe tuberculosis	Mycobactéries - PCR M. tuberculosis complex (BKBM)
Mycobactéries - culture	
Mycobactéries - examen direct	
Mycobactéries - identification	
Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,	
Mycobactéries - PCR détection de résistances à la Rifampicine (rpoB) et l'Isoniazide (katG,	
Mycobactéries - PCR M. tuberculosis complex (BKBM)	
Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux	
Mycobacterium tuberculosis	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,
Mycobacterium tuberculosis - identification	
Mycologie	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Mycologie	Champignon - Levures - recherche
Mycologie	Levures - antifongogramme - prélèvements divers
Mycophénolate - plasma	
Mycophénolate Mofétil	Mycophénolate - plasma
Mycoplasma	Mycoplasmes urogénitaux - culture
Mycoplasma genitalium	Mycoplasma genitalium Recherche de mutations associées à la résistance aux
Mycoplasma genitalium	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Mycoplasma genitalium - Détection par amplification moléculaire	
Mycoplasma genitalium Recherche de mutations associées à la résistance aux macrolides	
Mycoplasma hominis	Mycoplasmes urogénitaux - culture
Mycoplasma hominis	Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum
Mycoplasma hominis	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Mycoplasma pneumoniae	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Mycoplasma pneumoniae - diagnostic direct - PCR	
Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgG - sérum	
Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgM - sérum	
Mycoplasme	Mycoplasma genitalium - Détection par amplification moléculaire
Mycoplasme	Mycoplasma pneumoniae - diagnostic direct - PCR
Mycoplasme	Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgG - sérum
Mycoplasme	Mycoplasma pneumoniae - sérologie IgM - sérum
Mycoplasmes urogénitaux - culture	
Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum	
Mycose	Champignon - Levures - identification
Mycose	Champignon - Levures - recherche
Mycoses exotiques	Champignon - Levures - recherche
MYD88 (Waldenström)	Mutation MYD88
Myéline - anticorps anti-	Anticorps anti-myéline - sérum
Myélogramme	
Myélogramme - coloration de Perls	
Myélome	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Myéloperoxydase - anticorps anti-	Anticorps anti-MPO - myéloperoxydase - sérum
Myfortic	Mycophénolate - plasma
MYH7	Exome cardiogénétique
Myolastan®	Tétrazépam - Sérum
Myosine - anticorps anti-	Anticorps anti-muscle strié - sérum
Myosite nécrosante	Marqueurs des myosites - sérum
Mysoline®	Primidone - sérum
Myxovirus influenzae - sérologie	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
N acetyl neuraminique acide	Acide sialique libre - urines
N-télopeptides	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
NA1 - anticorps anti-	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Naropeine - sérum	

NASH-FibroTest - sérum	
NASHTEST	FIBROMAX - non remboursé - sérum
NASHTEST	FIBROMAX - remboursé - sérum
NashTest 2®	NASH-FibroTest - sérum
Natural killer	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
NBN	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
NBN	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
NC 16A - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Nebcine®	Tobramycine - sérum
NEFA	Acides gras libres non estérifiés - sérum
Neisseria gonorrhoeae	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Neisseria gonorrhoeae - Détection par amplification moléculaire	
Neisseria meningitidis	Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR
Neoral®	Ciclosporine
nephroblastome	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Néphropathie	Exome Néphrologie
Nesdonal - Sérum	
Neuleptil®	Périciazine - Sérum
Neuro-endocrine	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Neuro-Endocrine	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Neuroborréliose	Borréliose de Lyme - index de synthèse intrathécale - IgG - LCR + sérum
Neuromyéélite optique - anticorps anti-	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
Neuron Specific Enolase	NSE - Neuron Specific Enolase - liquide biologique
Neuron Specific Enolase	NSE - Neuron Specific Enolase - sérum
neurones	Anticorps anti-ZIC4 - LCR
Neurones	Anticorps anti-GAD - LCR
Neurones	Anticorps anti-rétine-recovérine - sérum
Neurones	Anticorps anti-SOX1 - LCR
Neurones	Anticorps anti-SOX1 - sérum
Neurones	Anticorps anti-Titine - LCR
Neurones	Anticorps anti-Titine - sérum
Neurones	Anticorps anti-Tr(DNER) - LCR
Neurones	Anticorps anti-Tr(DNER) - sérum
Neurones	Anticorps anti-ZIC4 - sérum
Neurontin®	Gabapentine - sérum
Névirapine - plasma	
Next Generation Sequencing	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
NF1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
NF1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
NF1	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
NF2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
NF2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
NGS	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
NGS	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
NGS	Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,
NGS	Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF
NGS	Panel NGS "Mélanome " : BRAF, NRAS, KIT
NGS	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2,
NGS	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
NGS	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,
NH3	Ammoniémie - plasma
Ni	Nickel - liquide biologique
Ni	Nickel - Sérum
Ni	Nickel - urines
Niacine	Juvenalis - Vitamine PP - Niacine
Niacine	Vitamine PP - Niacine
Niaprazine - sérum	
Nickel - liquide biologique	

Nickel - Sérum	
Nickel - urines	
Nicolas-Favre - maladie de	Chlamydia trachomatis - sérologie IgA - sérum
Nicolas-Favre - maladie de	Chlamydia trachomatis - sérologie IgG - sérum
Nicolas-Favre - maladie de	Chlamydia trachomatis - sérologie IgM - sérum
Nicotinamide	Juvenalis - Vitamine PP - Niacine
Nicotinamide	Vitamine PP - Niacine
Nicotine	Cotinine - urines
Nimbex	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Ninalia	Ninalia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNc) - prénatal
Ninalia - Dépistage prénatal non invasif des trisomies 21,18 et 13(ADNc) - prénatal	
Nitrazépam - Sérum	
Nivaquine®	Chloroquine - Sérum
Nizoral®	Ketoconazole - Sérum
NK	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
NMO	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - LCR
NMO - anticorps anti-	Anticorps anti-Neuro Myélite Optique / aquaporine 4 - sérum
Noctamide®	Lormetazépam - Sérum
Noctran®	Clorzépate - Sérum
Nopron®	Niaprazine - sérum
Noradrénaline	Catécholamines libres
Noradrénaline	Catécholamines libres - enfant - urines
Noradrénaline	Catécholamines - libres - Urines
Norclobazam	Clobazam - Sérum
Norclomipramine	Clomipramine - Sérum
Norclozapine	Clozapine
Norcuron	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Nordaz ®	Nordazépam - Sérum
Nordazépam - Sérum	
Nordiazepam	Diazépam + Desméthyl diazépam - Sérum
Nordoxepine	Doxépine - Sérum
Norépinéphrine	Catécholamines libres
Norépinéphrine	Catécholamines libres - enfant - urines
Norépinéphrine	Catécholamines - libres - Urines
Norfluoxetine	Fluoxétine - sérum
Normétadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Normétadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Normétadrénaline	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Normétanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres
Normétanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - enfant - urines
Normétanéphrines	Dérivés méthoxylés des catécholamines - Métanéphrines libres - Urines
Normison®	Témazépam - Sérum
Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles	
Norovirus - recherche - Selles	
Norovirus GI/GII	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Norset®	Mirtazapine - sérum
Nortriptyline	Amitriptyline - Sérum
Norvir®	Ritonavir - Sérum
Nouveau marqueur du cancer de la prostate	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Nouveau marqueur du cancer de l'ovaire	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Nouvel index de la prostate	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Novatrex®	Méthotrexate - Sérum
Novazam®	Diazépam + Desméthyl diazépam - Sérum
Noyau - anticorps anti-	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Nozinan®	Lévomépromazine - Sérum
NSE - Neuron Specific Enolase - liquide biologique	
NSE - Neuron Specific Enolase - sérum	
NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum	

NTX	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines	
Nucléaires - anticorps anti-	Anticorps anti-nucléaires - sérum
Nucléosome - anticorps anti-	Anticorps anti-nucléosome - sérum
Nuctalon®	Estazolam - Sérum
Nutri Check	Juvenalis - Panel - NutriCheck
Nutritol	Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum
Nutritol - Panel IgG alimentaires - 100 aliments - sérum	
Nutritol - Panel IgG alimentaires - 25 aliments - sérum	
Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments - sérum	
Nutritol - Panel IgG alimentaires - 50 aliments VEGAN - sérum	
NXP2	Marqueurs des myosites - sérum
O-Crésol - urines	
Oestradiol	Estradiol - femme - sérum
Oestradiol	Estradiol - homme/enfant - sérum
Oestrone	Estrone - sérum
oeufs	Parasitologie - microscopie - Selles
Oflozet®	Ofloxacine - Sérum
Ofloxacine - Sérum	
OH Tryptamine (5-) - sang total	Sérotinine - sang total
OJ - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Olanzapine	
Oligosaccharides - recherche - urines	
Oligosaccharides - test de screening	Oligosaccharides - recherche - urines
Omega 3	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Oméga 3	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Omega 6	Juvenalis - Acides gras de la membrane érythrocytaire - chromatographie - sang total
Oméga 6	Acides gras érythrocytaires - chromatographie - Sang total EDTA
Onchocercose	Filariose - sérologie - sérum
Oncogenetique	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Oncogenetique	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Oncogenetique	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Oncogénétique	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Oncogénétique	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Oncogénétique	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Oncogénétique	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
ONCOGENETIQUE CONSTITUTIONNELLE	Exome Oncogénétique
Oncologie	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
Oncologie	Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,
Oncologie	Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF
Oncologie	Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT
Oncologie	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2,
Oncologie	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
Oncologie	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,
Oncogénétique	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Onychomycose	Champignon - Levures - recherche
Op'DDD	Mitotane - plasma
Opiacés - confirmation - urines	
Opiacés - dépistage - urines	
Opiacés confirmation - dosage sanguin	
Orap®	Pimozide - Sérum
Orbenine®	Cloxacilline - Sérum
Oreillons - diagnostic direct - PCR	
Oreillons - sérologie IgG - sérum	
Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum	
Orgaran® - anti-Xa	Activité anti-Xa : Danaparoiide - Orgaran - plasma
Ornithose	Chlamydomytila psittaci - sérologie IgA - sérum
Ornithose	Chlamydomytila psittaci - sérologie - sérum

Orosomucoïde - sérum	
Orosomucoïde Glycoprotéine acide alpha-1	Orosomucoïde - sérum
Ortho-crésol	O-Crésol - urines
Orthopoxvirus	Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR
Oses réducteurs	Sucres - recherche - selles
Osmolalité	Osmolarité - sérum
Osmolalité	Osmolarité - urines
Osmolarité - sérum	
Osmolarité - urines	
Osmolarité selles	Ionogramme fécal - selles
Ospolot®	Sultiame - Sérum
Ostase	Phosphatases alcalines osseuses
Ostéocalcine - sérum	
Ostéomark	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
Ovaire	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Ovaire	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
OVAIRE	Exome Oncogénétique
Ovaires - anticorps anti-	Anticorps anti-ovaires - sérum
Oxacilline - Sérum	
Oxalate	Acide oxalique - sérum
Oxalate	Acide oxalique - urines
Oxalémie	Acide oxalique - sérum
Oxalurie	Acide oxalique - urines
Oxazépam - Sérum	
Oxcarbazépine	10 Hydroxy-Oxcarbazépine - sérum
OxiCheck	Juvenalis - Panel - OxyCheck
OxyCheck	Juvenalis - Panel - OxyCheck
Oxyde de carbone - sang total	
P	Progestérone - sérum
P 24 - antigène VIH	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum
P1NP - Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total - sérum	
P2PSA	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
PAI1 - Inhibiteur de type 1 de l'activateur du plasminogène - plasma	
PAL	Phosphatases alcalines - sérum
PAL - isoenzymes	Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum
PAL osseuses	Phosphatases alcalines osseuses
PALB2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PALB2	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
PALB2	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Palipéridone	Rispéridone
PALOS	Phosphatases alcalines osseuses
Paludisme - sérologie - sérum	
PAM50	Test de signature moléculaire pour le pronostic du cancer du sein - Test PROSIGNA
panbactérien	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
Pancréas	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Pancréas	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Pancréas exocrine - anticorps anti-	Anticorps anti-pancréas exocrine - sérum
Pancréatite	Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum
Pancréatite auto-immune	Anticorps anti-lactoferrine et anti-anhydrase carbonique - sérum
Panel	Exome
Panel	Exome avec interface d'interprétation
Panel	Exome cardiogénétique
Panel	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
Panel	Exome Malformations cardiaques congénitales
Panel	Exome Néphrologie
Panel	Exome Oncogénétique
Panel	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
Panel	Exome Prénatal

Panel	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Panel	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Panel	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Panel	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Panel	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Panel	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Panel	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Panel	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Panel Cytokine - IL1 bêta, IL2, IL4 et IL6 - sérum	
Panel IgG alimentaires 287 aliments - sérum	
Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR	
Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR	
Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles	
Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR	
Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles	
Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR	
Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR	
Panel infertilité	Exome infertilité masculine - recherche de mutations dans les gènes impliqués dans
Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF	
Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,	
Panel NGS "GIST" : KIT, PDGFRA, BRAF	
Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT	
Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, ERBB4,	
Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS	
Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,	
Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-	
Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,	
Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4, CDKN2A,	
Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,	
Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,	
Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B, MET,	
Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1	
Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,	
Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM, MLH1,	
Panel stéroïdes - Exploration de la fonction gonadique - sérum	
Panel stéroïdes - Exploration d'un hirsutisme	
Panel stéroïdes - Recherche d'un trouble de la biosynthèse des stéroïdes - sérum	
PAO	Phosphatases alcalines osseuses
Papillomavirus	Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible
Papillomavirus - HPV Détection et typage de 19 HPV à haut risque et 18 HPV à faible risque	
Papillomavirus - recherche HPV génitaux oncogènes	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage du CCU
Papillomavirus - recherche HPV génitaux oncogènes	Détection du génome des HPV à haut risque (HR), dans le cadre du dépistage primaire
Paragangliome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Parainfluenza virus types 1, 2, 3, 4	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum	
Paramyxovirus	Oreillons - diagnostic direct - PCR
Paramyxovirus	Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum
Paramyxovirus	Rougeole - diagnostic direct - PCR
Paramyxovirus ourlien - sérologie IgG/IgM	Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum
Paramyxovirus ourlien (sérologie IgG)	Oreillons - sérologie IgG - sérum
Paraprotéines	Immunofixation - sérum
Parasite urinaire	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Parasitologie - microscopie - Selles	
Parasitoses digestives	Helminthes - Protozoaires - diagnostic direct - PCR - selles
Parastrongylus cantonensis	Angiostrongylus cantonensis - sérologie - sérum
Parathormone	PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction
Parathormone	PTH - Parathormone intacte - sérum
Parathormone related protein	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma

Parathyroïde A/B/C - sérologie	Salmonellose - sérologie - sérum
Parathyroïde - anticorps anti-	Anticorps anti-récepteur sensible du calcium - sérum
Paroxétine - sérum	
Parvovirus B19 - contrôle d'immunité - sérum	
Parvovirus B19 - diagnostic direct - PCR	
Parvovirus B19 - sérologie IgG/IgM - sérum	
PAT	Phosphatases acides totales - sérum
Paucialbumine	Microalbumine - urines
Pavulon	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Paxil®	Paroxétine - sérum
Pb	Plomb - sang total
Pb	Plomb - urines
PBG	Porphobilinogène - urines
PBI	Iode - sérum
PBKN	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
PBRM1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PBRM1	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
PC activité	Protéine C - activité
PC Ag	Protéine C - antigène - plasma
PCNA	Anticorps anti-nucléaires - sérum
PCP	Phencyclidine - Sérum
PCP - recherche	Phencyclidine - recherche - urines
PCR - ADN proviral - virus HTLV 1/2	HTLV 1/2 PCR qualitative - sang total
PCR universelle	Détection et identification d'ADN bactérien par séquençage NGS
PCT	Procalcitonine
PDF - Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine - plasma	
PDGFR alpha - exons 12, 14, 18	
Peau	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Peau	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Peau - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Péflacine®	Péfloxacin - Sérum
Péfloxacin - Sérum	
pemphigoïde	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Pemphigoïde gravidique HGF (herpes Gestationis Factor)	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
pemphigus	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire Typage
Pemphigus	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Penthotal	Nesdonal - Sérum
Peptide C - sérum	
Peptide C - Urines	
Peptide libérant la pro-gastrine (ProGRP)	
Peptide natriurétique de type B	NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum
Peptide vasoactif intestinal	VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma
Peptides citrullinés - anticorps anti-	Anticorps anti-peptides citrullinés cyclisés - CCP2 - sérum
Peptides de dégradation du collagène NTX	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
Peptides de dégradation du collagène osseux	Cross-laps
Peptides de dégradation du collagène osseux	Cross-laps - urines
Pérampanel - Sérum - PERAMPANEL	
Perchloréthylène	Tétrachloréthylène - sang total
Perchloréthylène	Tétrachloréthylène - urines
Perfluorohexanesulfonic acid (PFHxS)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum	
Perfluorobutanesulfonic acid (PFBS)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorobutanoic acid (PFBA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorodecanoic acid (PFDA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorododecanoic acid (PFDoDA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluoroheptanesulfonic acid (PFHpS)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluoroheptanoic acid (PFHpA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorohexanoic acid (PFHxA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum

Perfluorononanoic acid (PFNA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluorooctanoic acid (PFOA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluoropentanoic acid (PFPeA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Perfluoroundecanoic acid (PFUnDA)	PerFluoroAlkylSubstances (PFAS) - Sérum
Périciazine - Sérum	
Persantine®	Dipyridamole - Sérum
Pesticides - recherche et/ou dosage	
Pesticides - recherche et/ou dosage - urines	
PF4 - héparine - anticorps anti-	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Phadiatop	IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
Phemphigoïde bulleuse	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Phencyclidine - recherche - urines	
Phencyclidine - Sérum	
Phénergan®	Prométhazine - sérum
Phénobarbital - sérum	
Phénol - urines	
Phénothiazine®	Cyamémazine - Sérum
Phénothiazines - liquide de ponction	
Phénothiazines - Sérum	
Phénotypage	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Phénotypage	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Phénotypage	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
Phénotypage	Immunophénotypage : Lymphocytes NK/CD57 - sang total
Phénotypage de DPD	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
Phénotypage des blastes	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Phénotypage lymphocytaire	Immunophénotypage des hémopathies malignes
phénotype A1AT - phénotype PI (Protease Inhibitor)	Alpha-1 Antitrypsine - phénotype PI - sérum
Phénotype (C, c, E, e, Kell)	Phénotype RH-KEL1 - Sang total
Phénotype DPD	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
Phénotype érythrocytaire étendu	Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total
Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total	
Phénotype hors Rhésus kell	Phénotype étendu (autres que ABO-RH1 et RH-KEL1) - Sang total
Phénotype RH-KEL1 - Sang total	
Phénylalanine - urine	
Phénylcétonurie	Phénylalanine - urine
Phénytoïne - sérum	
Phéochromocytome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Phi	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Pholcodine	Opiacés confirmation - dosage sanguin
Pholcodine - confirmation	Opiacés - confirmation - urines
Pholcodine - dépistage	Opiacés - dépistage - urines
Phosphatase alcaline placentaire	Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum
Phosphatases acides totales - sérum	
Phosphatases alcalines - isoenzymes - sérum	
Phosphatases alcalines - sérum	
Phosphatases alcalines osseuses	
Phosphate	Phosphore - sérum
Phosphatidyl éthanolamine - anticorps IgG anti-	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgG - sérum
Phosphatidyl éthanolamine - anticorps IgM anti-	Anticorps anti-phosphatidyl éthanolamine - IgM - sérum
Phosphaturie	Phosphore - urines
Phosphore - sérum	
Phosphore - taux de réabsorption tubulaire	
Phosphore - urines	
Phylloquinone	Vitamine K1 - Phylloquinone
Phytoménadione	Vitamine K1 - Phylloquinone
PI - Protease inhibitor	Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum
PI - Protease inhibitor - génotypage	Alpha-1 Antitrypsine (Gène SERPINA1) - Génotypage des variants S et Z (mutations

P111-P	Procollagène type III - sérum
Pimozide - Sérum	
Pipampérone - Sérum	
Pipéracilline - Sérum	
Piportil®	Pipothiazine - sérum
Pipothiazine - sérum	
Pirilène®	Pyrazinamide - Sérum
Piroplasmose	Babésiose humaine - sérologie - sérum
PITCH1	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
PITCH2	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
PL12 - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
PL7 - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Plaquenil®	Hydroxychloroquine - sang total
Plasminogène - plasma	
Plasmodium falciparum - sérologie	Paludisme - sérologie - sérum
Platelet VASP	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
plathelminthes et nemaltheinthes	Parasitologie - microscopie - Selles
Platine	Cisplatine - sérum
Plavix® - - test de résistance au	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Plesiomonas shigelloides	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Plèvre	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
PIGF	Prééclampsie - Estimation du risque - sérum
Plomb - sang total	
Plomb - urines	
Plombémie	Plomb - sang total
Plomburie	Plomb - urines
PM100 - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
PM1 - anticorps anti	Marqueurs des myosites - sérum
PM75 - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
PMS2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PMS2	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés : APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
PMS2	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés : ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
PMS2	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
PMScl - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
Pneumocoque	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - LCR
Pneumocoque	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - urines
Pneumocoque	Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR
Pneumocoque - sérologie	Streptococcus pneumoniae - polysaccharide capsulaire - sérologie - sérum
Pneumocystis	Pneumocystose - Pneumocystis jirovecii - PCR quantitative / Charge fongique
Pneumocystis carinii	Pneumocystose - Pneumocystis jirovecii - PCR quantitative / Charge fongique
Pneumocystose - Pneumocystis jirovecii - PCR quantitative / Charge fongique	
Pneumogéine®	Théophylline - sérum
POLD1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
POLD1	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
POLE	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
POLE	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Poliomyelitis	Poliovirus - sérologie - sérum
Poliovirus - sérologie - sérum	
Poliovirus type 1	Poliovirus - sérologie - sérum
Polymyosites	Marqueurs des myosites - sérum
Polynucléaires neutrophiles - anticorps anti-	Anticorps anti-polynucléaires neutrophiles
Polyomavirus BK - charge virale	
Polyomavirus BK - diagnostic moléculaire	Polyomavirus BK - charge virale
Polyomavirus BK -amplification génique	Polyomavirus BK - charge virale
Polyomavirus JC - amplification génique	Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR
Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR	
Polyomavirus JC - diagnostic moléculaire	Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR
Polypeptide pancréatique - Sérum	

Pompe à protons - anticorps anti-	Anticorps anti-pompe à protons - sérum
Ponatinib - Plasma	
Porphobilinogène - urines	
Porphyrines - selles	
Porphyrines - Urines	
Porphyrines érythrocytaires	
POT1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
POT1	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Poumon	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Poumon	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
PP	Polypeptide pancréatique - Sérum
PR3 - anticorps anti-	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
PR3 - anticorps anti-	Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum
Pradaxa	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
Prasugrel	VASP - VAsodilator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Prazépam - Sérum	
Pré-éclampsie	Prééclampsie - Estimation du risque - sérum
Pré-éclampsie	Pré-éclampsie - sFlt-1 et PlGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PlGF - sérum
Pré-éclampsie - sFlt-1 et PlGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PlGF - sérum	
Préalbumine - sérum	
Précipitines aspergillaires	Aspergillose - sérologie confirmation - sérum
Précipitines aspergillaires	Aspergillose sérologie dépistage IgG - sérum
Précurseur du BNP	NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum
Précurseurs des porphyrines	Acide delta aminolévulinique - urines
Précurseurs des porphyrines	Porphobilinogène - urines
Predisposition	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Predisposition	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Predisposition	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Predisposition	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
PREDISPOSITION	Exome Oncogénétique
Prédisposition	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Prédisposition	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Prédisposition	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Prédisposition	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Prééclampsie	Pré-éclampsie - sFlt-1 et PlGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PlGF - sérum
Prééclampsie - Estimation du risque - sérum	
Prégabaline	
Prégnénone 17-hydroxy	17 Hydroxy Prégnénone - sérum
Prégnénone - 17-OH	17 Hydroxy Prégnénone - sérum
Prégnénone - sérum	
Prékallitrine - activité - plasma	
Prélèvement et auto-prélèvement vaginal	Détection des HPV-HR sur (auto) prélèvement vaginal
PRENATAL	Exome Prénatal
Previscan®	Anticoagulants oraux : Fluidione - Sérum
Prezista®	Darunavir - Sérum
Primidone - sérum	
PRIST	IgE totales - sérum
PRKN	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PRL	Prolactine - sérum
Pro-Brain Natriuretic Peptide	NT-pro BNP - Pro-Brain Natriuretic Peptide - sérum
Pro-gastrin-releasing-peptide	Peptide libérant la pro-gastrine (ProGRP)
Proaccéléline	Facteur V - Proaccéléline - plasma
Procalcitonine	
Procollagène III peptide	Procollagène type III - sérum
Procollagène type III - sérum	
Proconvertine	Facteur VII - Proconvertine - plasma
Prodilantin	Phénytoïne - sérum
Production d'interféron Gamma - Quantiferon® TB Gold Plus	

Produit de dégradation spécifique de la fibrine	D-Dimères - plasma
Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine	PDF - Produits de dégradation du fibrinogène et de la fibrine - plasma
Progesterone - sérum	
Progesterone- 17- OH	17 Hydroxy Progesterone - sérum
Prograf®	Tacrolimus - FK506
Proinsuline - sérum	
Prolactine - formes moléculaires - sérum	
Prolactine - sérum	
Prolactine monomérique prolactine little	Prolactine - formes moléculaires - sérum
prolactine PEG	Prolactine - formes moléculaires - sérum
Pro lans A	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - sérum
Pro lans A	FSH - Hormone Folliculo Stimulante - urines
PROLANS B	hCG molécule dimère (Alpha + Béta) - sérum
Prométhazine - sérum	
Propafénone - Sérum	
Propanol®	Isopropanol - Sérum
Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total	P1NP - Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total - sérum
Propeptide N-terminal du procollagène III	Procollagène type III - sérum
Propofan®	Dextropropoxyphène - urines
Propoxyphène	Dextropropoxyphène - urines
Propranolol - Sérum	
proPSA	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Prostate	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Prostate	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Prostate Health Index	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
Protéase du facteur Willebrand	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Protease inhibitor	Alpha-1 Antitrypsine - dosage - sérum
Protéin 4	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Protéinase 3 - anticorps anti-	Anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles - ANCA - sérum
Protéinase 3 - anticorps anti-	Anticorps anti-PR3 - protéinase 3 - sérum
Protéine 14.3.3 - LCR	
Protéine ABETA 1-42	Protéines TAU - Amyloïde - LCR
Protéine bêta amyloïde	Protéines TAU - Amyloïde - LCR
protéine C	Protéine C - activité
Protéine C - activité	
Protéine C - antigène - plasma	
Protéine C activité	Protéine C - activité
Protéine C amidolytique	Protéine C - activité
Protéine C Antigène	Protéine C - antigène - plasma
Protéine C réactive	CRP - Protéine C Réactive - sérum
Protéine C Réactive - ultrasensible	CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
Protéine C Réactive - ultrasensible	Juvenalis - CRP - Protéine C Réactive - ultra sensible - sérum
Protéine chimio attractive des monocytes (MCP-1) - sérum	
Protéine de Bence Jones	Bence Jones - recherche
Protéine de transport de la testostérone	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Protéine HC	Alpha-1 Microglobuline - urines
Protéine OB	Leptine - sérum
protéine S	Protéine S - activité
Protéine S100 - sérum	
Protéine S - activité	
Protéine S activité	Protéine S - activité
Protéine S libre - antigène - plasma	
Protéine S libre Antigène	Protéine S libre - antigène - plasma
Protéine S totale - antigène - plasma	
Protéine S totale Antigène	Protéine S totale - antigène - plasma
Protéine S-100 bêta	Protéine S100 - sérum
Protéine sérum amyloïde A	Sérum Amyloïde A Protéine - SAA - sérum
Protéine Tau phosphorylée	Protéines TAU - Amyloïde - LCR

Protéine thermo soluble	Bence Jones - recherche
Protéïnémie	Protéines - dosage - sérum
Protéines - dosage - sérum	
Protéines - dosage - urines	
Protéines - liquide biologique	
Protéines glyquées	Fructosamine - sérum
Protéines TAU - Amyloïde - LCR	
Protéines urinaires	Electrophorèse des protéines - urines
Protéinogramme	Electrophorèse des protéines - sérum
Protéinogramme	Electrophorèse des protéines - urines
Protéinogramme	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Protéinurie	Protéines - dosage - urines
Protéinurie de Bence Jones	Bence Jones - recherche
Prothiaden®	Dosulépine - Sérum
Prothrombine - activité	Facteur II - Prothrombine - activité - plasma
Prothrombine - anticorps IgG anti- G	Anticorps anti-prothrombine - IgG - sérum
Prothrombine - fragment 1+2	Fragment 1+2 - prothrombine - plasma
Protide	Protéines - liquide biologique
Protidémie	Protéines - dosage - sérum
Protides - électrophorèse	Electrophorèse des protéines - sérum
Protides - électrophorèse	Electrophorèse des protéines - urines
Protides - électrophorèse	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Protides sériques - Immunofixation	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Protides sériques - Immunofixation	Immunofixation - sérum
Protidogramme	Electrophorèse des protéines - sérum
Protidogramme	Electrophorèse et Immunofixation des protéines sériques - sérum
Protopic®	Tacrolimus - FK506
Protoporphyrines	Porphyrines érythrocytaires
Protoporphyrines	Porphyrines - selles
Protozoaires	Helminthes - Protozoaires - diagnostic direct - PCR - selles
Provitamine A	Bêta carotène
Prozac®	Fluoxétine - sérum
PRSS1	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
Prussian blue stain	Myélogramme - coloration de Perls
PS activité	Protéine S - activité
PS libre Ag	Protéine S libre - antigène - plasma
PS totale Ag	Protéine S totale - antigène - plasma
PS-100	Protéine S100 - sérum
PSA - Antigène spécifique prostatique libre - sérum	
PSA - Antigène spécifique prostatique total - liquide de ponction	
PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum	
PSA ultra sensible	PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum
PSA2	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
PSAL	PSA - Antigène spécifique prostatique libre - sérum
PSAT	PSA - Antigène spécifique prostatique total - liquide de ponction
PSAT	PSA - Antigène spécifique prostatique total - sérum
Pseudocholinestérase	Cholinestérase - activité enzymatique - sérum
Psittacose	Chlamydomphila psittaci - sérologie IgA - sérum
Psittacose	Chlamydomphila psittaci - sérologie - sérum
PTCH1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PTCH2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PTEN	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
PTEN	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
PTEN	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
PTEN	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
PTEN	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
PTH 1-84	PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction
PTH 1-84	PTH - Parathormone intacte - sérum

PTH - intacte	PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction
PTH - intacte	PTH - Parathormone intacte - sérum
PTH - Parathormone intacte - liquide de ponction	
PTH - Parathormone intacte - sérum	
PTH like	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma
PTH native	PTH - Parathormone intacte - sérum
PTH related peptide	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma
PTH-RP - Parathormone related protein - plasma	
PTHrP	PTH-RP - Parathormone related protein - plasma
PTT	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
PUCE	Exome
PUCE	Exome avec interface d'interprétation
PUCE	Exome Néphrologie
Puce a ADN	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
PUCE A ADN	Exome Prénatal
Puce à ADN	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
Puce à ADN	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
Pulmonaire	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Purpura thrombotique thrombocytopénique	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Puumala	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
PV1	Poliovirus - sérologie - sérum
PVS1	Poliovirus - sérologie - sérum
Pyrazinamide - Sérum	
Pyridoxal	Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxal	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxal phosphate	Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxal phosphate	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxamine	Juvenalis - Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxamine	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyridoxine	Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal
Pyruvate	Acide pyruvique - Surnageant de défécate ou LCR
Pyruvate	Corps cétoniques - Surnageant de défécate sanguin ou LCR
Pyruvate kinase érythrocytaire	Pyruvate kinase érythrocytaire - sang total
Pyruvate kinase érythrocytaire - sang total	
Quantiferon® TB Gold Plus	Production d'interféron Gamma - Quantiferon® TB Gold Plus
Quétiapine	
Quinidine - Sérum	
QUINIMAX	Quinine - Sérum
Quinine - Sérum	
Quitaxon®	Doxépine - Sérum
R. mooseri	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
R-IL-2	Interleukine IL-2 - récepteur - plasma
RAC	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
RAD51B	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
RAD51C	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
RAD51C	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
RAD51C	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
RAD51D	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Rage	Rage - sérologie - sérum
Rage - anticorps anti-	Rage - sérologie - sérum
Rage - sérologie - sérum	
RAI - recherche/identification	Agglutinines irrégulières - RAI - recherche/identification
Raltégravir - Sérum	
Rapamune®	Sirolimus
Rapid Plasma Reagin	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
RAST IgE latex - allergène unique	IgE spécifiques : latex - allergène unique
RAST IgE médicaments - allergène unique	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Hycor
RAST IgE médicaments - allergène unique	IgE spécifiques médicaments-allergènes uniques-Phadia

RAST IgE spécifiques - allergène unique	IgE spécifiques - pneumallergènes - allergène unique - Hycor
RAST IgE spécifiques - allergène unique	IgE spécifiques : pneumallergènes - allergène unique - Phadia
RAST IgE spécifiques - mélange de pneumallergènes	IgE spécifiques : pneumallergènes - mélange allergènes
RAST IgE spécifiques - trophallergènes - allergène unique	IgE spécifiques : trophallergènes - allergène unique - Phadia
RAST IgE spécifiques - trophallergènes - allergènes mélange	IgE spécifiques : trophallergènes - mélange allergènes - sérum
RAST IgE spécifiques - venins d'hyménoptère	IgE spécifiques : venins d'hyménoptère - allergène unique
RAST IgG	IgG spécifiques - sérum
RAST IgG	Juvenalis - IgG - caséine - sérum
RAST IgG4	IgG4 spécifiques - sérum
RB1	Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1
RBP	Retinol Binding Protein - RBP
Réaction de Sandell et Kolthoff	Iode - sérum
Réaction de Sandell et Kolthoff	Iode - urines
Réaction de Sandell et Kolthoff	Juvenalis - Iode - urines
Récepteur de la TSH - anticorps anti-	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
Récepteur de l'acétylcholine - anticorps anti-	Anticorps anti-récepteur de l'acétylcholine - sérum
Récepteur Interleukine 2	Interleukine IL-2 - récepteur - plasma
Récepteur soluble de la Transferrine - sérum	
Récepteur soluble Interleukine 2	Interleukine IL-2 - récepteur - plasma
Recherche de chaînes légères libres	Bence Jones - recherche
Recherche de déficit arylsulfatase	Sulfatides - urines
Recherche de mutation de la résistance de l'hépatite C	Hépatite C - profil de résistance aux anti-viraux - sérum
Recherche de stéatorrhée	Stéatorrhée - dosage des graisses - selles
Recherche de thrombopénie induite par l'héparine	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Recherche des toxines B et binaires de Clostridium difficile	Clostridium difficile - toxines - recherche par PCR
Rectal	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
RED51D	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Rein	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
réinterprétation d'exome	
Remsima	Infliximab - taux résiduel et dosage des anticorps
Renal	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Rénine active	
Rénine active - couché	
Rénine active - debout	
Rénome	Exome Néphrologie
Répaglinide	Sulfamides hypoglycémiantes - sérum
Résistance à la protéine C activée	
Résistance à l'éthionamide	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,
Résistance à l'insuline	HOMA - index - sérum
Résistance à l'insuline	Juvenalis - HOMA - index
Résistance à l'isoniazide	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,
Résistance aux antibiotiques injectables de deuxième ligne (aminosides)	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,
Résistance aux fluoroquinolones	Mycobactéries - PCR détection de mutations associées à la résistance à l'isoniazide,
Résistance aux macrolides	Mycoplasma genitalium Recherche de mutations associées à la résistance aux
RET	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
RET	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Réticulum endoplasmique - anticorps anti- dépistage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - dépistage - sérum
Réticulum endoplasmique - anticorps anti- typage	Anticorps anti-LKM - réticulum endoplasmique - typage - sérum
Rétine	Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1
Rétinoblastome	Panel oncogénétique Rétinoblastome Gène ciblé : RB1
Rétinol	Vitamine A - Rétinol - Plasma
Retinol Binding Protein - RBP	
Rétrovir®	Zidovudine - plasma
Reverse T3	T3 - Triiodothyronine reverse
Reverse triiodothyronine	T3 - Triiodothyronine reverse
Rexort	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
Reyataz®	Atazanavir - Sérum
RH3 (RHE) foetal	RH3(E) foetal - génotypage

RH3(E) foetal - génotypage	
RH4 (RHc) foetal	RHc foetal - génotypage
RHc foetal - génotypage	
RHD	Rhésus D - génotype foetal - prénatal
Rhésus D	Groupes sanguins - génotypage - sang total
Rhésus D	Rhésus D - génotype foetal - prénatal
Rhésus D - génotype foetal - prénatal	
Rhésus foetal	Rhésus D - génotype foetal - prénatal
Rhésus Kell - génotype foetal - sang total - prénatal	
Rhésus/Kell	Phénotype RH-KEL1 - Sang total
Rhinovirus	Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic
Ri - anticorps anti-	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Riboflavine	Juvenalis - Vitamine B2 - Riboflavine
Riboflavine	Vitamine B2 - Riboflavine
Ribosomes - anticorps anti-	Anticorps anti-ribosomes - sérum
Rickettsia prowazekii	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Rickettsie	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum	
Rifabutine - Sérum	
Rifadine®	Rifampicine - sérum
Rifampicine - sérum	
Rifater®	Pyrazinamide - Sérum
Rilpivirine - plasma	
RIMIFON	INH - Isoniazide - Sérum
Risk of Ovarian Malignancy Algorithm	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Rispedal®	Rispéridone
Rispéridone	
RIST	IgE totales - sérum
Ritaline	Méthylphénidate - Sérum
Ritemvia®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Ritonavir - Sérum	
Rituxan®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Rituximab	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
Rituzena®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Rivaroxaban - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma	
Rivotril®	Clonazépam - Sérum
Rixathon®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Riximyo®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
RNA polymérase	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodémies) - sérum
RNA polymérase	Marqueurs des Scléroses systémiques progressives (Sclérodémies) - sérum
RO52	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
RoActemra	Tocilizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
ROCA	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Rocephine®	Ceftriaxone - Sérum
Rohypnol®	Flunitrazépam - sérum
ROMA	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Ropivacaine®	Naropéine - sérum
Rose Bengale et Wright	Brucellose - sérologie dépistage - sérum
Rosenthal - facteur	Facteur XI - Rosenthal - plasma
Roséole	Herpès virus type 6 - sérologie IgG - sérum
Roséole	Herpès virus type 6 - sérologie IgM - sérum
Rotavirus - recherche rapide - Selles	
Rotavirus A	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Rougeole - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum	
Rougeole - diagnostic direct - PCR	
Rougeole - sérologie IgG/IgM - sérum	
Rougeole IgG - Index de synthèse intrathécal - LCR + sérum	

Rovalcyte	Ganciclovir - plasma
RPCa	Résistance à la protéine C activée
RPR	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
RPR quantitatif	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
RPR titrage	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
rli	Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux
rrs	Mycobactéries atypiques - PCR détection de la résistance aux macrolides et aux
RSSE	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
RST	Récepteur soluble de la Transferrine - sérum
RsTf	Récepteur soluble de la Transferrine - sérum
rT3	T3 - Triiodothyronine reverse
RTEL1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
RTEL1	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum	
Rufinamide - Sérum	
Rythmodan®	Disopyramide - sérum
Rythmol®	Propafénone - Sérum
S-100 protéine	Protéine S100 - sérum
Sabril®	Vigabatrin - Sérum
Saccharomyces cerevisiae - anticorps anti-	Anticorps anti-Saccharomyces cerevisiae - IgG/IgA - sérum
SAE	Marqueurs des myosites - sérum
SAICAR	Adénylosuccinase - recherche d'un syndrome de déficit - urines
Salmonella sp	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Salmonellose - sérologie - sérum	
Sandimun®	Ciclosporine
Sanger	Séquençage Ciblé - Postnatal
Sanger	Séquençage Ciblé - Prénatal
Sapovirus GI/GII/GIV/GV	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
sarcopte	Gale - Sarcoptes scabiei - recherche
Sarcoptes scabiei	Gale - Sarcoptes scabiei - recherche
SARM	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
SARS-CoV-2	COVID-19 (SARS-CoV-2) sérologie IgG anti-S
SARS-CoV-2	Panel infectieux : COVID 19 / Grippe A et B - diagnostic direct - PCR
SARS-CoV-2	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
Saturnisme	Plomb - sang total
SBG	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
SBP	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
SCA	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
scabiose	Gale - Sarcoptes scabiei - recherche
SCC	Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction
SCC	Antigène SCC - TA4 - sérum
Schistosoma haematobium	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Schistosoma mansoni	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Schistosomes	Bilharziose - diagnostic direct - PCR
Schistosomes	Bilharziose - sérologie confirmation - sérum
Schistosomes	Bilharziose - sérologie dépistage - sérum
Schizocytes	Morphologie des globules rouges
Schwachmann - test de	Chymotrypsine
Schwannome	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Sclérose en plaques	Anticorps anti-Natalizumab - sérum
SCN-	Thiocyanates - ion - Sérum
SCN-	Thiocyanates - ion - urines
SCN5A	Exome cardiogénétique
Score de matutes	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Score de ROMA	HE4 - Calcul ROMA - sérum
Score phi	[-2]pro-PSA - calcul du phi - sérum
SCSA	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
SDHA	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum

SDHA	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
SDHA	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SDHA	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SDHA	Sulfate de DHEA salivaire - salive
SDHAF2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SDHAF2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SDHAF2	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
SDHB	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SDHB	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SDHB	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
SDHC	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SDHC	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SDHC	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
SDHD	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SDHD	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SDHD	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
SDHEA	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
SDHEA	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
SDHEA	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Se	Juvenalis - Sélénium
Se	Sélénium
Se	Sélénium - urines
SEBG	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Sectral®	Acebutolol - sérum
Sein	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Sein	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
SEIN	Exome Oncogénétique
Sélénium	
Sélénium - urines	
Séloken®	Métoprolol - Sérum
Sels biliaires	Acides biliaires - chromatographie - sérum
Sels biliaires	Acides biliaires - sérum
Sensibilité aux antifongiques	Champignon - Levures - CMI : Concentration Minimale Inhibitrice
Sensibilité aux antifongiques	Levures - antifongigramme - prélèvements divers
Seoul	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
SEP	Anticorps anti-Natalizumab - sérum
SEQONE	Exome avec interface d'interprétation
SEQUENCAGE	Exome Prénatal
Séquençage Ciblé - Postnatal	
Séquençage Ciblé - Prénatal	
Séquençage du gène codant la protéine d'enveloppe gp120	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) :
Sérécor®	Hydroquinidine - Sérum
Séresta®	Oxazépam - Sérum
Sérologie de Hirst	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
sérologie streptococcique	Anti-streptolysine - ASLO - sérum
Sérologie West Nile	West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum
Séromucoïde alpha 1	Orosomucoïde - sérum
Seroplex	Escitalopram - sérum
Sérotonine - sang total	
Sertraline - sérum	
Sérum amyloïde A	Sérum Amyloïde A Protéine - SAA - sérum
Sérum Amyloïde A Protéine - SAA - sérum	
SETD2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SETD2	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Sex Binding Globulin	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Sex Binding Globulin - SHBG - sérum	
Sex Hormone Binding Globulin	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Sézary - cellules de	Cellules de Sézary - recherche - frottis

sFlt-1	Pré-éclampsie - sFlt-1 et PlGF - Test prédictif - ratio sFlt-1/PlGF - sérum
Shérocycose héréditaire	Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total
Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC)	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Shit	Cannabis - urines
Si	Silicium - Plasma
Sidérémie	Fer - sérum
Sidéroblastes	Myélogramme - coloration de Perls
Sidérophiline	Transferrine - sérum
Sidérurie	Fer - urines
sIgA	IgA - immunoglobulines A sécrétoires - selles
Silicium - Plasma	
Simponi®	Golimumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Sin	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
Sinequan®	Doxépine - Sérum
Sirolimus	
SLA/LP - anticorps anti-	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
SLC25A11	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SLC25A11	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SMAD4	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SMAD4	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
SMARCB1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SMARCB1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SMC	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
Smith-Lemli-Opitz - syndrome de	7 Déhydrocholestérol
SMT	Mélatonine - 3 temps - urines
SMT	Mélatonine - urines
snp	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
snp	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - sang total
SNP	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
SNP -array	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - Produit Fausse couche
snp-array	Caryotype Moléculaire Constitutionnel - SNP ARRAY - prénatal
SNV	Exome
SNV	Exome avec interface d'interprétation
SNV	Exome cardiogénétique
SNV	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
SNV	Exome Malformations cardiaques congénitales
SNV	Exome Néphrologie
SNV	Exome Oncogénétique
SNV	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
SNV	Exome Prénatal
SNV	Hantavirus - sérologie IgG/IgM - sérum
SNV	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SNV	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
SNV	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés : APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
SNV	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
SNV	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
SNV	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés : BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
SNV	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés : ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
SNV	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
SOD	Superoxyde dismutase - SOD
Solian®	Amisulpride - Sérum
Soluble Liver Antigen - anticorps anti-	Anticorps anti-SLA - Soluble Liver Antigen - sérum
Somathormone	GH - Hormone de croissance - sérum
Somatocrinine	GHRH - Growth Hormone Releasing Hormone - plasma
Somatomédine C	IGF-1 - Somatomédine C - sérum
Somatostatine - plasma	
Somatotrophic Hormone	GH - Hormone de croissance - sérum

Somatotrophine	GH - Hormone de croissance - sérum
Somatotropin Release Inhibiting Factor	Somatostatine - plasma
Somatotrophine	GH - Hormone de croissance - sérum
Sotalex®	Sotalol - sérum
Sotalol - sérum	
Sous classes des IgA - IgA1/2	IgA - immunoglobulines A - sous classes IgA1 et IgA2 - sérum
Sous classes IgG 1	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 1 - sérum
Sous classes IgG 2	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 2 - sérum
Sous classes IgG 3	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 3 - sérum
Sous classes IgG 4	IgG - immunoglobulines G - sous classes IgG 4 - sérum
Sous unité Alpha - HCG, FSH, LH, TSH - sérum	
Sous-unité bêta - HCG libre	hCG - chaîne bêta libre - sous unité - sérum
Spanor®	Doxycycline - Sérum
Sperm Chromatin Structure Assay	Fragmentation de l'ADN - Décondensation de l'ADN - SCSA - Sperme
Spermatozoïdes - anticorps anti-	Anticorps anti-spermatozoïdes - recherche indirecte
Sphérocytes	Morphologie des globules rouges
Sphérocytose héréditaire - recherche (test à l'éosine 5'maléimide - EMA) - sang total	
Spingolipides	Anticorps anti-glycolipides - sérum
SPINK1	Exome Panel pancréatites chroniques et héréditaires
Spironolactone	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Sporanox®	Itraconazole et métabolite hydroxylé - Sérum
Squamous Cell Carcinoma	Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction
Squamous Cell Carcinoma	Antigène SCC - TA4 - sérum
SRIF	Somatostatine - plasma
SRP - anticorps anti-	Marqueurs des myosites - sérum
SSA	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Scl 70, centromère B) - dépistage et
Stablon®	Tianeptine - sérum
Stallertest	IgE spécifiques : dépistage allergènes respiratoires - Phadiatop®
Stavudine - plasma	
Stéatorrhée - dosage des graisses - selles	
STEATOTEST	FIBROMAX - non remboursé - sérum
STEATOTEST	FIBROMAX - remboursé - sérum
SteatoTest 2®.	NASH-FibroTest - sérum
Stelara®	Ustekinumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Steroid cell antibodies	Anticorps anti-glandes surrénales - sérum
STH	GH - Hormone de croissance - sérum
Stilnox®	Zolpidem - Sérum
Stiripentol - Sérum	
STK11	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
STK11	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
STN1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
STN1	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Streptococcus pneumoniae	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - LCR
Streptococcus pneumoniae	Antigènes bactériens solubles Streptococcus pneumoniae - urines
Streptococcus pneumoniae	Bactérie désignée - diagnostic direct - PCR
Streptococcus pneumoniae - polysaccharide capsulaire - sérologie - sérum	
Streptococcus pneumoniae - sérologie	Streptococcus pneumoniae - polysaccharide capsulaire - sérologie - sérum
Stress oxydatif	Juvenalis - Panel - OxyCheck
stretodornase	Anti-streptodornase B - ASD B - sérum
Stribild	Ténofovir - plasma
Stribild®	Cobicistat - plasma
Stribild®	Elvitegravir - Sérum
Strongyloïdose - sérologie	Anguillulose - sérologie - sérum
Stuart - facteur	Facteur X - Stuart - plasma
Substance intercellulaire + membrane basale - anticorps anti-	Anticorps anti-membrane basale épidermique et substance intercellulaire - sérum
Subutex	Buprénorphine - Sérum
Subutex®	Buprénorphine et métabolites - urines
Succinylcholine	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum

Sucres - recherche - selles	
SUFU	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
SUFU	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Sulfamides hypoglycémians - sérum	
Sulfamides hypoglycémians - urines	
Sulfate de déhydroépiandrostérone	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Sulfate de déhydroépiandrostérone	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Sulfate de déhydroépiandrostérone	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Sulfate de delta 5-prégnénone	Juvenalis - Sulfate de prégnénone - sérum
Sulfate de delta 5-prégnénone	Sulfate de prégnénone - sérum
Sulfate de DHA	DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Sulfate de DHA	Juvenalis - DHEAS - Sulfate de Déhydroépiandrostérone - sérum
Sulfate de DHA	Sulfate de DHEA salivaire - salive
Sulfate de DHEA salivaire - salive	
Sulfate de prégnénone - sérum	
Sulfatides - urines	
Sulfatoxy mélatonine	Mélatonine - 3 temps - urines
Sulfatoxy mélatonine	Mélatonine - urines
Sulpiride - Sérum	
Sultiame - Sérum	
Sultopride - Sérum	
Superoxyde dismutase - SOD	
Surmontil®	Trimipramine - Sérum
Surquina®	Quinidine - Sérum
Sustiva®	Efavirenz - plasma
Syndrome d' Upshaw-Schulman	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Syndrome de Brugata	Exome cardiogénétique
Syndrome de Down	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
Syndrome de Down	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
Syndrome de Down	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
Syndrome de Gilbert - recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347)	
Syndrome de Goodpasture	Anticorps anti-membrane basale glomérulaire - sérum
Syndrome de Smith-Lemli-Opitz	7 Déhydrocholestérol
Syndrome du QT Long	Exome cardiogénétique
SYNDROME MALORMATIFS	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
Syndrome SLO	7 Déhydrocholestérol
Synédil®	Sulpiride - Sérum
synthèse intra-thécale des IgG	Focalisation isoélectrique - LCR + sérum
Syphilis	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
Syphilis	Treponema pallidum - détection par PCR
Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum	
Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum	
Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum	
Syphilis - sérologie IgM - sérum	
Syphilis - suivi de traitement	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Syphilis - titrage - LCR	
Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif	
T21 - marqueurs sériques	Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum
T21 - marqueurs sériques	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum
T21 - marqueurs sériques	Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum
t-PA	Activateur tissulaire du plasminogène - tPA - antigène - plasma
T3, T4, T8	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
T3 - anticorps anti	Anticorps anti-T3 - triiodothyronine
T3 - Triiodothyronine - urines	
T3 - Triiodothyronine reverse	
T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum	
T3 reverse	T3 - Triiodothyronine reverse
T3 totale - Triiodothyronine totale - sérum	

T4 - anticorps anti	Anticorps anti-T4 - thyroxine
T4 - Thyroxine - urines	
T4 libre - Thyroxine libre - sérum	
T4 totale - Thyroxine totale - sérum	
TA 4	Antigène SCC - TA4 - liquide de ponction
TA 4	Antigène SCC - TA4 - sérum
Tacrolimus	Tacrolimus - FK506
Tacrolimus - FK506	
Taenia	Cysticerose - Taenia Solium - sérologie IgG - sérum
Taenia solium	Cysticerose - sérologie confirmation
Taenia Solium	Cysticerose - Taenia Solium - sérologie IgG - sérum
TAG 72	Antigène CA 72-4 - liquide de ponction
TAG 72	Antigène CA 72-4 - sérum
Taloxa®	Felbamate - Sérum
Targocid®	Teicoplanine - sérum
Taux de Prothrombine - plasma	
Taux de Réabsorption tubulaire du Phosphore	Phosphore - taux de réabsorption tubulaire
Tavanic®	Levofloxacin - Sérum
Tazocilline®	Pipéracilline - Sérum
TBG	Thyroxine Binding globuline - TBG - sérum
TBII	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
TCE + TCA	Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines
TCK	Temps de céphaline activé - TCA - plasma
TCT	Calcitonine - liquide de ponction
TCT	Calcitonine - sérum
TDA	Coombs direct érythrocytaire - sang total
TeBG	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Tégréto®	Carbamazépine - sérum
Teicoplanine - sérum	
Télopeptide C du procollagène I	Cross-laps
Télopeptide C du procollagène I	Cross-laps - urines
Télopeptides N du collagène	NTX - télopeptides N terminal collagène I - urines
Telzir®	Amprénavir - Sérum
Telzir®	Fosamprenavir - Sérum
Témazépam - Sérum	
Temgesic®	Buprénorphine et métabolites - urines
Temgesic®	Buprénorphine - Sérum
Temps de céphaline activé - TCA - plasma	
Temps de Quick	Taux de Prothrombine - plasma
Temps de thrombine	
Temps de thrombine dilué	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
Temps de thrombine modifié	Dabigatran - Mesure de l'activité anti-IIa du Dabigatran - plasma
Temps de venin de vipère Russel dilué	Anticoagulant circulant - lupus anticoagulant - recherche
Temps d'hémolyse 50 - Complément voie alterne - sérum	
Ténofovir - plasma	
Téralithe	Lithium - sérum
Téralithe - érythrocytes	Lithium érythrocytaire - sang total
Tercian®	Cyamémazine - Sérum
TERF2IP	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TERF2IP	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
TERT	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TERT	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Test au D.xylose	Xylose - sérum
Test compagnon	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
Test compagnon	Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,
Test compagnon	Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF
Test compagnon	Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT
Test compagnon	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2,

Test compagnon	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
Test compagnon	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,
Test de Coombs direct	Coombs direct érythrocytaire - sang total
Test de Dahlback	Résistance à la protéine C activée
Test de FARR	Anticorps anti-ADN double brin - Test de Farr - sérum
Test de microagglutination lyse de Martin et Pettit - titrage anticorps	Leptospirose - anticorps par microagglutination - Martin et Pettit - sérum
Test de résistance à la protéine C activée	Résistance à la protéine C activée
Test de résistance au Clopidogrel	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Test de résistance au Plavix®	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Test de résistance aux Thiénoopyridines	VASP - VAsodilatator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Test de signature moléculaire pour le pronostic du cancer du sein - Test PROSIGNA	
Test direct à l'antiglobuline	Coombs direct érythrocytaire - sang total
Test d'Itano	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
Test fonctionnel réalisé en agrégométrie	Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel
Test moléculaire non invasif pour le suivi du cancer de la vessie (Test Xpert Bladder Cancer	
Test non tréponémique	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Test Quantiféron	Production d'interféron Gamma - Quantiféron® TB Gold Plus
Test sanguin de production d'interféron Gamma	Production d'interféron Gamma - Quantiféron® TB Gold Plus
Test tréponémique EIA	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
Test tréponémique ELISA	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
Testicules - anticorps anti-	Anticorps anti-testicules - sérum
Testostérone - femme/enfant - sérum	
Testostérone - homme - sérum	
Testostérone active	Testostérone biodisponible - sérum
Testosterone Binding Globulin	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Testostérone bioactive	Testostérone biodisponible - sérum
Testostérone biodisponible - femme/enfant - sérum	
Testostérone biodisponible - sérum	
Testosterone estradiol Binding Globulin	Sex Binding Globulin - SHBG - sérum
Testostérone libre - Sérum	
Testostérone liée	Testostérone - femme/enfant - sérum
Testostérone liée	Testostérone - homme - sérum
Testostérone non liée à la SHBG	Testostérone biodisponible - sérum
Testostérone totale	Testostérone - femme/enfant - sérum
Testostérone totale	Testostérone - homme - sérum
Tests respiratoires à l'Urée 13C - Helicobacter pylori	Helicobacter pylori - test respiratoire à l'Urée 13C - air expiré
Tétanique	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Tétanos	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum	
Tétra Hydro aldostérone	Aldostérone - urines
Tétrachloréthylène - sang total	
Tétrachloréthylène - urines	
Tétrachlorométhane - sang total	
Tétrachlorure de carbone	Tétrachlorométhane - sang total
Tétrahydrocannabinol	Cannabis - cheveux
Tétrahydrocannabinol	Cannabis confirmation - dosage sanguin
Tétrahydrocannabinol	Cannabis - confirmation - urines
Tétrahydrocannabinol	Cannabis - urines
Tétraiodothyronine	T4 - Thyroxine - urines
Tétraiodothyronine libre	T4 libre - Thyroxine libre - sérum
Tétraiodothyronine totale	T4 totale - Thyroxine totale - sérum
Tétralogie de Fallot	Exome Malformations cardiaques congénitales
Tétrazépam - Sérum	
Tg	Thyroglobuline - sérum
TH50a	Temps d'hémolyse 50 - Complément voie alterne - sérum
Thalassémie	Globine - étude du gène alpha ou bêta - postnatal
Thalassémie	Hémoglobine - électrophorèse - sang total
THC	Cannabis confirmation - dosage sanguin

THC-COOH	Cannabis confirmation - dosage sanguin
THC-COOH	Cannabis - confirmation - urines
THC-COOH	Cannabis - urines
Théophylline - sérum	
Théralène®	Alimémazine - Sérum
Thérapie ciblée	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
Thérapie ciblée	Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,
Thérapie ciblée	Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF
Thérapie ciblée	Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT
Thérapie ciblée	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2,
Thérapie ciblée	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
Thérapie ciblée	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,
Thiamine	Juvenalis - Vitamin B1 - Thiamine
Thiamine	Vitamine B1 - Thiamine
Thiocyanates - ion - Sérum	
Thiocyanates - ion - urines	
Thiopental®	Nesdonal - Sérum
Thiopurine S-Méthyltransférase - activité	
Thiopurine S-méthyltransférase - génotypage - sang total	
Thiopurine S-méthyltransférase - phénotypage	Thiopurine S-Méthyltransférase - activité
Thioridazine - Sérum	
Thrombocystine	Sérotonine - sang total
Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel	
Thrombopénie induite par l'héparine - recherche	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Thrombotonine	Sérotonine - sang total
Thymidine kinase - Sérum	
Thyréostimuline - 3ème génération	Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Thyréostimuline - 3ème génération	TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Thyréotropine - ultra-sensible - 3ème génération	Juvenalis - TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Thyréotropine - ultra-sensible - 3ème génération	TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum
Thyrocalcitonine	Calcitonine - liquide de ponction
Thyrocalcitonine	Calcitonine - sérum
Thyroglobuline - anticorps anti-	Anticorps anti-thyroglobuline - sérum
Thyroglobuline - sérum	
Thyroglobuline ultra sensible	Thyroglobuline - sérum
Thyroperoxydase - anticorps anti-	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum
Thyroxine	T4 - Thyroxine - urines
Thyroxine - anticorps anti-	Anticorps anti-T4 - thyroxine
Thyroxine Binding globuline - TBG - sérum	
Thyroxine libre	T4 libre - Thyroxine libre - sérum
Thyroxine totale	T4 totale - Thyroxine totale - sérum
Ti	Titane
Tiagabine - Sérum	
Tianeptine - sérum	
Tiapridal®	Tiapride - Sérum
Tiapride - Sérum	
TIBC	Fer - capacité totale de fixation - sérum
Tick Born Encephalitis	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
TIF	Marqueurs des myosites - sérum
TIF 1	Marqueurs des myosites - sérum
TIH	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
TIH	Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel
TIH - recherche	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
TIH - recherche	Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel
TIH - test fonctionnel	Thrombopénie induite à l'héparine - test fonctionnel
Tildiem®	Diltiazem - sérum
TIPMP	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
Tissue Polypeptide Antigen	TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum

Titane	
Titine- anticorps anti-	Anticorps anti-Titine - sérum
TIVICAY	Dolutégravir - Sérum
TK	Thymidine kinase - Sérum
TMAM127	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
TMC114	Darunavir - Sérum
TMC125	Etravirine - plasma
TMEM127	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TMEM127	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum	
TNT	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Tobacco test	Cotinine - urines
Tobi®	Tobramycine - sérum
Tobradax®	Tobramycine - sérum
Tobramycine - sérum	
Tobrex®	Tobramycine - sérum
Tocilizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
Tocophérol	Juvenalis - Vitamine E - Tocophérol - Plasma
Tocophérol	Vitamine E - Tocophérol - Plasma
Tofranil®	Imipramine - Sérum
Tolbutamide	Sulfamides hypoglycémians - sérum
Tolbutamide	Sulfamides hypoglycémians - urines
Tolexine®	Doxycycline - Sérum
Toluène - sang total	
Toluène - urines	
Topalgic®	Tramadol - Sérum
Topiramate - sérum	
Total procollagène type 1 N Propeptide	P1NP - Propeptide N-Terminal du procollagène de type 1 total - sérum
Toxicité 5-FU	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
toxicité aux thiopurines ou à l'azathioprine	Thiopurine S-méthyltransférase - génotypage - sang total
Toxicité capécitabine	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
Toxicité fluoropyrimidines	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
toxicité fluoropyrimidines ou 5-FU - exploration de la DPD	Evaluation du risque toxique aux Fluoropyrimidines génotypage de la dihydropyrimidine
toxicité irinotécan ou Campto - UGT1A1	UGT1A1 : recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347) - impliqué dans le
toxine	Clostridium difficile - Dépistage - recherche de glutamate déshydrogénase (GDH)
Toxine botulique - Clostridium botulinum - botulisme	
Toxine de Panton Valentine	Détection toxine PVL (Staphylococcus aureus) - PCR sur souche
Toxine diphtérique - anticorps anti-	Diphthérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Toxocara canis	Toxocarose - sérologie confirmation - sérum
Toxocara canis	Toxocarose - sérologie - sérum
Toxocarose - sérologie - sérum	
Toxocarose - sérologie confirmation - sérum	
Toxoplasmose - avidité anticorps - IgG - sérum	
Toxoplasmose - sérologie IgG/IgM - sérum	
TP	Taux de Prothrombine - plasma
TP53	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TP53	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
TP53	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,
TP53	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
TP53	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
TPA	TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum
TPA - Antigène Tissulaire Polypeptidique - sérum	
TPHA EIA	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
TPHA ELISA	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
TPHA immunoenzymatique	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
TPMT	Thiopurine S-Méthyltransférase - activité
TPMT	Thiopurine S-méthyltransférase - génotypage - sang total
TPO - anticorps anti-	Anticorps anti-thyroperoxydase - sérum

TRAB	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
Tracrium	IgE spécifiques : ammonium IV - curare - sérum
TRAK	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
Tramadol - Sérum	
Trans-Chlordane	Pesticides - recherche et/ou dosage
Trans-Chlordane	Pesticides - recherche et/ou dosage - urines
Transcortine	CBG - Cortisol Binding Globulin - Transcortine - sérum
Transcriptase Inverse - Séquençage du gène de la	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase)
Transferrine - sérum	
Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum	
Transferrine Carboxy déficiente - sérum	
Transferrine déficiente en acide sialique	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Transferrine déficiente en acide sialique	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Transferrine désialylée	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Transferrine désialylée	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Transferrine hyposialylée	Transferrine Carboxy déficiente - permis de conduire - sérum
Transferrine hyposialylée	Transferrine Carboxy déficiente - sérum
Transferrine récepteur soluble	Récepteur soluble de la Transferrine - sérum
Transglutaminase tissulaire humaine - IgA - anticorps anti-	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum
Transglutaminase tissulaire humaine - IgG - anticorps anti-	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum
transmission entérale	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
transmission entérale	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
transmission oro-fécale	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
transmission oro-fécale	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
Transposition des Gros Vaisseaux	Exome Malformations cardiaques congénitales
Transthyrétine	Préalbumine - sérum
Tranxène®	Clorzépatate - Sérum
Trazodone - Sérum	
Trazolan®	Trazodone - Sérum
Treponema pallidum	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Treponema pallidum	Panel Infectieux - Ulcérations génitales - diagnostic direct - PCR
Treponema pallidum	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
Treponema pallidum - détection par PCR	
tréponématose	Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum
tréponématose	Syphilis - sérologie IgM - sérum
tréponématose	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
tréponématose	Syphilis - titrage - LCR
Tréponématose	Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum
tréponème	Syphilis - Test Tréponémique - sérologie dépistage - sérum
tréponème	Syphilis - titrage - LCR
Tréponème	Syphilis - sérologie confirmation IgG - sérum
Tréponème	Syphilis - sérologie confirmation IgM - sérum
Tréponème	Syphilis - sérologie IgM - sérum
TRF	Transferrine - sérum
Triazolam - sérum	
Trichinellose - sérologie confirmation - sérum	
Trichinellose - sérologie IgG - sérum	
Trichinose	Trichinellose - sérologie confirmation - sérum
Trichinose	Trichinellose - sérologie IgG - sérum
Trichloracétate	Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines
Trichloroéthanol	Acide trichloracétique + Trichloroéthanol - TCE + TCA - urines
Trichlorométhane - sang total	
Trichomonas vaginalis	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Triflucan®	Fluconazole - Sérum
Trihéxypénydyle - Sérum	
Triiodothyronine - anticorps anti-	Anticorps anti-T3 - triiodothyronine
Triiodothyronine libre	T3 libre - Triiodothyronine libre - sérum
Triiodothyronine totale	T3 totale - Triiodothyronine totale - sérum

Trileptal®	10 Hydroxy-Oxcarbazépine - sérum
TRIM21	Anticorps anti-ENA (SSA, SSB, Sm, Rnp, Jo1, Sci 70, centromère B) - dépistage et
Trimipramine - Sérum	
Trisomie 21 - dépistage combiné du 1er trimestre - Sérum	
Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 2 paramètres - Sérum	
Trisomie 21 - marqueurs sériques maternels - 3 paramètres - Sérum	
Triumeq®	Abacavir - plasma
Triumeq®	Lamivudine - plasma
Trizivir®	Abacavir - plasma
Tropatépine®	Lepticur - sérum
Trophatop adulte - fx5/fx24/fx25	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® adulte - fx5/fx24/fx25
Trophatop enfant	IgE spécifiques : dépistage trophallergènes - Trophatop® enfant - fx26/fx27/fx28
Tropheryma whipplei - diagnostic direct - PCR	
Trou osmotique	Ionogramme fécal - selles
TROUBLE DEVELOPPEMENT	Exome Déficience intellectuelle isolée ou syndromique et trouble neurodéveloppemental
TRP	Phosphore - taux de réabsorption tubulaire
Truvada® (emtricitabine + ténofovir)	Emtricitabine - plasma
Truvada® (emtricitabine + ténofovir)	Ténofovir - plasma
Truxima®	Rituximab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum
Trypanosoma cruzi - confirmation - sérum	
Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum	
Trypanosoma gambiense - recherche - LCR	
Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR	
Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum	
Trypanosome	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
Trypanosome	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
Trypanosome	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
Trypanosomiase - sérologie	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
Trypanosomiase - sérologie	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
Trypanosomiase - sérologie	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
Trypanosomiase africaine	Trypanosoma gambiense - sérologie - LCR
Trypanosomiase africaine	Trypanosoma gambiense - sérologie - sérum
Trypanosomiase Sud américaine	Trypanosoma cruzi - sérologie - sérum
Trypanosomiase Sud américaine - confirmation	Trypanosoma cruzi - confirmation - sérum
TSC1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TSC1	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
TSC1	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
TSC2	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
TSC2	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
TSC2	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
TSH - Hormone Thyroé Stimulante - 3ème génération - sérum	
TSI	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
TSI : THYROIDE STIMULATINE IMMUNOGLOBULINE	Anticorps anti-récepteur de la TSH - sérum
TT	Temps de thrombine
tt-MA	Acide trans muconique - t,t-MA - urines
TTCA	Acide 2-thiothiazolidine-4-carboxylique - urines
TTG - IgA - anticorps anti-	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgA - sérum
TTG - IgG - anticorps anti-	Anticorps anti-transglutaminase tissulaire humaine - IgG - sérum
TTN	Exome cardiogénétique
TTR	Préalbumine - sérum
Tuberculose - antibiogramme	Mycobactéries - antibiogramme
Tuberculose - culture	Mycobactéries - culture
Tuberculose - examen direct	Mycobactéries - examen direct
Tuberculose - identification	Mycobacterium tuberculosis - identification
Tularémie - Francisella tularensis - sérologie - sérum	
Tumeur	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
Tumeur	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
Tumeur	Panel oncogénétique pancréas Gènes ciblés: APC, ATM, BRCA1, BRCA2, CDK4,

Tumeur	Panel oncogénétique peau Gènes ciblés : ACD, BAP1, CDK4, CDKN2A, FLCN, MC1R,
Tumeur	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
Tumeur	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Tumeur	Panel oncogénétique sein ovaire prostate Gènes ciblés: ATM, BRCA1, BRCA2, CDH1,
Tumeur	Panel oncogénétique tube digestif Gènes ciblés : APC, BMPR1A, CDH1, EPCAM,
Tumeur solide	Panel NGS "COLO-RECTAL 1" : KRAS, NRAS, BRAF
Tumeur solide	Panel NGS "COLO-RECTAL 2": AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, EGFR, HER2, FBXW7,
Tumeur solide	Panel NGS "GIST " : KIT, PDGFRA, BRAF
Tumeur solide	Panel NGS "Mélanome" : BRAF, NRAS, KIT
Tumeur solide	Panel NGS "PAN ORGANE" : AKT1, ALK, BRAF, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2,
Tumeur solide	Panel NGS "Poumon 1": EGFR, BRAF, MET, KRAS
Tumeur solide	Panel NGS "POUMON 2": AKT1, ALK, BRAF, DDR2, EGFR, HER2, FGFR1, FGFR2,
Tumeur Vessie	Test moléculaire non invasif pour le suivi du cancer de la vessie (Test Xpert Bladder
Tumeurs endocrines	Sérotonine - sang total
Tumor Necrosis Factor	Juvenalis - TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
Tumor Necrosis Factor	TNF alpha - Tumor Necrosis Factor - sérum
TWAR	Chlamydia pneumoniae - sérologie IgG/IgM - sérum
Typage de la cryoglobuline, cryoglobuline I ou II ou III.	Cryoglobulines - identification - Sérum
Typage des syndromes lymphoprolifératifs	Immunophénotypage des hémopathies malignes
Typage HLA B27	HLA B27 - génotypage - sang total
Typage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes B - CD 19 - sang total
Typage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes CD3-CD4-CD8 - sang total
Typage lymphocytaire	Immunophénotypage : Lymphocytes CD56+ / CD16+ - Cellules Natural Killer - sang total
Typhoïde - sérologie	Salmonellose - sérologie - sérum
Typhus exanthématique	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Typhus murin	Rickettsioses - R. conorii, R. typhi - sérologie - sérum
Tyrosine phosphatase - anticorps anti-	Anticorps anti-tyrosine phosphatase - IA2 - sérum
Tysabri®	Anticorps anti-Natalizumab - sérum
Ubiquinone	Coenzyme Q10 - CoQ10 - Sérum
Ubiquinone	Juvenalis - Coenzyme Q10 - CoQ10
UGT1A1 : recherche du polymorphisme UGT1A1*28(rs8175347) - impliqué dans le	
Upshaw-Schulman - syndrome	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)	
Uracilémie	Uracile - dosage (recherche de toxicité aux fluoropyrimidines)
Urates	Acide urique - sérum
Urates urinaire	Acide urique
Uraturie	Acide urique
Urbanyl®	Clobazam - Sérum
Ureaplasma parvum	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Ureaplasma urealyticum	Mycoplasmes urogénitaux - culture
Ureaplasma urealyticum	Mycoplasmes urogénitaux - sérologie - sérum
Ureaplasma urealyticum	Panel infectieux - Infections sexuellement transmissibles
Uricémie	Acide urique - sérum
Uricurie	Acide urique
Uroporphyrines	Porphyries - selles
Uroporphyrines	Porphyries - Urines
Ustekinumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
vaccination	Diptérie - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
vaccination	Haemophilus influenzae b - sérologie IgG - sérum
vaccination	Tétanos - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Valganciclovir	Ganciclovir - plasma
Valium®	Diazépam + Desméthyl diazépam - Sérum
Valproate de sodium	Acide valproïque - sérum
Valpromide	Acide valproïque - sérum
Vancocine®	Vancomycine - sérum
Vancomycine - sérum	
Vanylmandélate	Acide vanylmandélique - Urine
Variant	COVID-19-(SARS-CoV-2)- criblage de mutations du gène S par RT-PCR

varicella-zoster virus	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
Varicelle Zona	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR	
Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique	
Varicelle Zona - sérologie IgG - sérum	
Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum	
Variole du singe	Monkeypox virus - diagnostic direct - PCR
Vasoactive intestinal peptide	VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma
VAsodilator Stimulated Phosphoprotein	VASP - VAsodilator Stimulated Phosphoprotein - sang total
Vasopressine	ADH - Hormone antidiurétique
Vasopressine	ADH - Hormone antidiurétique - urine
VASP - VAsodilator Stimulated Phosphoprotein - sang total	
VCA - sérologie IgA	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgA - sérum
VCA - sérologie IgG	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG, EBNA IgG - sérum
VCA - sérologie IgM	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgM - sérum
VCA - sérologie VCA IgG/IgM	Epstein Barr Virus - EBV - sérologie VCA IgG/IgM - EBNA IgG - sérum
VDRL	Syphilis - titrage - LCR
VDRL	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
VDRL quantitatif	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
VDRL suivi	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
VDRL titrage	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Vedolizumab - taux résiduel et dosage des anticorps - sérum	
Veggie Check	Juvenalis - Panel - VeggieCheck
Veneral Diseases Research Laboratory	Syphilis - VDRL ou RPR quantitatif
Venlafaxine - sérum	
Vérapamil - Sérum	
Vératran®	Clotiazépam - sérum
VFEND	Voriconazole - Sérum
VHA - anticorps IgM	Hépatite A - anticorps IgM - sérum
VHA - anticorps totaux	Hépatite A - recherche immunité IgG - sérum
VHB - anticorps IgM anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc IgM - sérum
VHB - anticorps totaux anti-HBc	Hépatite B - anticorps anti-HBc totaux - sérum
VHB - anticorps totaux anti-HBe	Hépatite B - anticorps anti-HBe - sérum
VHB - anticorps totaux anti-HBs - titrage	Hépatite B - anticorps anti-HBs - titrage - sérum
VHB - antigène HBe	Hépatite B - antigène HBe - sérum
VHB - antigène HBs	Hépatite B - antigène HBs - qualitatif - sérum
VHB - détermination quantitative - charge virale	Hépatite B - charge virale - PCR
VHB - profil de résistance aux anti-viraux	Hépatite B Genotypage et Profil de résistance aux anti-viraux - sérum
VHC - détermination quantitative - charge virale	Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN
VHC - génotypage	Hépatite C - génotypage
VHC - sérologie dépistage	Hépatite C - sérologie dépistage - sérum
VHD - anticorps IgM	Hépatite Delta - anticorps IgM - sérum
VHD - anticorps totaux	Hépatite Delta - anticorps totaux - sérum
VHD - antigène	Hépatite Delta - antigène - sérum
VHD ARN	Hépatite Delta - charge virale - PCR
VHE	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
VHE	Hépatite E - diagnostic direct - PCR
VHE - anticorps IgG	Hépatite E - anticorps IgG - sérum
VHE - anticorps IgM	Hépatite E - anticorps IgM - sérum
VHL	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
VHL	Panel oncogénétique Neuro-Endocrine Gènes ciblés : DLST, DNMT3A, EGLN1, EGLN2,
VHL	Panel oncogénétique Poumon Gènes ciblés : ATM, BAP1, BRCA1, BRCA2, CDKN2A,
VHL	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
Vibramycine®	Doxycycline - Sérum
Vibraveineuse®	Doxycycline - Sérum
Vibrio cholerae	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Vibrio (V. parahaemolyticus/V. vulnificus/ V. cholerae)	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
Victan®	Loflazépate d'Ethyl

Victrelis®	Bocéprévir - plasma
Vigabatrin - Sérum	
VIH	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
VIH	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR
VIH 1	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR
VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma	
VIH 2	VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie de confirmation par technique	
VIH1/2 - Virus Immunodéficience Humaine - sérologie dépistage - sérum	
VIH - Virus Immunodéficience Humaine - antigène P24 - sérum	
VIH - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - LCR	
VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase et	
VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) : profil	
VIH2 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma	
VIII R (related)-Ag	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
Viloxazine - Sérum	
VIP - Vasoactive Intestinal Polypeptide - plasma	
Viramune®	Névirapine - plasma
VIREMIE HBV	Hépatite B - charge virale - PCR
VIREMIE HCV	Hépatite C - Détection - quantification de l'ARN
VIREMIE HIV	VIH1 - Virus Immunodéficience Humaine - charge virale - Plasma
Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic direct -	
Virus amaril	Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum
virus Coxsackie	Entérovirus - diagnostic direct - PCR
Virus de la rougeole - contrôle d'immunité IgG	Rougeole - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Virus de la rubéole - avidité des anticorps	Rubéole - avidité anticorps - IgG - sérum
Virus de l'immunodéficience humaine - profil de résistance aux anti-viraux	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (gènes de la reverse transcriptase
Virus de l'immunodéficience humaine - Profil de résistance aux anti-viraux	VIH - Virus Immunodéficience Humaine - génotypage (inhibiteurs de fusion d'entrée) :
Virus de Norwalk	Norovirus - diagnostic direct - PCR - Selles
Virus de Norwalk	Norovirus - recherche - Selles
Virus du Nil occidental	West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum
Virus JC - amplification génique	Polyomavirus JC - diagnostic direct - PCR
Virus morbilleux - contrôle d'immunité IgG	Rougeole - contrôle d'immunité - sérologie IgG - sérum
Virus ourlien - sérologie IgG/IgM	Oreillons - sérologie IgG/IgM - sérum
Virus ourlien (sérodiagnostic : IgG)	Oreillons - sérologie IgG - sérum
Virus Parainfluenza 1, 2, 3 - sérologie	Parainfluenzae 1, 2, 3 - sérologie IgG - sérum
Virus pneumotropes - adénovirus	Adénovirus - recherche - Selles
Virus pneumotropes - adénovirus	Adénovirus - sérologie - sérum
Virus pneumotropes -grippe - sérologie	Grippe A et B - sérologie IgG - sérum
Virus respiratoire syncytial	Virus respiratoire syncytial - VRS - sérologie IgG - sérum
Virus respiratoire syncytial - VRS - sérologie IgG - sérum	
Virus TBE- sérologie	Encéphalite à tiques - TBE - sérologie IgG/IgM - sérum
Vitamine A - Rétinol - Plasma	
Vitamine B1 - Thiamine	
Vitamine B12 - sérum	
Vitamine B2 - Riboflavine	
Vitamine B3	Juvenalis - Vitamine PP - Niacine
Vitamine B3	Vitamine PP - Niacine
Vitamine B6 - Phosphate de pyridoxal	
Vitamine B8 ou H - Biotine	
Vitamine B9	Acide folique sérique - sérum
Vitamine B9 érythrocytaire	Acide folique érythrocytaire - sang total
Vitamine B9 érythrocytaire	Juvenalis - Acide folique érythrocytaire - sang total
Vitamine C - Acide ascorbique	
Vitamine D - 1,25- dihydroxy-vitamine D - sérum	
Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum	
Vitamine D native	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Vitamine D native	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum

Vitamine D3 1,25 - hydroxy	Vitamine D - 1,25 - dihydroxy-vitamine D - sérum
Vitamine D3 25 - hydroxy	Juvenalis - Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Vitamine D3 25- hydroxy	Vitamine D - 25- hydroxy-vitamine D - D2 + D3 - sérum
Vitamine E - Tocophérol - Plasma	
Vitamine H	Vitamine B8 ou H - Biotine
Vitamine K1 - Phylloquinone	
Vitamine PP - Niacine	
VITT	Anticorps anti-PF4 - héparine - plasma
Vivalan®	Viloxazine - Sérum
VLCFA	Acides gras à très longues chaînes - C22 à C26 - plasma
VMA	Acide vanilylmandélique - Urine
Von Willebrand antigen factor	Facteur Willebrand - antigène - plasma
Von Willebrand factor	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
Voriconazole - Sérum	
Vortioxétine - Sérum	
Votubia	Évérolimus
VRE	Bactérie multi-résistante aux antibiotiques (BMR) - recherche
VRS	Panel infectieux - Infections Respiratoires - diagnostic direct - PCR
VRS A/B	Viroses respiratoires pédiatriques (VRS / Métapneumovirus / Rhinovirus) - diagnostic
VWF:Ag	Facteur Willebrand - antigène - plasma
vWFCP	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
VWF:Rco	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
VZV	Panel infectieux - Eruptions vésiculeuses - diagnostic direct - PCR
VZV	Panel infectieux - méningoencéphalite virale - diagnostic direct - PCR - LCR
VZV	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR - liquide amniotique
VZV - ADN viral - PCR	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR
VZV - contrôle immunité - anticorps IgG	Varicelle Zona - sérologie IgG - sérum
VZV - sérologie IgM	Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum
West Nile virus	West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum
West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum	
Western - blot HTLV	HTLV 1/2 - sérologie confirmation - sérum
Whipple - maladie	Tropheryma whipplei - diagnostic direct - PCR
WHOLE EXOME SEQUENCING	Exome Prénatal
Widal et Félix - sérodiagnostic de	Salmonellose - sérologie - sérum
Willebrand - facteur	Facteur Willebrand - activité cofacteur de la ristocétine + Facteur VIII activité - plasma
Willebrand factor cleaving protease	ADAMTS13 - Protéase du facteur Willebrand
Wilms	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
WNV	West Nile virus - WNV - sérologie IgG/IgM - sérum
Wright et Rose Bengale	Brucellose - sérologie dépitage - sérum
WT1	Panel oncogénétique étendu sein, ovaire, prostate, tube digestif, pancréas, rein, neuro-
WT1	Panel oncogénétique rein Gènes ciblés: BAP1, BRK1, CDKN2B, FH, FLNC, HNF1B,
X Fragile - syndrome - prénatal	
X Fragile - syndrome - sang total	
Xanax®	Alprazolam - Sérum
Xarelto®	Rivaroxaban - Mesure de l'activité anti-Xa - plasma
Xépion	Rispéridone
Xeroquel	Quétiapine
Xipamide	Diurétiques - recherche et dosage - urines
Xylocaine®	Lidocaïne - Sérum
Xylose - sérum	
Xylosémie	Xylose - sérum
Yersinia enterocolitica	Panel Infectieux - Gastro-intestinal - diagnostic direct - PCR - Selles
YFV	Fièvre Jaune - contrôle d'immunité - sérum
Yo - anticorps anti-	Anticorps anti-neurones (Hu, Ri, Yo, CV2, Amphiphysine et Ma2) - sérum
Zarontin®	Ethosuximide - sérum
Zéaxanthine	Caroténoïdes
Zebinix	10 Hydroxy-Oxcarbapézine - sérum
Zerit®	Stavudine - plasma

Ziagen®	Abacavir - plasma
Zidovudine - plasma	
Zika	Zika - sérologie - sérum
Zika - sérologie - sérum	
Zinc	
Zinc - plasma séminal	
Zinc - urines	
Zincémie	Zinc
Zn	Zinc
Zn	Zinc - plasma séminal
Zn	Zinc - urines
Zoloft®	Sertraline - sérum
Zolpidem - Sérum	
Zona - ADN viral - PCR	Varicelle Zona - diagnostic direct - PCR
Zona - contrôle d'immunité - anticorps IgG	Varicelle Zona - sérologie IgG - sérum
Zona - sérologie gM	Varicelle Zona - sérologie IgM - sérum
Zonegran	Zonisamide - Sérum
Zonisamide - Sérum	
Zovirax®	Aciclovir - plasma
Zuclopthixol - Sérum	
Zyprexa®	Olanzapine



Votre nouvel espace correspondant personnalisé destiné à faciliter les échanges quotidiens avec Eurofins Biomnis :

- Accéder aux résultats
- Consulter les factures
- Gérer son compte en ligne
- Commander le matériel de prélèvement
- Contacter directement les secrétariats spécialisés grâce à la messagerie intégrée
- Consulter le référentiel des examens
- Accéder directement à toutes les ressources scientifiques et outils pratiques Eurofins Biomnis

Simple, rapide, pratique...

Rendez-vous sur connect.eurofins-biomnis.com

www.eurofins-biomnis.com