

## Fiche de renseignements cliniques Coprologie fonctionnelle

DIVISION INTERNATIONALE - Tél. : +33 (0)4 72 80 23 85 - Fax : +33 (0)4 72 80 73 56 - E-mail : [international@biomnis.eurofinseu.com](mailto:international@biomnis.eurofinseu.com)

### PATIENT

Nom : ..... Prénom : .....

Age : ..... ans

Date de naissance : .....

Sexe :  F  M

### ELASTASE

**PROTOCOLE** Envoi d'un échantillon de selles, minimum 20 g (ou une noix de selles) à température réfrigérée.

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Insuffisance pancréatique exocrine connue :  OUI  NON

Si oui, quel diagnostic étiologique :  éthylisme  mucoviscidose  IP idiopathique, médicamenteuse, obstructive

Enzymothérapie substitutive :  OUI  NON

### CALPROTECTINE

**PROTOCOLE** Envoi d'un échantillon de selles, minimum 20 g (ou une noix de selles) à température réfrigérée.

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

MICI (Crohn, RCH) :  OUI  NON

Traitement MICI en cours :  OUI  NON

Si oui, quel traitement :  dérivés salicylés  corticoïdes  immunosupresseurs  anti-TNF

### FECALOGRAMME, STEATORRHEE ET CREATIRRHEE SUR 24 HEURES

#### PROTOCOLE DE RECUEIL ET D'ENVOI DES SELLES :

- Recueil des selles sur 24, 48 ou 72 heures dans des pots de volume suffisant, fournis par le laboratoire.
- Regroupement des selles de 48 ou 72h dans **UN MEME SACHET ET UN SEUL DOSSIER** de façon à constituer un seul examen réalisé à partir d'un pool de selles de 48 ou 72h.
- Ne pas remplir au-delà des 2/3. Volume minimum indispensable = 30g.
- Vérifier le vissage du couvercle pour une bonne fermeture du pot afin d'éviter les fuites de prélèvement.
- Prendre soin de collecter les selles nocturnes.
- Conserver les selles au réfrigérateur pour limiter les phénomènes de fermentation.
- Chaque pot est identifié par le nom, prénom, date de naissance et date de recueil des selles.
- Il est indispensable de fournir les informations sur la durée de recueil des selles au laboratoire.

### CONSEILS

- **Si le médecin prescrit un régime enrichi en beurre** : consommer minimum 50g de beurre par jour les 3 jours précédent le recueil et pendant le recueil pour le dosage de la stéatorrhée et le fécalogramme.
- Eviter le consommation d'oléagineux (cacahuètes, noix, noisettes, avocats) pendant les 3 jours précédent le recueil et pendant le recueil.
- Eviter la prise de médicaments ralentisseurs du transit, les préparations à la coloscopie, les suppositoires, les laxatifs, les pansements intestinaux et les examens radiologiques avec opacification digestive, les 3 jours précédent le recueil et pendant le recueil.

### RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Antécédents chirurgicaux digestifs :  Gastrectomie  Colectomie  Autres : .....

Pathologie digestives :  MICI  maladie coeliaque  IPE  Autres : .....

Pathologie endocrinienne, neuro-endocrinienne :  Diabète  Hyperthyroïdie  Autres : .....

Notion d'amaigrissement :  OUI  NON *Si oui, préciser :* .....

Nombre de selles par jour en moyenne : .....

Notion de régime alimentaire :  Végétarien  Végétalien  Sans gluten  Aucun  Autres : .....

Traitement en cours (à visée digestive) : .....