eurofins | Biomnis

Fiche de renseignements cliniques
TIH

PATIENT

Nom : .....

Prénom : .....

Date de naissance : |_|_|_|_|_|_|_|_|

SERVICE

Service : .....

Nom du prescripteur : .....

N° tél service : |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

TRAITEMENT ACTUEL PAR HÉPARINE

Nom héparine : ..... Date du début du traitement : |_|_|_|_|_|_|_|_|

Indication : ..... Date d'arrêt du traitement : |_|_|_|_|_|_|_|_|

TRAITEMENT ANTÉRIEUR PAR HÉPARINE (< 3 MOIS)

Nom de l'héparine : ..... ☐ OUI ☐ NON

Date du traitement : |_|_|_|_|_|_|_|_|

RELAIS ACTUEL PAR ORGARAN

Date de début de traitement : |_|_|_|_|_|_|_|_| ☐ OUI ☐ NON

APPARITION D'UNE THROMBOSE CLINIQUE SOUS HÉPARINE

Date de réalisation ECHODOPPLER/SCANNER : |_|_|_|_|_|_|_|_| ☐ OUI ☐ NON

AUTRES CAUSES POSSIBLES DE THROMBOPÉNIE

- Infection en cours, CIVD : ..... ☐ OUI ☐ NON ☐ Ne sait pas
- Autres causes (chirurgie, chimiothérapie...) : ..... ☐ OUI ☐ NON ☐ Ne sait pas
- Autres médicaments responsables de thrombopénie : ..... ☐ OUI ☐ NON ☐ Ne sait pas

.....

NUMÉRATION	Avant héparine	J0	J1	...	...	...	...
Date							
Plaquettes (G/L)							
Hb (g/L)							

SCORE CLINIQUE DE LA PROBABILITÉ DE TIH : RÈGLE DES "4T"

THROMBOPÉNIE

- ↓ > à 50 % ET nadir > 20G/L ET pas de chirurgie dans les 3 jours précédents — Score = 2 ☐
- Autres cas — Score = 1 ☐
- ↓ < 30 % OU plaquettes =< 10 G/l — Score = 0 ☐

CINÉTIQUE DE THROMBOPÉNIE

- ↓ entre 5ème et 10ème jour OU < 1j si exposition précédente à l'héparine (< 30j) — Score = 2 ☐
- Compatible mais non certaine OU ↓ après 10 jours OU exposition précédente à l'héparine (< 3 mois) — Score = 1 ☐
- Thrombopénie précoce (< 4 jours) sans exposition récente à l'héparine — Score = 0 ☐

THROMBOPÉNIE

- Nouvelle thrombose ; nécrose cutanée ; réaction systémique après bolus d'héparine — Score = 2 ☐
- Récidive ou extension de thrombose ; lésions cutanées érythémateuses ; suspicion de thrombose non documentée — Score = 1 ☐
- Aucune — Score = 0 ☐

AUTRES CAUSES DE THROMBOPÉNIE

- Aucune cause de thrombopénie mise en évidence — Score = 2 ☐
- Autres causes possibles — Score = 1 ☐
- Autres cause connue (chirurgie < 3j, sepsis avec preuves microbiologiques,...) — Score = 0 ☐

PROBABILITÉ CLINIQUE DE TIH	FORTE	MOYENNE	FAIBLE
Score total	6 - 8	4 - 5	0 - 3

Ces analyses font l'objet d'une retransmission

Linkins et al, CHEST, 2012

R19 - Novembre 2016